

**KILLS MOSS  
& WEEDS,  
NOT LAWNS!**



# Moss OUT!

**5in1**

## **BROADLEAF WEED & MOSS KILLER**

**CONCENTRATE**

**CONTROLS DISEASE, WEEDS,  
MOSS, ALGAE & LICHENS IN TURF**

**SEE RESULTS IN HOURS!**

**RAINFAST IN 3 HOURS**

Traducción  
en español  
colocada  
en el panel  
posterior

Active Ingredient:	
Iron HEDTA (FeHEDTA).....	26.52%
Other Ingredients:.....	73.48%
<b>Total:.....</b>	<b>100.00%</b>

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**CAUTION**  
 See back for additional Precautionary  
 Statements and First Aid

300515347-9/17

**Treats up to 1,905 sq. ft.**

**NET CONTENTS 24 FL OZ  
(709.76 mL)**

Lilly  
Miller®

# Moss OUT!

5in1

## BROADLEAF WEED & MOSS KILLER CONCENTRATE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION

### FIRST AID

#### IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For medical emergency information, you may call toll free 1-800-265-0761.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes slight eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

#### ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

Manufactured for: Central Garden & Pet Garden Division  
1000 Parkwood Circle, Suite 700  
Atlanta, GA 30339

EPA Reg. No. 67702-26-90098  
EPA Est. No. 48498-CA-1, 8119-WA-1<sub>3</sub>  
Subscript used is first letter of Run Code on Container  
1-800-265-0761 gardendivision@central.com



**CENTRAL**

*Garden & Pet*

Lilly Miller with design: Central Garden & Pet,  
Central Garden & Pet with design and Moss Out! are  
trademarks of Central Garden & Pet Company.  
© 2013, 2017 Central Garden & Pet Company  
300515348-9/17

See inside booklet for additional  
Precautionary Statements, First Aid,  
and complete Directions for Use.

Sold under a license of W. Neudorff GmbH KG

**QUICK  
FACTS**

- 5 in 1 Action!
- Kills Moss and Weeds, Not Lawns
- Treats 1,905 sq. ft.
- Controls disease, weeds, moss, algae, lichens in turf

**CONTROLS**

- Dandelion, Common Chickweed, Clover and other Listed Broadleaf Weeds
- Moss, Algae and Lichens
- Rust, Dollar Spot and Snow Mold

**WHERE TO  
USE**

- On lawns (do not apply to bentgrass)

Manufactured for: **Central Garden & Pet  
Garden Division**  
1000 Parkwood Circle, Suite 700  
Atlanta, GA 30339



EPA Reg No. 67702-26-90098  
EPA Est. No. 48498-CA-1A, 8119-WA-1B  
Subscript used is first letter of Run Code on Container  
1-800-265-0761  
gardendivision@central.com  
www.mossout.com

Lilly Miller with design; Central Garden & Pet, Central Garden & Pet with design and Moss Out! are trademarks of Central Garden & Pet Company.

© 2013, 2017 Central Garden & Pet Company



0 70624 00122 6

300515348-9/17

## **DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

### **Use Sites:**

Use to selectively control/suppress broadleaf weeds and diseases growing in lawns.

### **Pests:**

Controls moss, algae, lichens, liverworts, and lawn diseases (such as dollar spot, snow mold, and rust).

Controls or suppresses weeds such as but not limited to:

- Black medic (*Medicago lupulina*)
- Broadleaf plantain (*Plantago major*)
- Bull thistle (*Cirsium vulgare*)
- Canada thistle (*Cirsium arvense*)
- Common chickweed (*Stellaria media*)
- Creeping buttercup (*Ranunculus repens*)
- Creeping Charlie/Ground ivy (*Glechoma hederacea*)
- Dandelion (*Taraxicum officinale*)
- Dovefoot geranium (*Geranium molle*)
- English daisy (*Bellis perennis*)
- False dandelion (*Hypochoeris radicata*)
- Healall (*Prunella vulgaris*)
- Lawn burweed (*Soliva ptero-sperma*)
- Moss, liverworts, algae and lichens
- Narrow-leaved plantain (*Plantago lanceolata*)
- Oxalis (*Oxalis spp.*)
- Persian Speedwell (*Veronica persica*)
- Prostrate knotweed (*Polygonum aviculare*)
- Shepherd's-purse (*Capsella bursa-pastoris*)
- Silverweed cinquefoil (*Potentilla anserina*)
- Slender speedwell (*Veronica filiformis*)
- White clover (*Trifolium repens*)
- Wild chamomile (*Matricaria chamomilla*)
- Wild geranium (*Geranium robertianum*)

Controls or suppresses diseases such as but not limited to:

- Dollar Spot
- Rust
- Snow Mold

**Application Directions:** For Broadcast Treatment:

Rate of Spray Solution	Rate of Concentrate	Weeds
2.8 fl. oz./yd <sup>2</sup> or 2.5 ga/1000 ft <sup>2</sup>	12.6 fl. oz./1,000 ft <sup>2</sup>	Rate for easy-to-control weeds: black medic ( <i>Medicago lupulina</i> ), Persian speedwell ( <i>Veronica persica</i> ), slender speedwell ( <i>Veronica filiformis</i> ), wild geranium ( <i>Geranium robertianum</i> ), and moss. This rate can also be used for weed seedlings of: false dandelion ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), English daisy ( <i>Bellis perennis</i> ), dandelion ( <i>Taraxacum officinale</i> ) or white clover ( <i>Trifolium repens</i> ).
5.7 fl. oz./yd <sup>2</sup> or 4.9 ga/1000 ft <sup>2</sup>	25.2 fl. oz./1,000 ft <sup>2</sup>	Standard rate for control of most weed species: dandelion ( <i>Taraxacum officinale</i> ), English daisy ( <i>Bellis perennis</i> ), false dandelion ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), Creeping Charlie/Ground ivy ( <i>Glechoma hederacea</i> ), Prostrate knotweed ( <i>Polygonum aviculare</i> ), white clover ( <i>Trifolium repens</i> ), bull thistle ( <i>Cirsium vulgare</i> ), Canada thistle ( <i>Cirsium arvense</i> ), common chickweed ( <i>Stellaria media</i> ), narrow-leaved plantain ( <i>Plantago lanceolata</i> ), dove's foot geranium ( <i>Geranium molle</i> ), oxalis ( <i>Oxalis spp.</i> ), lawn burweed ( <i>Soliva ptero-sperma</i> ), and algae, and for the SUPPRESSION of broad-leaved plantain ( <i>Plantago major</i> )
11.3 fl. oz./yd <sup>2</sup> or 9.8 ga/1000 ft <sup>2</sup>	50 fl. oz./1,000 ft <sup>2</sup>	Rate for tough perennial weeds such as: creeping buttercup ( <i>Ranunculus repens</i> ) and broad-leaved plantain ( <i>Plantago major</i> )

Rate of Spray Solution	Rate of Concentrate	Diseases
2.8 fl. oz./yd <sup>2</sup> or 2.5 ga/1000 ft <sup>2</sup>	12.6 fl. oz./1,000 ft <sup>2</sup>	Rate for control or suppression of diseases such as dollar spot, snow mold, and rust. Use the higher rate when disease pressure is high.
5.7 fl. oz./yd <sup>2</sup> or 4.9 ga/1000 ft <sup>2</sup>	25.2 fl. oz./1,000 ft <sup>2</sup>	

Shake well before using. Mix one part of this product with 24 parts water (5 oz. in 1 gallon of water). Apply the mixed solution at a rate of 2.5-10 gallons/1000 ft<sup>2</sup> (2.8-11.5 fluid oz./yard<sup>2</sup>), using the chart to determine how much diluted spray to use per area. Any standard hand-held or backpack sprayer can be used. Thoroughly spray weeds. Use a coarse nozzle setting to reduce drift. Uniform coverage is important.

Repeat treatment in 3 to 4 weeks for best results.

### **For Spot Treatment**

Shake well before using. Mix one part of this product with 24 parts water (5 oz. in 1 gallon of water). Thoroughly spray weeds to point of runoff using any standard hand-held or backpack sprayer. Use a coarse nozzle setting to reduce drift. Repeat treatment in 3 to 4 weeks for best results.

### **What will I see?**

Works quickly; dying weeds will be seen within hours of application. Treated weeds, moss, or algae will turn brown or black. Occasionally a darkening of the grass leaf blades can occur after treatment; however the grass will recover within a few days to weeks. May stain thatch (dead grass under lawn); this does not affect the health of the grass.

### **Use Precautions:**

Do not apply to drought stressed grass; ensure lawn is well watered prior to application. Do not apply when the daytime temperature will exceed 85°F. Do not apply to bentgrass. If unsure of grass sensitivity, test spray a small area of your lawn. Do not apply to newly seeded areas prior to grass seed germination. Avoid spraying desirable plants. Any desirable plants or structures accidentally contacted should be rinsed with water. To avoid staining, wait until treated area dries before re-entry. Do not apply if rainfall is expected within 3 hours of application. Do not irrigate within 3 hours of application. Do not apply to the same area more than 4 times a year.

## **STORAGE AND DISPOSAL**

**PESTICIDE STORAGE:** Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals. Store unused material, tightly closed, in original container only, away from open flame.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available.

**If partly filled:** Call your local solid waste agency or call 1-800-265-0761 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Controla la Enfermedad, la Maleza, el Musgo, las Algas y líquenes en el césped.  
Elimina el musgo y la maleza pero no el césped.

Rainfast en 3 horas

Tratamiento para hasta 1,905 pies cuadrados.

5 en 1

<b>BREVE RESEÑA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• !Acción 5 en 1!</li><li>• Elimina el Musgo y la Maleza pero no el césped</li><li>• Tratamiento para 1,905 pies cuadrados</li><li>• Controla las enfermedades, la maleza, el musgo, las algas y líquenes en el césped</li></ul>
<b>CONTROLA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diente de león, el Álsine común, Trébol y otras Malezas de oja Ancha</li><li>• Musgo, Algas y Líquenes</li><li>• Roya, Mancha de dólar y Moho de la nieve</li></ul>
<b>DÓNDE USAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En el césped (no aplicar al Agrostis)</li></ul>

# MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ADVERTENCIA

## PRIMEROS AUXILIOS

### EN LOS OJOS

- Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y suavemente con agua ntre 15 y 20 minutos.
- Quítese los lentes de contacto, si fuera el caso, después de los rimeros 5 minutos y siga enjuagando el ojo.
- Llame al centro de Centro de Control de Intoxicaciones o a su doctor ara obtener recomendaciones sobre el tratamiento.

Cuando llame al Centro de Control de Intoxicaciones, a su doctor o al buscar tratamiento asegúrese de tener el recipiente o la etiqueta con usted. Para información sobre emergencias uede llamar al número gratuito 1-800-265-0761.

## INSTRUCCIONES PREVENTIVAS

### RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES

**ADVERTENCIA:** Causa una leve irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese por completo con agua y jabón luego de usar y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o usar el banõ. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

### RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Para proteger el medio ambiente no permita que el pesticida ingrese o fluya en los drenajes, zanjas de drenaje, canaletas o agua en la superficie. Aplique este producto durante un clima tranquilo cuando no se pronostica lluvia por un periodo de 24 horas para asegurar que el viento no lo arrase y la lluvia no lave el pesticida más allá del área de tratamiento. Si se enjuaga el equipo sobre el área de tratamiento se evita el flujo hacia las masas e agua o sistemas e drenaje.



## INSTRUCCIONES PARA EL USO

Es una infracción de la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con su etiqueta.

### Lugares para el uso:

Utilice para controlar/reducir selectivamente la maleza de hoja ancha y las enfermedades en el césped.

### Pestes:

Controla el musgo, las lagas, líquenes, hepáticas, y enfermedades del césped (como Mancha de dólar, Moho de la nieve y Roya)

Controla o reduce las malezas tales como pero limitado a:

- Mielga negra (*Medicago lupulina*)
- Llantén mayor (*Plantago major*)
- Cardo negro (*Cirsium vulgare*)
- Cardo cundidor (*Cirsium arvense*)
- Alcine (*Stellaria media*)
- Botón de oro (*Ranunculus repens*)
- Hierba de la moneda (*Glechoma hederacea*)
- Diente de león (*Taraxicum officinale*)
- Geranio de los caminos (*Geranium molle*)
- Margarita común (*Bellis perennis*)
- Diente de león falso (*Hypochoeris radicata*)
- Consuelda menor (*Prunella vulgaris*)
- Soliva ptero-sperma
- Musgo, hepática, algas y líquenes.
- Llantén menor (*Plantago lanceolata*)
- Agrillos (*Oxalis spp.*)
- Veronica persica
- Centinodia (*Polygonum aviculare*)
- Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*)
- Potentilla (*Potentilla anserina*)
- Veronica filiforme
- Trébol blanco (*Trifolium repens*)
- Manzanilla (*Matricaria chamomilla*)
- Geranio silvestre (*Geranium robertianum*)

Controla o disminuye las enfermedades como pero no limitada a:

- Mancha de dólar
- Roya
- Moho de la nieve

Índice de la solución en spray	Índice de concentrado	Maleza
2.8 fl. oz./yd <sup>2</sup> o 2.5 ga/1000 ft <sup>2</sup>	12.6 fl. oz/ 1,000 ft <sup>2</sup>	Índice para el fácil control de la maleza: mielga negra ( <i>Medicago lupulina</i> ), veronica persica, veronica filiforme, geranio silvestre ( <i>Geranium robertianum</i> ) y musgo. Este índice se puede ser utilizado también para las semillas de: diente de león falso ( <i>Hypochoeris radicata</i> ), margarita común ( <i>Bellis perennis</i> ) diente de león ( <i>Taraxacum officinale</i> ) o trébol blanco ( <i>Trifolium repens</i> ).

Índice de la solución en spray	Índice de concentrado	Maleza
5.7 fl. oz./yd <sup>2</sup> o 4.9 ga/1000 ft <sup>2</sup>	25.2 fl. oz./ 1,000 ft <sup>2</sup>	El índice estándar para el control de la mayoría de los tipos de maleza: diente de león ( <i>Taraxacum officinale</i> ), margarita común ( <i>Bellis perennis</i> ), diente de león falso ( <i>Hypochaeris radicata</i> ), hierba de la moneda ( <i>Glechoma hederacea</i> ), Centinodia ( <i>Polygonum aviculare</i> ), trébol blanco ( <i>Trifolium repens</i> ), cardo negro ( <i>Cirsium vulgare</i> ), cardo cundidor ( <i>Cirsium arvense</i> ), álcine ( <i>Stellaria media</i> ), llantén menor ( <i>Plantago lanceolata</i> ), geranio de los caminos ( <i>Geranium molle</i> ), agrillos ( <i>Oxalis spp.</i> ), Soliva ptero-sperma, y algas, y para la reducción del llantén mayor ( <i>Plantago major</i> )
11.3 fl. oz./yd <sup>2</sup> o 9.8 ga/1000 ft <sup>2</sup>	50 fl. oz./ 1,000 ft <sup>2</sup>	Índice para la maleza perenne: botón de oro ( <i>Ranunculus repens</i> ) y llantén mayor ( <i>Plantago major</i> )

Índice de la solución en spray	Índice de concentrado	Enfermedades
2.8 fl. oz./yd <sup>2</sup> o 2.5 ga/1000 ft <sup>2</sup>	12.6 fl. oz./ 1,000 ft <sup>2</sup>	Índice para el control y la reducción de las enfermedades como la mancha de ólar, la roya y el moho de la nieve. Utilice más cuando la incidencia de la enfermedad es alta.
5.7 fl. oz./yd <sup>2</sup> o 4.9 ga/1000 ft <sup>2</sup>	25.2 fl. oz./ 1,000 ft <sup>2</sup>	

**Instrucciones para la aplicación:** Para el cobertura vasta:

Agite bien antes de usar. Mezcle una parte de este producto con 24 partes de agua (5 onzas en un galón de agua). Aplique la mezcla con índice de 2.5-10 galones por cada 1000 ft<sup>2</sup> (2.8-11.5 onzas por cada y<sup>2</sup>) usando la tabla para determinar qué tipo de solución debe usar en cada área. Cualquier pulverizador estándar de mano o mochila pulverizadora puede ser usada. Rocíe bien la maleza. Use un ajuste basto para reducir la deriva del aerosol. Una cobertura uniforme es importante.

Repita el tratamiento entre cada 3-4 semanas para mejores resultados.

### **Para tratamiento local:**

Agite bien antes de usar. Mezcle una parte de este producto con 24 partes de agua (5 onzas en un galón de agua). Rocíe bien la maleza hasta que el punto de escorrentía usando cualquier pulverizador estándar de mano o mochila pulverizadora. Use un ajuste basto para reducir la deriva del aerosol. Repita el tratamiento entre cada 3-4 semanas para mejores resultados.

### **¿Qué notará?**

Trabaja rápidamente, la eliminación de la maleza será evidente unas horas luego de la aplicación. La maleza, el musgo o algas se tornarán marrones o negras. En ocasiones el oscurecimiento de las hojas del césped puede suceder luego del tratamiento, pero el césped se recuperará en unos días o semanas. Puede manchar la paja (pasto muerto bajo el césped) pero esto no afecta la salud del césped.

### **Precauciones:**

No lo aplique al césped afligido por la sequía, asegúrese que el césped esté bien regado antes de aplicar. No lo aplique si la temperatura subirá a más de 85°F durante el día. No lo aplique al agrostis. Si no sabe si el césped es sensible, haga una prueba en un área pequeña de su césped. No lo aplique en áreas donde ha aplicado semilla recientemente y antes de la germinación. Evite rociar plantas preciadas. Cualquier planta o estructura rociadas accidentalmente debe ser enjuagada con agua. Para evitar las manchas evite ingresar a las áreas tratadas hasta antes de que se sequen. No lo aplique si se pronostican lluvias dentro de 3 horas de la aplicación. No irrite el área por un período de tres horas luego de la aplicación. No lo aplique a la misma área más de 4 veces en un año.

## **ALMACENAMIENTO Y DESECHO**

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene este producto en su recipiente original y manténgalo en un lugar de almacenamiento seguro fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Almacene el material no usado bien cerrado siempre en su recipiente original, lejos de llamas.

**DESECHO DEL PESTICIDA Y USO DEL RECIPIENTE:** Este recipiente no es recargable. No intente volver a usar o recargar este recipiente. **Vacío:** Bótelo en la basura o recíclalo si es posible.

**Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de servicios de desechos o al 1-800-265-0761 para instrucciones de cómo desechar. Nunca deje que fluya el residuo de este producto por un drenaje interno o externo.