



Safer[®]
BRAND

GARDEN FUNGICIDE

FOR FLOWERS, FRUIT AND
VEGETABLES CONCENTRATE

Fungicida Para Jardín

Controls POWDERY MILDEW,
BLACK SPOT & RUST

Makes **4** Gallons

ACTIVE INGREDIENT:

Sulfur	12.0%
OTHER INGREDIENTS	88.0%
TOTAL	100.00%

BY WT.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONARY STATEMENTS
INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL AL REVERSO

NET CONTENTS 16 FL OZ (473ml)

LBL5456F-4 0517

Safer[®]
BRAND

Always Shake
Well Before Using!

GARDEN FUNGICIDE
FOR FLOWERS, FRUIT AND VEGETABLES CONCENTRATE

**FUNGICIDA CONCENTRADO
DE JARDÍN**

PARA FLORES, FRUTAS Y VEGETALES

¡Siempre agite bien
antes de usar!

Distribuido por: **Safer[®], Inc.** (Una subsidiaria de
propiedad exclusiva de Woodstream Corporation)

 woodstream

Hecho en EE. UU.

69 North Locust Street, Lititz, PA 17543

1-800-800-1819 para información

EPA Reg. No. 42697-37

EPA Est. No. 63416-MN-001 (D)

63416-MN-002 (C)

63416-WI-001 (P)

Circled letter is first letter of lot number.


® Propiedad exclusiva de

WOODSTREAM CORPORATION

© Copyright 2009 **WOODSTREAM CORP.**

Modelo No. 5456

LBL5456B-4 0517



▲
PULL HERE TO OPEN / PRESS TO RESEAL. HALE AQUÍ PARA
ABRIR/PRESIONE PARA VOLVER A SELLAR

FIRST AID

If in eyes:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information on this product (including health concerns, medical emergencies or pesticide incidents), you may call 1-800-858-7378, twenty-four (24) hours per day, seven (7) days per week.

Distributed by: **Safer[®], Inc.** (A wholly-owned subsidiary of Woodstream Corporation)

Made in USA

W woodstream

69 North Locust Street, Lititz, PA 17543

1-800-800-1819 for information

EPA Reg. No. 42697-37

EPA Est. No. 63416-MN-001 (D)

63416-MN-002 (C)

63416-WI-001 (P)

Circled letter is first letter of lot number.

All [®] Property of **WOODSTREAM CORPORATION**

[®] Copyright 2009 **WOODSTREAM CORP.**

Model No. 5456

LBL5456B-4 0517



0

DIRECTIONS FOR USE:

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Shake well. For control of *Blackspot*, *Leaf Spot*, and *Rust*, mix 1 part concentrate to 30 parts water or 4 fl. oz. (8 tbsp.) per gal. of water. For *Powdery Mildew* mix 2 fl. oz. (4 tbsp.) per gallon of water. Place about half of the volume of water in sprayer, add concentrate, stir well, add rest of water and mix thoroughly. Run agitator on large tank sprayers. For coverage, see individual applications. Spray plants thoroughly to wet the upper and lower surfaces of foliage. Repeat as recommended.

To control powdery mildew, leaf spot, and rust on *Flowers*, *Foliage Plants & Ornamentals*, spray at 7 to 10 day intervals or as needed. To control powdery mildew, black spot and rust on *Roses*, spray at 7 to 10 day intervals, or following rain. Be sure to treat new growth & buds. Avoid spraying when plants are in full sun or temperature exceeds 85°F. Apply 1 gal. mix to each 350 sq. ft.

To control powdery mildew on *Beans & Peas*, spray at first sign of disease & repeat at 7 day intervals as necessary. May be used up to day before harvest. Apply 1 gal. of mix to each 250 sq. ft.

To control powdery mildew on *Apples & Pears*, apply to thoroughly wet foliage. Apply at pre-bloom stage or after petal fall as needed. **NOTE:** Some apple & pear varieties are sulfur sensitive; test for varietal sensitivity prior to full scale treatment.

To control powdery mildew on *Potatoes*, spray before disease appears & repeat as necessary. Apply 1 gal. of mix to each 350 sq. ft.

On *Cucumbers and Squash*, spray when powdery mildew appears & repeat as necessary. Do not spray young plants. Apply 1 gal. of mix to each 600 sq. ft.

To control powdery mildew on *Grapes*, thoroughly cover foliage. Begin when new shoots are 6–10 inches. Repeat before blooms open and at 14 day intervals as needed. **CAUTION:** Do not apply to wine grapes within 21 days of harvest. Sulfur may damage concord & other labrusca varieties.

To control powdery mildew on *Strawberries*, spray when disease appears and repeat as necessary. Do not spray young plants. Apply 1 gal. of mix to each 300 sq. ft. **NOTE:** Do not apply to strawberries that will be used for canning. May be used up to the day before harvest.

HOME GREENHOUSES: To control powdery mildew, leaf spot and rust on bedding plants, propagates, fruits & vegetables: Mix 1 part concentrate to 30 parts water (8 tbsp. per gal.) and apply according to above recommendations by crop type. Test for phytotoxicity before full-scale application.

USE CAUTIONS: Some plants are susceptible to injury from sulfur under certain climatic conditions. Do not apply on Boston fern, spinach, apricots, filberts, walnuts, and viburnum. Do not apply when temperature exceeds 85°F. Do not apply for at least 4 weeks following application of an oil spray or within 4 days of other pesticides. Be sure to wash and rinse spray equipment thoroughly after each use. Do not allow mixed spray to stand in spray equipment. **Re-entry:** Avoid contact with plants until spray has dried.

STORAGE AND DISPOSAL:

PESTICIDE STORAGE: Store only in original container in a cool, dry area inaccessible to children and pets. Protect from freezing and heat. Keep container tightly closed to prevent evaporation.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:

Non-refillable container. Do not reuse or refill this container.

If Empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST AID

If in eyes:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-800-858-7378 for emergency medical treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:

Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when disposing of rinsate or equipment washwater.

Note: Seller warrants that this product complies with the specifications expressed in this label. To the extent consistent with applicable law, Seller makes no other warranties, and disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for the intended purpose. To the extent consistent with applicable law, Seller's liability or default, breach or failure under this label shall be limited to the amount of the purchase price. To the extent consistent with applicable law, Seller shall have no liability for consequential damages.

FUNGICIDA CONCENTRADO DE JARDÍN

PARA FLORES, FRUTAS Y VEGETALES

INSTRUCCIONES DE USO: Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

Agite bien. Para el control de las manchas negras, manchas en las hojas y la roya, mezcle 1 parte del concentrado con 30 partes de agua o 4 oz líquidas (8 cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Para el oídio mezcle 2 oz líquidas (4 cucharadas) por galón (3.8 l) de agua. Coloque aproximadamente la mitad del volumen de agua en el atomizador, añada el concentrado, revuelva bien, añada el resto del agua y mezcle muy bien. Active el agitador en pulverizadores de tanque. Para la cobertura, consulte las aplicaciones individuales. Rocíe las plantas muy bien para mojar la superficie superior y la inferior del follaje. Repita según se recomienda.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en flores, plantas de follaje y ornamentales, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o según sea necesario.

Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en las rosas, rocíe a intervalos de 7 a 10 días o después de que

llueva. Recuerde tratar los brotes y los capullos. Evite rociar cuando las plantas estén a pleno sol o en temperaturas superiores a 85°F (29.4 °C). Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla por cada 350 pies cuadrados (32.5 m²).

Para controlar el oídio en frijoles y guisantes, rocíe a las primeras señales de aparición de la enfermedad y repita en intervalos de 7 días según sea necesario. Puede utilizar hasta el día de la cosecha. Aplique un galón (3.8 l) del producto mezclado por cada 250 pies cuadrados (23.2 m²).

Para controlar el oídio en manzanas y peras, aplique mojando muy bien el follaje. Aplique en la etapa previa al florecimiento o después de que caigan los pétalos, según sea necesario. **NOTA:** Algunas variedades de manzanas y peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

Para controlar el oídio en las papas, rocíe antes de que aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 350 pies cuadrados (32.5 m²) en pepinos y zapallo, rocíe cuando aparezca el oídio y repita según sea necesario. No rocíe las plantas jóvenes. Aplique 1 galón (3.8 l) de la mezcla cada 600 pies cuadrados (55.7 m²) para controlar el oídio en uvas, cubriendo completamente el follaje. Comience cuando los brotes estén de 6 a 10 pulgadas (15.2 cm a

25.4 cm) Repita antes de que se abran las flores y a intervalos de 14 días según sea necesario. **PRECAUCIÓN:** No aplique a las uvas para vino 21 días antes de la cosecha. El azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas.

Para controlar el oídio en las fresas, rocíe cuando aparezca la enfermedad y repita según sea necesario. No rocíe las plantas jóvenes. Aplique un galón (3.8 l) del producto mezclado por cada 300 pies cuadrados (27.9 m²). **NOTA:** No aplique en fresas que se utilizarán para envasar en conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

INVERNADEROS DOMÉSTICOS: Para controlar el oídio, las manchas en las hojas y la roya en plantas en canteros, plantas reproducidas, frutas y vegetales: Mezcle 1 parte del concentrado con 30 partes de agua (8 cdas. por galón [3.8 l]) y aplique de acuerdo con las recomendaciones anteriores por tipo de cultivo. Pruebe la fitotoxicidad antes de realizar la aplicación a gran escala.

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al azufre bajo ciertas condiciones climáticas. No aplique en los helechos tipo Boston, espinacas, albaricoques, avellanas, nueces y ciertas fanerógamas. No aplique cuando la temperatura sea superior a 85°F (29.4 °C). No aplique hasta al menos 4 semanas después de una atomización de aceite o en el lapso de 4 días de después de haber usado otros pesticidas. Lave y enjuague muy bien el equipo atomizador

después de cada uso. No deje que el producto mezclado permanezca en el equipo atomizador. Reingreso al área: Evite el contacto con las plantas hasta que el rocío haya secado.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene únicamente en el envase original en un sitio seco y fresco que sea inaccesible para los niños y las mascotas. Proteja del congelamiento y el calor. Conserve el envase bien cerrado para evitar la evaporación.

DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:

Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase.

Si está vacío: Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje si está disponible.

Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta el producto sin usar en un desagüe de interiores o exteriores.

ENUNCIADOS SOBRE PRECAUCIÓN: PELIGROS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos y la ropa. Lave muy bien con agua y jabón después de manipular.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con los ojos:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos de forma lenta y suave con agua durante 15-20 minutos.
- Retire los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para que se le recomiende un tratamiento.

Lleve consigo el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de envenenamiento, al médico o vaya a recibir tratamiento. También puede comunicarse con el 1-800-858-7378 para orientación sobre tratamiento de emergencia.

RIESGOS PARA EL AMBIENTE: No aplique directamente en el agua, en las áreas donde exista agua superficial ni en áreas entre mareas por debajo de la marca pleamar media. No contamine el agua al desechar el agua del lavado o enjuague del equipo.

Nota: El vendedor garantiza que este producto cumple con las especificaciones expresadas en esta etiqueta. Hasta el máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no otorga otras garantías y desconoce cualesquiera otras garantías, explícitas o implícitas, incluyendo a título informativo mas no limitativo, las garantías de comerciabilidad y adecuación para el fin previsto. Hasta el máximo permitido por la ley vigente que corresponda, la responsabilidad civil u obligación por parte del vendedor, así como el incumplimiento o insuficiencia de lo contemplado en esta etiqueta estará limitado al monto del precio de compra. Hasta el máximo permitido por la ley vigente que corresponda, el vendedor no tendrá responsabilidad por los daños resultantes.