



DIRECTIONS FOR USE:
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

WHAT IT IS: 3-In-1 Garden SprayII® provides three garden solutions in one: fungicide, insecticide and miticide. It kills garden insects and mites and controls fungal diseases. It contains a formulation to help reduce injury to most plants.

WHAT IT CONTROLS: Powdery mildew, black spot, leaf spot, and rust.

WHAT IT KILLS: Aphids, Beetles (leaf-feeding), Caterpillars (leaf-feeding), Crickets, Earwigs, Lace Bugs, Leafhoppers, Mealybugs, Mites, Plant Bugs, Scale Crawlers, Thrips, and Whiteflies.

WHERE TO USE IT: Roses, Flowers, Shade Trees, Foliage Plants, Ornamentals, Beans, Peas, Broccoli, Cabbage, Cauliflower, Collards, Kale, Peppers, Strawberries, Apples, Pears, Citrus, Potatoes, Cucumbers, Squash, Grapes, Blackberries, Blueberries, Raspberries, Loganberries, Currants, Melons, and Tomatoes.

HOW TO USE IT:
Apply in the morning or late evening. Shake Well. Use at first sighting of insects or infection. Thorough coverage of both top and bottom leaves is important. Spray leaves to the point of runoff. Apply every 5 to 7 days when insects are present.

USE CAUTIONS:
Some plants are susceptible to injury from sulfur under certain climatic conditions. DO NOT USE on delicate fern, apricots, filberts, stock, walnuts, nasturtium, sweet pea, violet, mountain ash, Japanese maple, horse chestnut, spinach, viburnum, newly planted cuttings, or plants stressed by drought. Do not apply when plants are in full sun or when temperature exceeds 90° F. Do not apply for at least 4 weeks following application of oil spray.

FUNGICIDE USE:

FLOWERS AND ORNAMENTALS: Apply at first sign of disease infestation. Spray at 7 to 10 day intervals following rain, or as needed to control powdery mildew, leaf spot, black spot, and rust. Be sure to treat new growth and buds.

BEANS, PEAS, BROCCOLI, CABBAGE, CAULIFLOWER, COLLARDS, KALE AND PEPPERS: Apply at first sign of disease infestation. Spray at 7-day intervals following rain, or as needed to control powdery mildew. Can be used up to day of harvest.

STRAWBERRIES: Apply at first sign of disease infestation. Repeat at 3-week intervals to control powdery mildew. Do not use on strawberry fruit that will be used for canning. Can be used up to the day before harvest.

APPLES & PEARS: Apply at pre-bloom stage or after petal fall as needed to control powdery mildew. **Note:** Some apple and pear varieties are sulfur sensitive; test for varietal sensitivity prior to full-scale treatment.

CITRUS: Do not apply within 4 weeks following use of an oil spray.

POTATOES: Apply before disease infestation appears and repeat as necessary to control powdery mildew.

CUCUMBERS AND SQUASH: Apply at first sign of disease infestation and repeat as necessary to control powdery mildew. Do not spray young plants.

GRAPES: For control of powdery mildew, apply when new shoots are 6-10 inches. Repeat before blooms open and at 14-day intervals as needed. Note: Do not apply to wine grapes within 21 days of harvest. Sulfur may damage concord and other labrusca varieties.

BLACKBERRIES, BLUEBERRIES, RASPBERRIES, LOGANBERRIES AND CURRENTS:

Apply each week starting at first bloom color to control powdery mildew. Continue to spray at 10 to 14 day intervals until fruit is set, then repeat as needed or following rain.

MELONS: Apply at first sign of disease infestation. Spray at 7 to 10 day intervals, following rain, or as needed to control powdery mildew. Note: Melon foliage is extremely sensitive to sulfur burn. See paragraph on Use Cautions.

TOMATOES: Apply at first sign of disease infestation and repeat as necessary to control powdery mildew. Do not spray young plants.

INSECTICIDE AND MITICIDE USE:

Apply at first sighting of insects/mites. Thoroughly moisten top and bottom leaf surfaces where insects/mites are feeding or resting. Apply every 5 to 7 days when insects are present or as needed to prevent damage.

STORAGE AND DISPOSAL:
Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

STORAGE: Store in a cool dry area away from heat or open flame and inaccessible to children. Keep from freezing.

DISPOSAL: **If Empty:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.
If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS:

This product may be hazardous to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water by cleaning of equipment washwaters or disposal of rinsate.

ROCÍO 3-IN-1 PARA JARDÍN

SIEMPRE AGITE BIEN ANTES DE USAR!

Safer® Brand Rocío 3-in-1 para jardín puede utilizarse para matar plagas de insectos y ácaros y para evitar y controlar las enfermedades micóticas. Este producto contiene azufre y jabón mata-insectos derivado de grasas naturales y aceites de plantas. Su fórmula no daña la mayoría de las plantas. Este producto está diseñado para matar plagas y crear un ambiente donde los hongos dañinos no puedan vivir. Esta fórmula lista para utilizar puede aplicarse directamente a las frutas y vegetales hasta el día anterior a la recolección.

INSTRUCCIONES DE USO:

Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

LO QUE ES: 3-In-1 Garden SprayII® brinda tres soluciones en una para el jardín: fungicida, insecticida y acaricida. Mata insectos de jardín y ácaros, y controla las enfermedades fúngicas. Contiene una fórmula para contribuir a disminuir daños a la mayoría de las plantas.

LO QUE CONTROLA: Oídio, manchas negras, manchas en las hojas y roya.

LO QUE MATA: Áfidos, escarabajos (que se alimentan de hojas), orugas (que se alimentan de hojas), grillos, tijeretas, cochinillas, ácaros, chinches de las plantas, insectos de plantas, insectos de escamas, pulgones y moscas blancas.

DÓNDE USARLO: Rosas, flores, árboles de sombra, plantas de follaje, plantas ornamentales, frijoles, guisantes, brócolis, coles, coliflores, berzas, coles rizadas, pimientos, fresas, manzanas, peras, cítricos, papas, pepinos, zapallos, uvas, moras, arándanos azules, frambuesas, fresas americanas, grosellas, melones y tomates.

CÓMO USARLO: Aplique en la mañana o última hora de la tarde. Agite bien. Utilice a la aparición de los insectos. Es importante cubrir muy bien todas las superficies de las plantas incluyendo la parte superior e inferior de las hojas. Rocíe las hojas hasta el punto de escorrentía. Aplique cada 5 a 7 días cuando estén presentes los insectos.

PRECAUCIONES DE USO: Algunas plantas son susceptibles al azufre bajo ciertas condiciones climáticas. NO UTILICE en los helechos delicados, albaricoqueros, avellanos, plantas madre, nogales, capuchinas, guisantes de olor, violetas, serbales, arces japoneses, castaños de indias, espinacas, viburnos, esquejes recién plantados o plantas afectadas por la sequía. No aplique cuando las plantas estén a pleno sol o cuando la temperatura excede 90°F (32°C). No utilice durante al menos las 4 semanas siguientes a la aplicación de un rocío aceitoso.

USO DEL FUNGICIDA:

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES: Aplique a las primeras señales de infestación. Rocíe a intervalos de 7 a 10 días, después de la lluvia o según sea necesario para controlar el oídio, manchas en las hojas, manchas negras y roya. Asegúrese de tratar los brotes y los capullos.

FRIJOLES, GUISES, BRÓCOLIS, COLES, COLIFLORES, BERZAS, COLES RIZADAS Y PIMIENTOS: Aplique a las primeras señales de infestación. Rocíe a intervalos de 7 días, después de la lluvia o según sea necesario para controlar el oídio. Puede utilizar hasta el día de la cosecha.

FRESAS: Aplique a las primeras señales de infestación. Rocíe a intervalos de 3 semanas para controlar el oídio. No aplique en las fresas que serán utilizadas para envasar en conserva. Se puede utilizar hasta el día antes de la cosecha.

MANZANAS Y PERAS: Aplique en la etapa previa al florecimiento o después de que caigan los pétalos, según sea necesario. **Nota:** Algunas variedades

de manzanas y peras son sensibles al azufre; pruebe la sensibilidad de la variedad antes de realizar el tratamiento a gran escala.

CÍTRICOS: No aplique en el lapso de las 4 semanas siguientes al uso de un rocío aceitoso.

PAPAS: Aplique a las primeras señales de infestación y repita según sea necesario para controlar el oídio.

PEPINOS Y ZAPALLO: Aplique a las primeras señales de infestación y repita según sea necesario para controlar el oídio. No rocíe las plantas jóvenes.

UVAS: Para el control del oídio, aplique cuando los nuevos brotes tengan de 6 a 10 pulgadas (15.9 a 25.4 cm) Repita antes de que florezcan y a intervalos de 14 días según sea necesario. Nota: No aplique a las uvas para vino 21 días antes de la vendimia. El azufre puede dañar las variedades Concord y otras Labruscas.

MORAS, ARÁNDANOS AZULES, FRAMBUESAS, HÍBRIDOS DE ZARZAMORA (LOGANBERRIS) Y GROSELLAS: Aplique cada semana comenzando desde el primer florecimiento de color para controlar el oídio.

Continúe rocíando a intervalos de 10 a 14 días hasta que la fruta esté firme, luego repita según sea necesario o después de la lluvia.

MELONES: Aplique a la primera señal de infestación. Rocíe a intervalos de 7 a 10 días, después de la lluvia o según sea necesario para controlar el oídio. Nota: El follaje del melón es extremadamente sensible a la quemadura del azufre. Consulte el párrafo "Precauciones de uso".

TOMATES: Aplique a las primeras señales de infestación y repita según sea necesario para controlar el oídio. No rocíe las plantas jóvenes.

USO DEL INSECTICIDA Y ACARICIDA: Utilice a las primeras señales de aparición de los insectos/ácaros. Moje muy bien toda la superficie superior e inferior de las hojas donde los insectos se estén alimentando o descansando. Aplique cada 5 a 7 días cuando estén presentes los insectos o según sea necesario para evitar daños.

ALMACENAMIENTO Y DESHECHO:

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o desechar.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor, de las chispas y llamas expuestas. Proteja del congelamiento.

DESECHO:

Si está vacío: Envase no rellenables. No reutilice ni rellene este envase.

Colóquelo en la basura o ofrézcalo para reciclar si está disponible.

Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de desechos sólidos local para las instrucciones de desecho. Nunca vierta el producto sin usar en un desague de interiores o exteriores.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA EL AMBIENTE:

Este producto puede ser dañino para los invertebrados acuáticos. No aplique directamente en el agua, en las áreas donde existe agua superficial ni en áreas entre mareas por debajo de la marca de la pleamar media. No contamine el agua al limpiar el equipo durante el lavado o al desechar el agua del enjuague.

3-In-1 Garden SprayII® can be used to kill insect and mite pests and to prevent and control fungal disease. 3-In-1 Garden SprayII® contains sulfur and insect killing soap derived from natural fats and plant oils. Its formulation is gentle on most plants. 3-In-1 Garden SprayII® is designed to kill pests and create an environment where damaging fungi cannot live. The ready-to-use formulation can be applied directly to fruits and vegetables right up to the day before harvest.

Note: Seller warrants that this product complies with the specifications expressed in this label. To the extent consistent with applicable law, Seller makes no other warranties, and disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for the intended purpose. To the extent consistent with applicable law, Seller's liability or default, breach or failure under this label shall be limited to the amount of the purchase price. To the extent consistent with applicable law, Seller shall have no liability for consequential damages.

Distributed by: Safer® Inc. (A wholly-owned subsidiary of Woodstream Corporation)

 woodstream

69 North Locust Street, Lititz, PA 17543
1-800-800-1819 for information

EPA Reg. No. 59913-12

EPA Est. 63416-MN-001①

63416-MN-002② 63416-WI-001③

Circled letter is first letter of lot number

All © Property of WOODSTREAM CORPORATION

© Copyright 2009 WOODSTREAM CORPORATION

Model No. 5452

LBL5452B-5 0717

Made in USA

