

*Treats up to **10,000 Square Feet***



COMPLETE BRAND **INSECT KILLER**

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

2-WAY FORMULA[†]

2-WAY FORMULA[†]

PROTECTS YOUR LAWN FROM TOP TO BOTTOM

Kills Surface Insects*

Kills Soil Insects*
for up to 3 Months

*listed insects

[†] Contains both contact and systemic insecticide.

Active Ingredients:

Imidacloprid 0.15%

β-Cyfluthrin 0.05%

Other Ingredients ... 99.80%

Total 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements

Not for sale, sale into, distribution and or use in Nassau, Suffolk,
Kings, and Queens counties of New York.



FÓRMULA DE 2 VÍAS

Mata insectos* de superficie

Mata insectos de suelo* hasta por 3 meses

Treats up to
10,000 sq

NET WT 10Lb (4.5kg)

ins both contact and systemic insecticide.

ngredients:

pprid 0.15%

hrin 0.05%

igredients ... 99.80%

100.00%

OUT OF REACH OF CHILDREN

UTION See back panel for additional
precautionary statements

ale, sale into, distribution and or use in Nassau, Suffolk,
rd Queens counties of New York.



FÓRMULA DE 2 VÍAS

Mata insectos* de superficie

Mata insectos de suelo* hasta por 3 meses

Treats up to
10,000 Sq Ft

NET WT 10Lb (4.5kg)

Treats up to 10,000 Square Feet



COMPLETE BRAND **INSECT KILLER**

Kills Surface Insects*

**For Soil & Turf
Ready-To-Spread
Granules**

Kills Soil Insects*
for up to 3 Months

MICRO DOT



COMPLETE BRAND INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

READ THE LABEL FIRST!



QUICK FACTS

- Kills Listed Insects Above & Below Ground
- Long-Lasting - Up To 90-Day Subsurface Insect Protection

KILLS	Ants, Fleas, Ticks, White Grubs, Chinch Bugs, Mole Crickets, European crane fly larvae and other listed pests
COVERAGE	Covers up to 10,000 sq. ft. for ants, fleas, and ticks. Covers up to 5,000 sq. ft. for all other listed pests.
WHERE TO USE	Lawn, Ground Covers, Flower Beds, Around Trees & Shrubs, and Around Homes
WHEN TO USE	Surface Pests: Whenever insects are present White Grubs: May through July European crane fly larvae: Apply once, when adult insects are present in large numbers
HOW MUCH TO USE	See directions
	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG, (1-877-229-3724) or visit our website at www.bayeradvanced.com

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Before use, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using:

- Restrictions:** • Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes. • Food utensils such as teaspoons and measuring cups should not be used for food purposes after use with this insecticide. • Keep people and pets away from treated area until it has been watered and allowed to dry. • Do not use in vegetable gardens. • Do not allow people or pets to reenter until sprays have dried. • Do not apply this product, by any application method, to Linden, Basswood, or other Tilia species.

HOW TO USE

HOME PERIMETER TREATMENT

PESTS

Ants, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Digger Wasps, Earwigs, Millipedes, Pillbugs, Scorpions, Sowbugs, Spiders, Termites*

HOW MUCH TO APPLY

1/6 to 1/2 cup per 45 to 50 ft. (2 to 3 ft. band) 1 to 3 lbs. per 1000 sq. ft. - ants, Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests
Covers up to 10,000 sq. ft. (a band 2 feet wide and 5,000 feet long.) If pest pressure is higher, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft.

HOW TO APPLY

Around the Exterior Perimeter of the House To keep these pests away from your home, apply granules in a band 2 to 3 feet wide around and up to the structure. Water in thoroughly after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill.

TIP: A hand-held spreader makes this easy.

For Ant Mounds or Wasp Burrows Sprinkle 1 to 2 teaspoons of granules over the ant mound or wasp burrow. Treat wasps at night, after they are back in their nest. Water in thoroughly after applying.

TO CONTROL LISTED PESTS IN AND AROUND THE LAWN

PESTS

Annual Bluegrass weevil (Hyperodes weevil), Ants, Armyworms, Billbugs, Black Turfgrass Ateius, Chiggers, Chinch Bugs, Cutworms, European crane fly larvae, Fleas, Grasshoppers, Leafhoppers, Mealybugs, Mole Crickets, Mosquitoes, Sod Webworms (lawn moths), Ticks (including deer ticks), White Grubs (including larvae of Asiatic Garden Beetle, Black Turfgrass Ateius, Chafers, Japanese Beetle, May or June Beetle, and Oriental Beetle)

HOW MUCH TO APPLY

Apply 1 to 3 lbs per 1000 sq ft - ants, fleas, and ticks. Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests. Adjust your spreader to the proper setting. See the following table. This bag covers 10,000 sq. ft. - which is the same as a lawn 100 feet wide and 100 feet long.
If pest pressure is higher, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft. For control of European crane fly larvae apply 3 lbs per 1,000 sq. ft.

HOW TO APPLY

Use rotary or drop type spreaders to apply granules evenly over the lawn, flower beds, ground covers, and around trees/shrubs. To be sure you cover lawn areas uniformly, first treat the border of the lawn then fill in the center.

Make parallel passes, walking at a steady pace to ensure even distribution of the granules.

Water thoroughly within a day after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill.

TIP: For best control of white grubs, mole crickets, and European crane flies apply just before egg hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area.



PESTS

This product contains Bayer's proprietary 2-way action formula*. Bayer Advanced's 2-way action controls turf pests like ants, fleas, and ticks plus soil pests like grubs in one easy step. It not only kills existing listed soil pests, but also keeps on protecting for up to 90 days. Keeping the yard, lawn, and around your home free of listed nuisance pests has never been easier.

¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Extermina los insectos que figuran en la lista sobre y debajo del suelo.
- Protección subterránea contra insectos duradera hasta 90 días.

MATA	Hormigas, pulgas, garrapatas, larvas blancas, chinches de los cereales, grillos topos, larvas de la tipula paludosa y otras plagas que figuran en la lista.
COBERTURA	Cubre hasta 10,000 pies cuadrados (alrededor de 900 m ²) para hormigas, pulgas y garrapatas. Cubre hasta 5,000 pies cuadrados (alrededor de 450 m ²) para todas las demás plagas.
DÓNDE USAR	Céspedes, recubrimientos del suelo, maceteros de flores, alrededor de árboles y arbustos, y alrededor de casas.
CUÁNDO USAR	Plagas de superficie: En donde haya insectos. Larvas blancas: Desde mayo hasta julio. Larva de la tipula paludosa: Aplicar una vez, cuando los insectos adultos estén presentes en grandes cantidades.
CUÁNTO USAR	Ver las indicaciones
	Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en línea en www.BayerAdvanced.com

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Antes de utilizar, lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR Lea y siga las indicaciones cuando use el producto.

- Restricciones:** • No aplicar cerca de estanques de peces, lagunas, arroyos o lagos. • Los utensilios de uso diario, tales como cucharas y tazas medidoras, no deben usarse con fines domésticos después de haberlos usado con este insecticida. • Mantenga a las personas y mascotas fuera del área tratada hasta que el producto se haya diluido y secado. • No usar en jardines con vegetales. • No deje que las personas y las mascotas vuelvan a entrar hasta que el rocío se haya secado. • No aplicar este producto, mediante ningún método de aplicación, sobre tilo, tilo americano u otra especie de Tilia.

CÓMO USAR

TRATAMIENTO PERIMETRAL DEL HOGAR

PLAGAS

Hormigas, ciempiés, cucarachas, grillos, avispa excavadora, tijeretas, milpiés, cochinitas escorpión, arañas, termitas*.

CUÁNTO APLICAR

1/6 a 1/2 taza por 45 a 50 pies (13-15 m) 1 a 3 libras (0.45 a 1.4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²) para las hormigas. Aplicar 2-3 libras (0.9 - 1.4 kg) cada 1,000 pies cuadrados (93 m²) todas las otras plagas que figuran en el listado. Cubre hasta 10,000 pies cuadrados (900 m²) (una franja de 2 pies de ancho (0.60 m) a 5,000 pies de largo (150 m)). Si hay gran cantidad de plagas, aplique proporciones de 3 libras por 1,000 pies cuadrados.

CÓMO APLICAR

Alrededor del perímetro exterior de la casa: Para ahuyentar a las plagas de su casa, aplique granules en una franja de 2 a 3 pies (0.60 a 0.90 m) de ancho en los alrededores y hasta la estructura. Regar completamente después de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar. **CONSEJO:** Un esparcidor manual facilitará la tarea. **Para hormigueros y nidos de avispas:** Esparta 1 o 2 cucharadas de granules sobre los hormigueros y nidos. Aplique en las avispas en la noche, una vez que hayan vuelto a sus nidos. Regar completamente después de la aplicación.

PARA CONTROLAR LAS PLAGAS EN CÉSPEDES Y SUS ALREDEDORES

PLAGAS

Gorgojos de pasto azul (Género Hyperodes), hormigas, gusanos soldados, cochinitas, ateius de césped negro, ácaros, chinches, gusanos cortadores, larva de la tipula paludosa, pulgas, grillos, saltahojas, coxos, grillos topo, mosquitos, palomillas (polilla del césped), garrapatas (incluyen las garrapatas del ciervo), gorgojos blancos (incluyen las larvas del escarabajo asiático del jardín, escarabajos, escarabajos japoneses, escarabajos de mayo o junio, y escarabajos orientales).

CUÁNTO APLICAR

Aplique de 1 a 3 libras (0.45 a 1.4 kg) cada 1,000 pies cuadrados (93 m²) para hormigas, pulgas y garrapatas. Aplique de 2 a 3 libras (0.9 - 1.4 kg) cada 1,000 pies cuadrados (93 m²) para todas las otras plagas que figuran en el listado. Ajustar el esparcidor al modo apropiado. Ver la siguiente tabla. Esta bolsa cubre 10,000 pies cuadrados (900 m²) lo que equivale a un césped de 100 pies (30.48 m) de ancho y 100 (30.48) pies de largo. Si hay gran cantidad de plagas, aplique proporciones de 3 libras por 1,000 pies cuadrados. Para el control de la larva de la tipula paludosa, aplique 3 libras (1.4 kg) cada 1,000 pies cuadrados (93 m²).

CÓMO APLICAR

Use un esparcidor de gota o rotativo para aplicar los granules en forma pareja en céspedes, maceteros, revestimiento de suelos, y alrededor de árboles y arbustos. Para asegurarse de que cubre toda el área del césped de manera uniforme, primero aplique en los bordes y luego llene el centro.

Pase en forma paralela, caminando con paso regular para asegurarse de distribuir bien los granules.

Regue bien el mismo día de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar.

CONSEJO: Para un mejor control de los gorgojos blancos, grillos topo, y tipulas paludosas, realice la aplicación antes de que incuben sus huevos. Comuníquese con el Agente de extensión local de su condado para saber cuáles son las fechas ideales para aplicar este insecticida en su área.

PLAGAS

Hormigas rojas



Water in thoroughly after applying. To prevent pest damage, apply this product early – when pests are still young and easier to kill.

TIP: A hand-held spreader makes this easy.

For Ant Mounds or Wasp Burrows: Sprinkle 1 to 2 teaspoons of granules over the ant mound or wasp burrow. Treat wasps at night, after they are back in their nest. Water in thoroughly after applying.

TO CONTROL LISTED PESTS IN AND AROUND THE LAWN

PESTS

Annual Bluegrass weevil (hyperodes weevil), Ants, Armyworms, Billbugs, Black Turfgrass Ateanuis, Chiggers, Chinch Bugs, Cutworms, European crane fly larvae, Fleas, Grasshoppers, Leafhoppers, Mealybugs, Mole Crickets, Mosquitoes, Sod Webworms (lawn moths), Ticks (including deer ticks), White Grubs (including larvae of Asiatic Garden Beetle, Black Turfgrass Ateanuis, Chafers, Japanese Beetle, May or June Beetle, and Oriental Beetle)

HOW MUCH TO APPLY

Apply 1 to 3 lbs per 1000 sq ft – ants, fleas, and ticks, Apply 2-3 lbs per 1,000 sq ft. – all other listed pests. Adjust your spreader to the proper setting. See the following table. This bag covers 10,000 sq. ft. which is the same as a lawn 100 feet wide and 100 feet long. If pest pressure is higher, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft. For control of European crane fly larvae apply 3 lbs per 1,000 sq. ft.

HOW TO APPLY

Use rotary or drop type spreaders to apply granules evenly over the lawn, flower beds, ground covers, and around trees/shrubs.

To be sure you cover lawn areas uniformly, first treat the border of the lawn then fill in the center.

Make parallel passes, walking at a steady pace to ensure even distribution of the granules.

Water thoroughly within a day after applying. To prevent pest damage, apply this product early – when pests are still young and easier to kill.

TIP: For best control of white grubs, mole crickets, and European crane flies apply just before egg hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area.



PESTS

Fire Ants

HOW MUCH TO APPLY

1/4 cup per mound

HOW TO APPLY

Fire Ant Mounds: Sprinkle evenly over mound. Treat new mounds as they appear. Water in thoroughly after applying.

APPLICATION RESTRICTIONS

- Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of run-off. • Do not make applications during rain. • Do not mow until the granules are thoroughly watered in. • Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

* contains both contact and systemic insecticides

† This product will kill workers and winged reproductive forms of termites that enter into the treated areas. Use of this type of product to kill termites should not be considered a substitute for soil treatment of subterranean termites done by a professional pest control operator.

IMPORTANT - Directions for Storage and Disposal

PESTICIDE STORAGE: Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably in a locked storage cabinet.

PESTICIDE DISPOSAL: If Empty: • Non-refillable container. Do not refill or reuse this container.

• Place in trash or offer for recycling if available.

If Partially Filled: • Call your local solid waste agency or 1-877-229-3724 for disposal instructions.

• Never place unused product down any outdoor or indoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. • Causes moderate eye irritation. • Avoid contact with skin, eyes or clothing. • Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. • Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

FIRST AID +

IF SWALLOWED • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.

Active Ingredient: 0.15% Imidacloprid [CAS # 138261-41-3] and 0.05% Beta-Cyfluthrin [CAS # 68359-37-5].

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is toxic to fish. • To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. • Apply this product only as specified on this label.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

CÓMO APLICAR

Alrededor del perímetro exterior de la casa: Para ahuyentar a las plagas de su casa, aplique gránulos en una franja de 2 a 3 pies (0,60 a 0,90 m) de ancho en los alrededores y hasta la estructura.

Regar completamente después de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar. **CONSEJO:** Un esparcidor manual facilitará la tarea.

Para hormigueros y nidos de avispas: Espazas 1 a 2 cucharadas de gránulos sobre los hormigueros y nidos. Aplique en las avispas en la noche, una vez que hayan vuelto a sus nidos. Regar completamente después de la aplicación.

PARA CONTROLAR LAS PLAGAS EN CÉSPEDES Y SUS ALREDEDORES

PLAGAS

Gorgojos de pasto azul (Género hyperodes), hormigas, gusanos soldados, cochinitas, ateánuis de césped negro, ácaros, chinches, gusanos cortados, larva de la tipula paludosa, pulgas, grillos, saltahojas, coccos, grillos topo, mosquitos, palomillas (pollita del césped), garrapatas (Incluso las garrapatas del ciervo), gorgojos blancos (Incluso las larvas del escarabajo asiático del jardín, escarabajos, escarabajos japoneses, escarabajos de maju o Junio, y escarabajos orientales).

CUÁNTO APLICAR

Aplique de 1 a 3 libras (0,45 a 1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93 m²) para hormigas, pulgas y garrapatas. Aplique de 2 a 3 libras (0,9 – 1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93m²) para todas las otras plagas que figuran en el listado. Aplicar el esparcidor al modo apropiado. Ver la siguiente tabla. Esta bolsa cubre 10.000 pies cuadrados (900 m²) lo que equivale a un césped de 100 pies (30,48 m) de ancho y 100 (30,48) pies de largo. Si hay gran cantidad de plagas, aplique proporciones de 3 libras por 1.000 pies cuadrados. Para el control de la larva de la tipula paludosa, aplique 3 libras (1,4 kg) cada 1.000 pies cuadrados (93 m²).

CÓMO APLICAR

Use un esparcidor de gata o rotativo para aplicar los gránulos en forma pareja en céspedes, maceteros, revestimiento de suelos, y alrededor de árboles y arbustos.

Para asegurarse de que cubre toda el área del césped de manera uniforme, primero aplique en los bordes y luego llene el centro.

Pase en forma paralela, caminando con paso regular para asegurarse de distribuir bien los gránulos.

Riegue bien el mismo día de la aplicación. Para evitar el daño de plagas, aplique este producto temprano, cuando las plagas son jóvenes y fáciles de exterminar.

CONSEJO: Para un mejor control de los gorgojos blancos, grillos topo, y tipulas paludosas, realizar la aplicación antes de que incuben sus huevos. Comuníquese con el Agente de extensión local de su condado para saber cuáles son las fechas ideales para aplicar este insecticida en su área.



PLAGAS

Hormigas rojas

CUÁNTO APLICAR

1/4 taza por hormiguero.

CÓMO APLICAR

Hormigueros de hormigas rojas: Espazas en forma pareja sobre el hormiguero. Trate los nuevos hormigueros en cuanto aparezcan. Regar copiosamente después de la aplicación.

RESTRICCIONES SOBRE LA APLICACIÓN

- Aplicar este producto directamente sobre el césped o el área del jardín. • Regar el área tratada según lo indicado en la etiqueta. • No regar hasta el punto de escorrentamiento. • No aplicar cuando llueve. • No cortar el césped hasta que los gránulos hayan sido regados. • Se prohíbe la aplicación de este producto directamente en piscinas o alcantarillados, o cualquier otra área como canales donde haya un desagüe a alcantarillados, bocas de tormenta, cursos de agua o hábitat acuático. No permitir que el producto ingrese a un desagüe durante o después de la aplicación.

* contiene insecticida de contacto y sistémico

† Este producto exterminará termitas obreras y reproductoras diurnas que ingresen al área tratada. El uso de este tipo de producto para exterminar termitas no debe considerarse un sustituto para el tratamiento del suelo de las termitas subterráneas realizado por un profesional de control de plagas.

Keep people and pets away from treated area until it has been watered and allowed to dry.

Mantenga a las personas y mascotas fuera del área tratada hasta que se haya regado y secado el lugar.

SPREADER SETTINGS: If your spreader is not listed, please call our Consumer Service Hotline toll free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) for help. Rate: 1 to 3 lbs. per 1,000 sq. ft.

GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR: Si su esparcidor no se encuentra en la lista, solicite ayuda llamando a nuestro número gratuito de servicio al consumidor: 1-877-BayerAG (1-877-229-3724). Tasa: 1 a 3 libras (0,45 a 1,4 kg) cada 1000 pies cuadrados (93 m²).

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR				
Broadcast Spreaders Model Modelos de esparcidores al voleo	1 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 1 libra (0,45 kg)*	2 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 2 libras (0,9 kg)*	3 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 3 libras (1,4 kg)*	Distance Between Passes (Ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS BASIC	3	4.25	5.25	9
SCOTTS STANDARD	3	4	4.5	10
SCOTTS DELUXE EDGE GUARD	3	3.75	4.5	8
VIGORO 10000	5	6.5	7	12
VIGORO 15000	2	3	5	10
Drop Spreaders Model Modelos de esparcidores por goteo	1 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 1 libra (0,45 kg)*	2 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 2 libras (0,9 kg)*	3 lb. Rate Setting* Graduación de tasa de 3 libras (1,4 kg)*	Distance Between Passes (Ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS ACCUGREEN 1000	2	3.25	4.25	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 2000	2	3.25	4	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 3000	2	3.25	4.5	N/A

*Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.

TIP: 1000 sq. ft. = 20 ft. x 50 ft.

Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.

*Las graduaciones son aproximadas. El estado del esparcidor, la velocidad a la que se camina, y la irregularidad del terreno pueden afectar la tasa de aplicación. Debe calibrarse el esparcidor de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

CONSEJO: 1000 pies cuadrados = 20 pies x 50 pies (93 m² = 6,1 m x 15,2 m)

No usar un esparcidor que aplique los gránulos en franjas demasiado angostas, concentradas o irregulares. Asegúrese de que el esparcidor funcione correctamente y espazas los gránulos en forma pareja.

Produced for: Bayer Advanced, A Division of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 21.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709
6-cyfluthrin is the chemical name for Tempo® Ultra Insecticide.
Imidacloprid is the chemical name for Merit® Insecticide.

Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), Tempo®, Merit®, Bayer Advanced® are trademarks of Bayer

EPA Reg. No. 72155-31

Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(77) = 070989-400-001 (79) = 5905-GA-01 (89) = 9198-AL-01

(68) = 67572-GA-1 (36) = 9198-OH-1M (93) = 9198-OH-2B

(46) = 5905-IA-01

0579275714h 1321204V1

IMPORTANTE - Indicaciones para almacenamiento y eliminación

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete bajo llave.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA: Si está vacío: • Contenedor no reusable. No llenar ni volver a utilizar este contenedor. • Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reducir si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para obtener indicaciones para la eliminación. • Nunca deseche el producto sin usar en una alcantarilla interna o externa.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

- Perjudicial si se ingiere o absorbe por la piel. • Causa leve irritación en los ojos. • Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. • Lavar bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar goma de mascar, consumir tabaco, o ir a los sanitarios. • Sacar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente.

PRIMEROS AUXILIOS +

SI SE INGERIE • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de envenenamiento. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

SI SE INHALA • Mover a la persona a un lugar fresco. • Si la persona no respira, llame al 911 o a la ambulancia, luego realice respiración artificial, preferentemente por boca, de ser posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para asesoramiento sobre el tratamiento a seguir.

EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA • Sacar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llamar a un médico o centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CONTACTO CON LOS OJOS • Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. • Retirar las lentes de contacto si tuviera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Cuando llame a un centro de control de envenenamiento, tenga a la etiqueta a su alcance. Si requiere de tratamiento en una sala de emergencia o en el consultorio de su médico, lleve la etiqueta del producto con usted para mostrarle al personal médico.

Puede llamar al número gratuito 1-877-229-3763 para obtener información de emergencia médica.

Ingredientes activos: 0,15% Imidacloprid (CAS N° 138261-41-3), y 0,05% Beta-cyfluthrin (CAS N° 68359-37-5).

RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces. • Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurre en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando el clima está calmo y no haya probabilidad de lluvia para las próximas 24 horas garantizará que el viento o la lluvia no dispersen o escurren el pesticida del área de tratamiento. Si se realiza el bandedo del producto que se acumula en entradas de auto, veredas, o calles hacia el área tratada del césped o jardín ayudará a evitar el escorrentamiento a cursos de agua o sistemas de drenaje. • Aplique este producto solamente como se especifica en la etiqueta.

NOTA: Las pruebas y las investigaciones han determinado que las "Indicaciones de Uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad, en la medida en que esté de acuerdo con la ley vigente, por la falta de rendimiento o seguridad si el producto no es utilizado según las indicaciones de uso. **Garantía de devolución de dinero:** Si no está satisfecho con este producto, gustosamente le devolveremos el valor original de compra.

