


191

(REV 6-28-10)



CUÁNDO COSECHAR

Si se usa para controlar malezas alrededor de frutas o nueces, espere el número de días que se indica a continuación antes de cosechar:

- Cítricos (cítro, toronja, quince), limón amarillo, limón verde, naranja, mandarina, pomelo, tangelo, mandarina), guayaba, papaya - 1 día.
- Nueces (almendra, nuez del haya, nuez del Brasil, nogal blanco, nuez de la India, castaña, avellana púrpura, avellana, nuez de nogal americano, macadamia, nuez pecana, pistacho, nuez de castilla) - 3 días.
- Manzana, aguacate, banana (plátano), moras (excepto arándanos), dátiles, higos, uvas, nísperos, granada china, peras, caqui, granadas, membrillos - 14 días.
- Chabacanos, cerezas, nectarinas, aceitunas, duraznos, ciruelas, ciruelas pesas - 17 días.
- Arándanos - 30 días.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Gire la boquilla hasta la posición "OFF" (apagado) y guárdelo con el rociador por encima del nivel de líquido del envase para evitar derrames. Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego.

Eliminación: Envase no reutilizable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Si está vacío: Tirelo en la basura u ótrézalo para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Después de manipularlo, lávese muy bien con agua y jabón. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en alcantarillas pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando haga buen tiempo cuando no se pronostique lluvia en las siguientes 24 horas, asegure que ni el viento ni la lluvia sopie o quite el pesticida de la zona de tratamiento.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad para seguridad uso que no esté de acuerdo con las instrucciones. ¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-332-5553.

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 44579 41242 0

Ultra-Kill

Weed & Grass Killer

Herbicida para pastos y malezas

STARTS WORKING OVERNIGHT

Empieza a funcionar de un día para otro

- **KILLS WEEDS & UNWANTED GRASSES, ROOTS AND ALL**
- **USE IN FLOWER BEDS, VEGETABLE GARDENS, DRIVEWAYS & other listed use sites**

Net 1 gal
(128 fl oz/3.7 L)

ACTIVE INGREDIENTS:
 *Glyphosate, (N-(phosphonomethyl) glycine),
 in the form of its isopropylamine salt.....1.92%
 OTHER INGREDIENTS.....98.08%
 TOTAL.....100.00%
 *Acid equivalent or glyphosate content = 1.42%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION** See side panel for additional precautionary statements.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN** Consulte el folleto en la parte lateral para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

ESPAÑOL
VEA EL REVERSO



WHEN TO HARVEST

If used to control weeds around fruits or nuts, wait the following number of days before harvesting:

- Citrus (Citron, Grapefruit, Kumquat, Lemon, Lime, Mandarin Orange, Pummelo, Tangelo, Tangerine), Guava, Papaya – **1 day**.
- Nuts (Almond, Beechnut, Brazil Nut, Butternut, Cashew, Chestnut, Filbert, Hazelnut, Hickory Nut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut) – **3 days**.
- Apple, Avocado, Banana (Plantains), Berries (except Cranberries), Dates, Figs, Grapes, Loquat, Passion Fruit, Pear, Persimmon, Pomegranate, Quince – **14 days**.
- Apricot, Cherries, Nectarine, Olives, Peach, Plum, Prunes – **17 days**.
- Cranberries – **30 days**.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Turn the nozzle to "OFF" position and store with sprayer above the level of liquid in container to prevent leakage. Store in a cool, dry area away from heat or open flame.
Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

FIRST AID

If on Skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

If in Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-332-5553.

Distributed by Chemsico, Div. of United Industries Corp.
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-47-9688

EPA Est. Nos. 39754-WI-1(R), 9688-MO-1(U), 79533-WI-1(BT), 39609-MO-1(BM),

58996-MO-1(AE)

Circled letter is first letter of lot number. 17-13477 © 2010 UIC

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For home use only.



People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

WHEN TO APPLY

- For best results apply during warm, sunny weather (above 60°F).
- Apply when weeds are actively growing and no rain is forecast for 24 hours.
- To avoid drift to desirable plants, apply when the air is calm.
- Completely wet the foliage of the target vegetation. Do not overspray.
- Most treated weeds usually show initial symptoms in 2-4 days and complete kill in 1-2 weeks.
- Protect desirable plants, including fruit and vegetables, with a piece of plastic or cardboard.
- If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately.
- Do not mow, cut or otherwise disturb treated weeds or plants for at least 7 days following application.
- Rainfall or watering 2 hours after application will not wash away effectiveness.

Not recommended for spot weed treatment in established lawns since lawn grasses will be killed too.

HOW TO USE

Ultra-Kill® Weed & Grass Killer is pre-mixed and ready to use and is formulated for "spot" treatment of weeds and grasses. Use it on driveways and walkways, or around fences, trees, flower beds, vegetables, shrubs and other areas in your yard.

SPRAYER INSTRUCTIONS

How to prime and care for your sprayer:

1. CONNECT TRIGGER SPRAYER. UnscREW and discard the cap on the bottle. Insert the hose into the bottle and tighten the cap securely.
2. PRIME SPRAYER. Turn the sprayer nozzle one half-turn counterclockwise. Hold the sprayer lower than the bottle and squeeze the trigger several times until it sprays. Adjust the nozzle to coarse spray pattern. Avoid sprays which are too fine because they can drift and damage other plants.
3. Spray unwanted grass and weeds until completely wet.

WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted **1 day after** application.
- The following berries may be planted **1 day after** application: Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Cranberry, Currant, Dewberry, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry, Loganberry, Olallieberry and Raspberry (Black and Red).
- The following fruits, vegetables and herbs may be replanted **1 day after** application: Artichoke (Jerusalem), Beans (all), Beet Greens, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage (all), Carrot, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Chicory, Collards, Endive, Horseradish, Kale, Kohlrabi, Leek, Lentils, Lettuce, Mustard Greens, Okra, Onion, Rape Greens, Parsley, Parsnips, Potato, Radish, Rhubarb, Rutabaga, Spinach, Sweet Potato, Turnip and Yams.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **3 days after** application: Corn, Cucumber, Eggplant, Garlic, Gourds, Melons (all), Peas (all), Peppers (all), Pumpkin, Squash (summer and winter), Tomatillo, Tomato (by seed) and Watercress.
- Lawn grasses may be planted **7 days after** application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herbs may be planted **30 days after** application.

ALTO! LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Sólo para uso residencial.



No permita que las personas ni las mascotas entren en las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

CUÁNDO APLICAR

- Para obtener mejores resultados, aplique el producto cuando el clima esté cálido y soleado (temperaturas superiores a 60°F).
- Aplique cuando las malezas se encuentren en la etapa de desarrollo activo y no se pronostiquen lluvias por 24 horas.
- Aplique cuando no haya viento para evitar el arrastre hacia plantas deseables.
- Moje completamente el follaje de la vegetación que tiene como objetivo. No rocíe en exceso.
- La mayoría de las malezas tratadas generalmente muestran los primeros síntomas entre los 2 y los 4 días y la eliminación completa tiene lugar en 1 a 2 semanas.
- Proteja todas las plantas deseables, incluso frutas y hortalizas, con un trozo de plástico o cartón.
- Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lívelas inmediatamente con agua.
- No puede, corte, ni altere de ninguna otra manera a la vegetación tratada durante por lo menos 7 días después de la aplicación.
- La lluvia o el riego después de las 2 horas de la aplicación no reduce la eficacia.

No se recomienda para el tratamiento localizado de malezas en céspedes establecidos, ya que también los matará.

CÓMO USAR

El herbicida para pastos y malezas de Ultra-Kill® está formulado para el tratamiento "localizado" de malezas y pastos y viene preparado y listo para usar. Úselo en los caminos de entrada de automóviles y en senderos, o alrededor de cercas, árboles, lechos de flores, hortalizas, arbustos y otras zonas en su jardín.

INSTRUCCIONES DEL ROCIADOR

Cómo cebar y cuidar su rociador:

1. CONECTE EL GATILLO DEL ROCIADOR. Desenrosque y deseche la tapa de la botella. Introduzca la manguera en la botella y ajuste la tapa de modo que quede segura.
2. CEBE EL ROCIADOR. Gire la boquilla del rociador media vuelta en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Sostenga el rociador a nivel más bajo que el de la botella y apriete el gatillo varias veces hasta que salga el rocío. Ajuste la boquilla para descargar un rocío grueso. Evite el rocío demasiado fino porque puede ser arrastrado y dañar a otras plantas.
3. Rocíe las malezas y pastos no deseados hasta que estén completamente mojados.

CUÁNDO PLANTAR DE NUEVO

- Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales se pueden plantar **1 día después** de la aplicación.
- Los siguientes tipos de moras se pueden plantar **1 día después** de la aplicación: zarzamora, blueberry, mora de Boysen, arándano, grosella, dewberry, baya del saúco, grosella espinosa, arándano azul, mora de Logan, mora híbrida (olallieberry) y frambuesa (negra y roja).
- Las siguientes frutas, hierbas y hortalizas se pueden volver a plantar **1 día después** de la aplicación: alcachofa de Jerusalén, frijoles (todos), hojas de betabel, brócoli, coles de Bruselas, coles (todas), zanahoria, coliflor, apio, acelga (suiza), achicoria, berza, endibia, rábano picante, col rizada, colinabo, poro, lentejas, lechuga, hojas de mostaza, okra, cebolla, colza, perejil, chirivía, papa, rábano, rubarbo, nabo sueco, espinaca, papa dulce, nabo y camote.
- Las siguientes frutas, hierbas y hortalizas se pueden plantar **3 días después** de la aplicación: maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles, melones (todos), chicharos verdes (todos), pimientos y chiles (todos), calabaza (pumpkin), calabaza (de verano e invierno), tomatillo, tomate (por semilla) y berro.
- Los céspedes se pueden sembrar **7 días después** de la aplicación.
- Los tomates provenientes de transplantes y las frutas, hierbas y hortalizas que no están en la lista se pueden plantar **30 días después** de la aplicación.