

(New 0161101)

50032

192



WA OCT 05 2007 61160-49-91688



Weed & Grass Killer

Herbicida concentrado para pasto y maleza

CONCENTRATE

CONTAINS 41% GLYPHOSATE

Contiene 41% de glifosato

- ▶ **KILLS WEEDS & GRASSES TO THE ROOT**
- ▶ **USE IN FLOWER BEDS, ALONG FENCES & AROUND TREES, SHRUBS, DRIVEWAYS & WALKWAYS**
- ▶ **COVERS UP TO 6,300 SQ FT**

17-12504

ESPAÑOL
VEA EL REVERSO

Net 32 fl oz
(1 qt / 946 mL)

ACTIVE INGREDIENT:
*Glyphosate [N-(phosphonomethyl) glycine],
in the form of its isopropylamine salt 41.0%
OTHER INGREDIENTS 59.0%
TOTAL 100.0%
*Acid equivalent or glyphosate content = 30.34%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back booklet for additional
precautionary statements.



MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para
conocer las precauciones adicionales.

Cuándo plantar de nuevo:

Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales y los siguientes tipos de bayas, frutas, hierbas y hortalizas se pueden plantar **1 día** después de la aplicación.

Alcachofa (de Jerusalén), frijoles (todos), hojas de betabel, zarzamora, mora azul, mora híbrida (mora de Boysen), brócoli, coles de Bruselas, coles (todas), zanahoria, coliflor, apio, acelga (Suiza), achicoria, col rizada, arándano rojo, grosella negra, mora híbrida (dewberry), baya del saúco, endibia, grosella silvestre, rábano picante, arándano azul (huckleberry), berza común, colinabo, poro, lentejas, lechuga, mora de Logan, hojas de mostaza, okra, mora híbrida (ollaliberry), cebolla, perejil, chirivía, papa, rábano, colza, frambuesa (negra y roja), ruibarbo, rutabaga, espinaca, papa dulce, nabo y camote.

Las siguientes frutas, hierbas y hortalizas se pueden plantar **3 días** después de la aplicación:

Maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles (gourds), melones (todos), chícharos (todos), pimientos (todos), calabaza pumpkin, calabaza (de verano e invierno), tomate, tomate* (por semilla) y berro.

*Nota: Espere 3 días antes de plantar tomates de semilla y **30 días** para trasplantes de tomates de raíz. Los tomates provenientes de trasplantes y hortalizas que no están en la lista se pueden plantar **30 días** después de la aplicación.

Árboles frutales y nogales, bayas y plantas de vid: Deje pasar **21 días** antes de comer las frutas o nueces cuando use este producto para controlar malezas alrededor de árboles frutales o nogales, bayas y plantas de vid.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Use y guarde este producto solamente en su envase original. Guarde este producto en un área de almacenamiento segura lejos de fuentes de calor o del fuego. No permita que se congele.

Eliminación: Si está vacío: No vuelva a usar este envase. Tirelo en la basura, u ófrézcalo para reciclar, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno ni externo.

Derrame o filtración: En caso de derrame o filtración, absorba con toallas de papel y deseche en la basura.

PRECAUCIONES

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN

Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:

- Quite la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15-20 minutos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos.
- Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

También puede llamar al 1-800-332-5553 para obtener información sobre el tratamiento médico de urgencia.

Riesgos para el medio ambiente

No aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

¿Preguntas o Comentarios? Llame al 1-800-332-5553.

ALTO. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

Abra Aquí

Peel Here

Ultra-Kill™



READ & FOLLOW LABEL INSTRUCTIONS.

Weed & Grass Killer

Herbicida concentrado para pastos y malezas

CONCENTRATE

This container covers up to 6,300 sq ft.

What it Does: Kills unwanted weeds & grasses

Where to Use Outdoors:

- Driveways, walkways, curbs, patios
- Around fruits, trees, shrubs, flowers, vegetable gardens
- Along fences and sidewalks

Questions or Comments?

Call 1-800-332-5553.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Con este envase se pueden cubrir hasta 6,300 pies cuadrados.

Qué hace: Mata malezas y pastos no deseados

Dónde usar al aire libre:

- Caminos de entrada de automóviles, senderos, rebordes de aceras, patios
- Alrededor de árboles frutales, árboles, arbustos, flores, huertas
- A lo largo de cercas y aceras

¿Preguntas y comentarios?: Llame al 1-800-332-5553.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC

0 44579 41243 7

Made in the USA. Distributed by Chemisco Division of United Industries Corporation PO Box 142642 St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-49-9688 EPA Est. No. 1133-MO-1 (D) 98754-WI-1 (R) 39609-MO-1 (BM) 79533-WI-1 (BT) Circled letter is first letter of lot number 17-12503 ©2007 UIC

CONSUMER INFORMATION

This product will treat up to 6,300 sq ft (approx. size of 3 tennis courts) for 1 quart size.

Mixing directions: For best results use 2½ fl oz (5 Tbsp) per gallon of water. One gallon of water will treat approximately 300 sq ft.

Ultra-Kill™ Weed & Grass Killer Concentrate eliminates nearly all common weeds, grasses and unwanted vegetation. Add water and use along fences, in driveways, sidewalks, brick and gravel walkways, next to trees and shrubs, and around buildings to control weeds and unwanted vegetation. Use this product for edging landscapes. This product is suited for lawn renovation or to prepare large sites for planting of flower beds, vegetable gardens or wildlife food plots.

Important: This product is a non-selective herbicide that will kill all vegetation contacted. This herbicide kills unwanted plants by inhibiting the production of a substance found only in plants. It enters plants through the sprayed foliage and moves down to the roots. Avoid direct spray or drift onto desirable plants, lawn grasses, shrubs and trees. Protect desirable plants and vegetation with a piece of plastic or cardboard. If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately. Any **Ultra-Kill Weed & Grass Killer Concentrate** not absorbed by the plant is broken down into natural materials. This product has no soil activity and thus will not affect nearby untreated plants.

Do not mow, cut or otherwise disturb treated vegetation for at least seven days following application.

 **READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.**

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Note: See the “**CONSUMER INFORMATION**” section of this label for important information on protecting plants you like.

When to apply:

Apply to actively growing weeds, preferably before the seed heads form. Completely spray the foliage of the weeds and grasses you want to kill until thoroughly wet. It's best to apply on a warm, sunny day when daytime temperatures are above 60°F. Weed control is accelerated by warm, sunny weather. Apply when the wind is calm. Rain or watering two hours after application will not wash away effectiveness. Most treated weeds usually show initial symptoms in two to four days and complete kill in one to two weeks. Hard-to-control weeds may require a second application if not completely dead in four weeks.

How to apply:

This product is formulated for “spot” treatment of individual weeds and grasses or for treatment of large areas as instructed on this label (see specific site areas). Apply with a plastic, aluminum or stainless steel tank-type sprayer.

Do not apply with galvanized or unlined steel sprayer, or through any irrigation system or sprinkling can. Use a tank-type sprayer with a coarse spray nozzle for spot treatments. Use a hose-end sprayer to treat large areas such as for lawn renovation or to prepare sites for planting flower beds or vegetable gardens. Apply to evenly and thoroughly wet weeds and grasses.

Apply using any of the following equipment:

- Plastic, aluminum or stainless steel tank sprayer
- A hose-end sprayer recommended for weed killers
- Hand-trigger pump sprayer

Cleaning Application Equipment:

To clean sprayer after use, triple rinse sprayer and all sprayer parts with water. Spray rinse water on bare soil or gravel. After thorough cleaning, sprayer can be used for other products.

Use the following table to determine the amount of **Ultra-Kill™ Weed & Grass Killer Concentrate** to mix with water. Close cap tightly after use. No need to rinse cap.

1 teaspoon (tsp) • 1 Tablespoon (Tbsp) = 3 tsp • 1 fl oz (2 Tbsp) • 2 fl oz (4 Tbsp)

APPLICATOR	MIXING INSTRUCTIONS		AREA TO TREAT
	General Weed Control Annuals and seedling weeds	Tough Weed Control Perennials, brush or lawn renovation	
Tank Sprayer	Use 1½ oz (3 Tbsp) of product in 1 gallon of water.	Use 2½ oz (5 Tbsp) of product in 1 gallon of water.	300 sq ft (30 ft x 10 ft) or use for spot treatments
Hose-End Sprayer	Add 1½ oz (3 Tbsp) of product to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 1½ oz and spray.	Add 2½ oz (5 Tbsp) of product to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 2½ oz and spray.	300 sq ft (30 ft x 10 ft)
6 gallon Hose-End Sprayer	Add 6 oz (12 Tbsp) of product to sprayer jar. Fill to the 4 gallon mark and spray.	Add 10 oz (20 Tbsp) of product to sprayer jar. Fill to the 4 gallon mark and spray.	1,200 sq ft (30 ft x 40 ft)
Hand Trigger Sprayers 24 oz capacity	Use 2 tsp in 24 oz of water.	Use 1 Tbsp in 24 oz of water.	Use for spot treatments or apply to single weeds.
Hand Trigger Sprayers 32 oz capacity	Use 2⅔ tsp in 32 oz of water.	Use 1⅓ Tbsp in 32 oz of water.	Use for spot treatments or apply to single weeds.

This product can be used to refill Ultra-Kill Ready-To-Use Weed & Grass Killer, following mixing directions on the label. Use the mixed solution within two weeks.

Where to use:

General weed control: Use near fences, in paths, patios, sidewalks, curbs and driveways, around ornamental trees, shrubs, flower beds and plantings and around buildings. Controls weeds in brick and gravel walks. Use for trimming and edging landscapes. NOT recommended for spot weed treatment in lawns, since this product kills all green plants, including lawn grasses. If replacing a lawn or parts of a lawn, see “**For lawn renovation/replacement**” recommendations on this label.

Spot treatments: Direct spray on undesirable weeds and grasses in and around flower beds, ornamental trees, fruit and nut trees, grapevines, shrubs, fences, driveways and walkways. Spray when air is calm. Prevent this product's spray from contacting the leaves, green stems, or exposed roots of plants you like. Use a cardboard or plastic shield to protect desirable plants from spray or drift. This product will not move in or on the soil to untreated plants. If this product is used to control weeds around fruit or nut trees or grapevines, wait **21 days** before eating the fruit or nuts.

Landscapes: For use in preparing areas for planting of ornamentals, trees, shrubs, desert landscapes, rock gardens, flower beds or similar plantings. Treated areas can be planted **one day** after treatment.

Wildlife areas site preparation: Use this product to prepare areas for planting wildlife food plots. Exotic or undesirable plants can be controlled with this product to allow for planting or recovery of native plant species. Spot treatments may be directed to selectively remove unwanted plants. Avoid spray drift to desirable plants.

For lawn renovation/replacement: Use this product to kill existing vegetation (weeds and grasses and the old lawn). Apply in spring or fall, when daytime temperatures are at least 60°F for best results. If the lawn is dry, water lawn every other day for seven days before applying this product. Do not mow for seven days before or after treatment.

Use 2½ fl oz per gallon of water for each 300 sq ft of area to treat. Wait seven days after application to prepare the soil by raking, leveling or rototilling. Rake up and remove loosened thatch or debris. Work in starter fertilizer and soil amendments, if needed. Level the soil.

Sow new seed according to directions on seed package, or install sod. Grass seed must have good contact with soil to germinate and grow. Use temporary mulch such as straw to conserve moisture. Keep area moist for two weeks to establish new lawn. Water as needed.

To control brush or vines: Apply to green and actively growing brush or vines. For plants taller than 5 feet, cut them back and spray the regrowth. Fall applications to brush may delay control to the following season. A second application may be required on hard-to-control species such as blackberry, kudzu, or poison oak.

To kill vines growing up a pole, fence or mature tree trunk, cut vine to a height of 3 to 4 ft and spray thoroughly covering remaining vine. If vine is climbing a shrub or immature (green) tree trunk, to avoid damage to these plants, cut vine at base and treat as directed for stumps or spray regrowth. If spraying regrowth shield shrub and green trunk from drift with a sheet of plastic or cardboard.

Stump treatment: Stumps can be treated to prevent regrowth. Apply this product when vegetation is actively growing or immediately (within 5 minutes) after being cut down.

- Cut stump close to the soil surface.
- Make 4 to 5 nail holes into the stump.
- Flood the stump with undiluted product.

This treatment will suppress or control many types of woody brush and trees, such as alder, bluegum eucalyptus, madrone, oak, giant reed, saltcedar, sweetgum, and tan oak.

When to replant:

All ornamental flowers, trees and shrubs, and the following berries, fruits, vegetables and herbs, may be planted **one day after** application.

Artichoke (Jerusalem), beans (all), beet greens, blackberry, blueberry, boysenberry, broccoli, Brussels sprouts, cabbage (all), carrot, cauliflower, celery, chard (Swiss), chicory, collards, cranberry, currant, dewberry, elderberry, endive, gooseberry, horseradish, huckleberry, kale, kohlrabi, leek, lentils, lettuce, loganberry, mustard greens, okra, olallieberry, onion, parsley, parsnips, potato, radish, rape greens, raspberry (black and red), rhubarb, rutabaga, spinach, sweet potato, turnip and yams.

The following fruits, vegetables and herbs may be planted **three days after** application:

Corn, cucumber, eggplant, garlic, gourds, melons (all), peas (all), peppers (all), pumpkin, squash (summer and winter), tomatillo, tomato* (by seed) and watercress.

*Note: Wait 3 days before planting tomatoes from seed and **30 days** for rooted tomato transplants. For tomato transplants or vegetables not listed, wait **30 days** after spraying before planting into treated soil.

Fruit and nut trees, caneberries and grapevines: Allow **21 days** before eating the fruits or nuts when using this product to control weeds around fruit or nut trees, caneberries and grapevines.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Use and store this product only in its original container. Store product in a secure storage area away from sources of heat or open flame. Protect product from freezing.

Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Spill or leak: In case of spill or leak, soak up with paper towels and discard in trash.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

FIRST AID

IF ON SKIN:

- Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

You may also call 1-800-332-5553 for emergency medical treatment information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-800-332-5553.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Con este producto se pueden tratar hasta 6,300 pies cuadrados (aproximadamente el tamaño de 3 canchas de tenis) para el tamaño de 1 cuarto.

Instrucciones de mezclado: Para obtener mejores resultados use 2½ onzas líquidas (5 cdas. soperas) por galón de agua. Con un galón de agua se pueden tratar aproximadamente 300 pies cuadrados.

El herbicida concentrado para pastos y malezas elimina casi todas las malezas y pastos comunes y la vegetación no deseada. Agregue agua y use a lo largo de cercas, en caminos de entrada de automóviles, aceras, senderos de ladrillo y grava, cerca de árboles y arbustos y alrededor de edificios para controlar malezas y vegetación no deseada. Use este producto para formar bordes de jardines. Este producto es adecuado para la renovación del césped o para preparar sitios grandes para plantar lechos de flores, huertas o parcelas de especies silvestres comestibles.

Importante: Este producto es un herbicida no selectivo que elimina toda la vegetación con la que entra en contacto. Este producto elimina la vegetación no deseada al inhibir la producción de una sustancia que sólo se encuentra en las plantas. Entra en las plantas a través del follaje rociado y se mueve hacia abajo hasta las raíces. Evite el rocío directo o el arrastre sobre plantas, céspedes, arbustos y árboles deseables. Proteja a las plantas y a la vegetación deseable con un trozo de plástico o cartón. Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua. Todo el **herbicida concentrado para pastos y malezas** que la planta no absorba se degrada en sustancias naturales. Este producto no tiene actividad en el suelo y por lo tanto no afecta a las plantas sin tratar cercanas.

No pode, ni altere de ninguna otra manera la vegetación tratada durante al menos 7 días después de la aplicación.

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

Nota: Consulte la sección "INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR" de esta etiqueta para conocer información importante sobre cómo proteger las plantas que le gustan.

Cuándo aplicar: Aplique a las malezas en la etapa de crecimiento activo, preferentemente antes de que se forme la cabeza de la semilla. Rocíe completamente el follaje de las malezas y pastos que desea matar hasta que esté bien mojado. Es mejor aplicar en un día cálido y soleado cuando las temperaturas superen los 60°F. El clima cálido y soleado acelera el control de malezas.

Aplique cuando no haya viento. La lluvia o el riego dos horas después de la aplicación no reducen la eficacia. En general, en la mayoría de las malezas tratadas los primeros síntomas aparecen entre los siguientes 2 y 4 días y la eliminación completa tiene lugar en 1 a 2 semanas. Las malezas difíciles de controlar pueden requerir una segunda aplicación si no han muerto en cuatro semanas.

Cómo aplicar: Este producto está formulado para el tratamiento "localizado" de malezas y pastos individuales o para el tratamiento de áreas grandes según se indica en esta etiqueta (consulte las áreas específicas). Aplique con un rociador tipo tanque de plástico, aluminio o acero inoxidable.

No lo aplique con un rociador de acero galvanizado o sin revestimiento, ni mediante ningún sistema de riego ni regadera. Use un rociador tipo tanque con una boquilla para rocío grueso para tratamientos localizados. Use un rociador con aplicador tipo manguera para tratar áreas grandes como por ejemplo en la renovación del césped o para preparar sitios para plantar lechos de flores o huertas. Aplique de modo de mojar uniforme y completamente malezas y pastos.

Aplique mediante cualquiera de los equipos siguientes:

- Rociador con tanque de plástico, aluminio o acero inoxidable
- Un rociador con aplicador tipo manguera recomendado para herbicidas
- Rociador de bomba con gatillo manual

Limpeza del equipo de aplicación:

Para limpiar el rociador después del uso, enjuague tres veces con agua el rociador y todas sus piezas. Rocíe el agua del enjuague en la tierra desnuda o la grava. Después de una minuciosa limpieza, el rociador se puede usar para otros productos.

Use la tabla siguiente para determinar la cantidad de **herbicida concentrado para pastos y malezas** que se debe mezclar con agua. Cierre la tapa herméticamente después de usar. No es necesario enjuagar la tapa.

1 cucharadita (cdta.) • 1 cucharada sopera (cdas. soperas) = 3 cucharaditas • 1 onza líquida (2 cdas. soperas) • 2 onzas líquidas (4 cdas. soperas)

APLICADOR	INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA		ÁREA A TRATAR
	Control general de malezas Malezas anuales y de semillero	Control de malezas difíciles de matar Plantas perennes, matorrales o renovación de césped	
Rociador con tanque	Use 1½ onzas de producto (3 cdas. soperas) en 1 galón de agua.	Use 2½ onzas de producto (5 cdas. soperas) en 1 galón de agua.	300 pies cuadrados (30 pies x 10 pies) o use para tratamientos localizados
Rociador con aplicador tipo manguera	Agregue 1½ onzas (3 cdas. soperas) de producto a la jarra del rociador. NO AGREGUE AGUA. Ajuste el selector en la posición de 1½ onzas y rocíe.	Agregue 2½ onzas (5 cdas. soperas) de producto a la jarra del rociador. NO AGREGUE AGUA. Ajuste el selector en la posición de 2½ onzas y rocíe.	300 pies cuadrados (30 pies x 10 pies)
Rociador con aplicador tipo manguera de 6 galones	Agregue 6 onzas (12 cdas. soperas) de producto a la jarra del rociador. Llène hasta la marca de 4 galones y rocíe.	Agregue 10 onzas (20 cdas. soperas) de producto a la jarra del rociador. Llène hasta la marca de 4 galones y rocíe.	1,200 pies cuadrados (30 pies x 40 pies)

Rociadores con gatillo manual 24 onzas de capacidad	Use 2 cdas. en 24 onzas de agua.	Use 1 cdas. soperas en 24 onzas de agua.	Use para tratamientos localizados o aplique a malezas individuales.
Rociadores con gatillo manual 32 onzas de capacidad	Use 2⅔ cdas. en 32 onzas de agua.	Use 1⅓ cdas. soperas en 32 onzas de agua.	Use para tratamientos localizados o aplique a malezas individuales.

Este producto se puede usar para rellenar Ultra-Kill Ready-To-Use Weed & Grass Killer (herbicida concentrado para pastos y malezas listo para usar) listo para usar, siguiendo las instrucciones de mezclado de la etiqueta. Use la solución mezclada en el plazo de dos semanas.

Dónde utilizar:

Control general de malezas: Úselo en las proximidades de cercas, en senderos, patios, aceras, rebordes de aceras y caminos de entrada de automóviles; alrededor de árboles ornamentales, arbustos, lechos de flores y plantaciones y alrededor de edificios. Controla las malezas en senderos de ladrillo y grava. Use para el recorte y bordeado de jardines. NO se recomienda para el tratamiento localizado de malezas en céspedes, ya que este producto mata todas las plantas verdes, inclusive céspedes. Si va a reponer un césped o partes de un césped, consulte las recomendaciones "Para renovación o reposición del césped" en esta etiqueta.

Tratamientos localizados: Rocíe directamente sobre las malezas y pastos indeseables que se encuentren en y alrededor de lechos de flores, árboles ornamentales, frutales y nogales, plantas de vid, arbustos, cercas, caminos de entrada de automóviles y senderos. Rocíe cuando no haya viento. Evite que el rocío de este producto entre en contacto con las hojas, tallos verdes o raíces expuestas de las plantas que le gusten. Use una lámina de cartón o plástico para proteger las plantas deseables del rocío o el arrastre. Este producto no se transportará en ni sobre la tierra a plantas no tratadas. Si este producto se utiliza para controlar malezas alrededor de árboles frutales, nogales o plantas de vid, espere **21 días** antes de comer las frutas o las nueces.

Jardinería ornamental: Para usar en la preparación de superficies para cultivar plantas ornamentales, árboles, arbustos, paisajes con plantas del desierto, jardines de piedras, lechos de flores o plantaciones similares. Las áreas tratadas se pueden replantar **un día** después del tratamiento.

Acondicionamiento de terrenos para zonas de especies silvestres: Utilice este producto en el acondicionamiento de áreas para plantar parcelas de especies silvestres comestibles. Con este producto se pueden controlar las plantas exóticas o indeseables para permitir la siembra o recuperación de especies de plantas autóctonas. Los tratamientos localizados se pueden dirigir de manera de eliminar selectivamente las plantas no deseadas. Evite el arrastre del rocío hacia las plantas deseables.

Para renovación o reposición del césped: Use este producto para eliminar la vegetación existente (malezas y pastos y el césped anterior). Para obtener mejores resultados, aplíquelo durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas diurnas alcancen 60°F por lo menos. Si el césped está seco, néguelo un día si y otro no durante siete días antes de aplicar este producto. No pde durante los 7 días anteriores ni posteriores al tratamiento.

Utilice 2½ onzas líquidas por galón de agua cada 300 pies cuadrados de superficie a tratar. Espere que transcurran 7 días después de la aplicación para preparar el suelo con rastrillo, niveladora o rotocultivador. Rastrille y retire la paja o los residuos sueltos. Si es necesario, mezcle el fertilizante inicial y los acondicionadores del suelo. Nivele el suelo.

Plante las nuevas semillas de acuerdo a las instrucciones del envase o coloque los panes de césped. Las semillas de césped deben mantener un buen contacto con el suelo para que puedan germinar y crecer. Use mantillo temporal como paja para conservar la humedad. Mantenga el área húmeda durante 2 semanas para que el césped nuevo se establezca. Riegue cuando sea necesario.

Para controlar matorrales o enredaderas: Aplíquelo a los matorrales o enredaderas verdes y en la etapa de crecimiento activo. En el caso de plantas que tengan una altura superior a 5 pies, dódelas y rocíe el rebrote. Las aplicaciones de otoño a los matorrales pueden retrasar el control hasta la estación siguiente. Puede ser necesaria una segunda aplicación en especies difíciles de controlar como zarzamora, kudúz o roble venenoso.

Si la enredadera está creciendo sobre un poste, una cerca o el tronco de un árbol adulto, córtela hasta una altura de 3 a 4 pies y rocíela de modo de cubrir completamente lo que queda ella. Si la enredadera está trepando sobre un arbusto o un tronco de árbol inmaduro (verde), para evitar que esas plantas sufran daño, córtela en la base y trátala como se indica para tocones o rocíe el rebrote. Si rocía, proteja el arbusto y el tronco verde del arrastre del rocío con una lámina de plástico o cartón.

Para el tratamiento de tocones: Los tocones se pueden tratar para prevenir el rebrote. Aplique este producto cuando la vegetación se encuentre en la etapa de crecimiento activo o inmediatamente después de haberlo cortado (dentro de los 5 minutos).

- Corte el tocón cerca de la superficie del suelo.
- Efectúe 4-5 agujeros de clavo en el tocón.
- Inunde el tocón con el producto sin diluir.

Este procedimiento controla o elimina muchos tipos de árboles y matorrales leñosos, como por ejemplo: Aliso, eucalipto de Australia, especies del género Arbutus, roble, caña brava, tamarisco, liquidámbar y la especie tan oak.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

FIRST AID

IF ON SKIN: • Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-332-5553.

PRECAUCIONES

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: • Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: • Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. • Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-332-5553.

MADE IN THE **USA** Distributed by Chemsico
Division of United Industries Corp.

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-49-9688

EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 39754-WI-1 (R), 39609-MO-1 (BM), 79533-WI-1 (BT)

Circled letter is first letter of lot number.

17-12503 © 2007 UIC