



GROUP 4A INSECTICIDE

Optigard[®] Flex
Liquid

syngenta.

Insecticide

Active Ingredient:

Thiamethoxam (CAS No. 153719-23-4) 21.6%

Other Ingredients: 78.4%

Total: 100.0%

Optigard Flex Liquid is a suspension concentrate (SC) formulation.

Optigard Flex Liquid contains 2 pounds thiamethoxam per gallon formulated product (244 grams thiamethoxam per liter formulated product).

EPA Reg. No. 100-1306

EPA Est. No. 61282-WI-1

- For control of listed pests: including cockroaches, ants (except carpenter ants and Pharaoh ants), fire ants, yellow jackets, wasps and beetles
- For control of localized infestations of drywood termites, subterranean termites, carpenter bees, and wood-destroying beetles and borers

Do not use this product as the sole source of control for active, structural infestations by subterranean termites; the purpose of this application is to kill workers or winged reproductive forms of termites which are present at the time of treatment. It is not intended to provide structural pest control. It is not a substitute for mechanical alteration, soil and foundation treatment, but merely a supplement. For active, structural infestations by subterranean termites, this product can only be used to supplement a federally registered conventional product that is registered as a sole source for termite control. This product will not eliminate termite infestations or provide protection against future infestations.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CAUTION

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle. (If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)

See additional precautionary statements and directions for use in booklet.

SCP 1306A-L1H 0216 4063261

8 fluid ounces Net Contents


FIRST AID	
If inhaled	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If in eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

FIRST AID (<i>continued</i>)	
If swallowed	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.	
HOT LINE NUMBER For 24-Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call 1-800-888-8372	

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Harmful if inhaled or absorbed through skin. Do not breathe vapor or spray mist. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

Personal Protection Equipment (PPE)

Applicators and other handlers must wear:

- Long-sleeved shirt and long pants
- Chemical-resistant gloves made of any waterproof material - Category A (e.g., natural rubber, ≥ 14 mils)
- Shoes plus socks

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions exist for washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

User Safety Recommendations:

- Wash hands thoroughly before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

Environmental Hazards

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming plants or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming plants or weeds if bees are foraging.

This pesticide is toxic to wildlife and highly toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment wash water.

PROTECTION OF POLLINATORS



APPLICATION RESTRICTIONS EXIST FOR THIS PRODUCT BECAUSE OF RISK TO BEES AND OTHER INSECT POLLINATORS. FOLLOW APPLICATION RESTRICTIONS FOUND IN THE DIRECTIONS FOR USE TO PROTECT POLLINATORS.



Look for the bee hazard icon in the Directions for Use for each application site for specific use restrictions and instructions to protect bees and other insect pollinators.

This product can kill bees and other insect pollinators.

Bees and other insect pollinators will forage on plants when they flower, shed pollen, or produce nectar.

Bees and other insect pollinators can be exposed to this pesticide from:

- Direct contact during foliar applications, or contact with residues on plant surfaces after foliar applications
- Ingestion of residues in nectar and pollen when the pesticide is applied as a seed treatment, soil, tree injection, as well as foliar applications.

When Using This Product Take Steps To:

- Minimize exposure of this product to bees and other insect pollinators when they are foraging on pollinator attractive plants around the application site.
- Minimize drift of this product on to beehives or to off-site pollinator attractive habitat. Drift of this product onto beehives or off-site to pollinator attractive habitat can result in bee kills.

Information on protecting bees and other insect pollinators may be found at the Pesticide Environmental Stewardship website at: <http://pesticidestewardship.org/PollinatorProtection/Pages/default.aspx>.

Pesticide incidents (for example, bee kills) should immediately be reported to the state/tribal lead agency. For contact information for your state, go to:

www.aapco.org/officials.html. Pesticide incidents should also be reported to the National Pesticide Information Center at: www.npic.orst.edu or directly to EPA at: beekill@epa.gov

Physical or Chemical Hazards

Do not use, pour, spill or store near heat or open flame.

CONDITIONS OF SALE AND LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY

NOTICE: Read the entire Directions for Use and Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability before buying or using this product. If the terms are not acceptable, return the product at once, unopened, and the purchase price will be refunded.

The Directions for Use of this product must be followed carefully. It is impossible to eliminate all risks inherently associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as manner of use or application, weather or crop conditions, presence of other materials or other influencing factors in the use of the product, which are beyond the control of SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC or Seller. To the extent permitted by applicable law, Buyer and User agree to hold SYNGENTA and Seller harmless for any claims relating to such factors.

SYNGENTA warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated in the Directions for Use, subject to the inherent risks referred to above, when used in accordance with directions under normal use conditions. To the extent permitted by applicable law: (1) this warranty does not extend to the use of this product contrary to label instructions or under conditions not reasonably foreseeable to or beyond the control of Seller or SYNGENTA, and (2) Buyer and User assume the risk of any such use. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SYNGENTA MAKES NO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE NOR ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEPT AS WARRANTED BY THIS LABEL.

To the extent permitted by applicable law, in no event shall SYNGENTA be liable for any incidental, consequential or special damages resulting from the use or handling of this product. **TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE USER OR BUYER, AND THE EXCLUSIVE LIABILITY OF SYNGENTA AND SELLER FOR ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, INJURIES OR DAMAGES (INCLUDING CLAIMS BASED ON BREACH OF WARRANTY, CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE) RESULTING FROM**

THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT, SHALL BE THE RETURN OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT OR, AT THE ELECTION OF SYNGENTA OR SELLER, THE REPLACEMENT OF THE PRODUCT.

SYNGENTA and Seller offer this product, and Buyer and User accept it, subject to the foregoing Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability, which may not be modified except by written agreement signed by a duly authorized representative of SYNGENTA.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Do not apply Optigard Flex Liquid while bees are foraging. Do not apply Optigard Flex Liquid to plants that are flowering. Only apply after all flower petals have fallen off.

Resistance Management

Optigard Flex Liquid belongs to the neonicotinoid class of chemistry (Group 4A Insecticide). Pests that are resistant to insecticides

in other chemical classes are not known to be cross-resistant to Optigard Flex Liquid. However, insect pests are known to develop resistance to products used repeatedly for control. As resistance development cannot be predicted, the use of Optigard Flex Liquid should conform to sound resistance management strategies established for the use site. Strategies should include rotation of chemicals with different modes of action, limitation of the number of successive generations of the target pest being treated with the same compound, and adherence to labeled directions.

Consult your local pest control advisor or extension office for additional methods for preventing resistance development. SYNGENTA encourages responsible product stewardship to ensure effective long-term control of the insect pests on this label.

USE RESTRICTIONS

- Do not apply this product in a way that will contact any other person. Only protected applicators may be in the area during application. Keep people or pets away from treated area until dry.
- In living areas, do not apply Optigard Flex Liquid as a broadcast spray. In these areas use only as a void application, or as a spot treatment (e.g., under and/or behind appliances) or crack-and-crevice application in areas where occupants will not be exposed to direct contact.
- When applying Optigard Flex Liquid as a crack-and-crevice or spot treatment in living areas, do not exceed 0.5 gallons/1,000 sq ft of a 0.1% finished dilution.
- For void applications, do not apply until location of heat pipes, ducts, water and sewer lines, and electrical conduits are known. Caution must be taken to avoid puncturing and injection into these structural elements. Do not apply into electrical switches or receptacles or other wiring where electrical shock hazards exist.

- DO NOT apply this product, by any application method, to linden, basswood, or *Tilia* species.

APPLICATION PROCEDURES

Optigard Flex Liquid must be applied as a diluted finished application using mixing directions contained in this label. Treatment techniques used should provide placement of the product in the infested areas or as near as possible. Optigard Flex Liquid may be applied to structural voids, in cracks, crevices, corners or other out-of-the-way places, such as under and behind kitchen appliances and baseboards, under sinks, around window and door frames, pipes and water heaters and in the attic, crawl space and garage. Acceptable locations for treatment also include non-living space areas including crawl spaces, attics and unfinished basements. Applications may be made as a crack-and-crevice spray, a coarse, low-pressure spot spray, a surface spray or as a structural void application. Application to structural voids such as wall voids may be done by drilling a small hole into the void area or using a self-puncturing tip and injecting diluted product so that surfaces inside the void area are treated. Existing holes created by construction features may also be used to gain access to void treatment areas.

As described in the section on **Control of Pests in Voids**, closed, in-wall delivery systems may be used to apply product to the surfaces inside void areas.

Optigard Flex Liquid may also be used as a banded, spot treatment or crack-and-crevice application to perimeter exterior areas of structures for control of listed pests.

For remedial control of wood-destroying insects including dry-wood termites, wood-destroying beetles, and carpenter bees, Optigard Flex Liquid may be used as a spot treatment, wood surface application, or void application.

MIXING PROCEDURES

Mixing

Refer to **Application Dilution Table** for proper amount of Optigard Flex Liquid to be used to achieve the correct dilution. Refer to Use Directions of specific pest for application procedure and use rates.

To prepare the application mixture, fill the application tank 1/4 - 1/3 of desired volume with water before adding Optigard Flex Liquid. Then slowly add the required amount of Optigard Flex Liquid. Add the remaining amount of water and agitate until product is thoroughly mixed.

Application Dilution Table

Gallons of Finished Solution Desired	Amount in fl oz (or ml) of Optigard Flex Liquid Needed to Obtain the Following % Dilutions of Active Ingredient:	
	0.05%	0.1%
1	0.27 fl oz (8 ml)	0.54 fl oz (16 ml)
3	0.81 fl oz (24 ml)	1.62 fl oz (48 ml)
5	1.35 fl oz (40 ml)	2.71 fl oz (80 ml)
6	1.62 fl oz (48 ml)	3.24 fl oz (96 ml)
10	2.71 fl oz (80 ml)	5.41 fl oz (160 ml)

DELIVERY OF OPTIGARD FLEX LIQUID WITH FOAM

The diluted finished product may be converted to foam and applied to control pest infestations. Depending on the circumstances, foam applications may be used alone or in combination with liquid applications.

Foam Mixing Procedures and Application

Using the following table, mix the appropriate amount of Optigard Flex Liquid in water with the foaming manufacturer's recommended volume of foaming agent for application by foaming equipment.

Mixing Table for Optigard Flex Liquid Foam

Amount of Optigard Flex Liquid	Gallons of Water	Foam Expansion Ratio	Finished Foam (gallons)	Finished Dilution (% active ingredient)
1.35 fl oz (40 ml)	1	5:1	5	0.05
2.71 fl oz (80 ml)	1	10:1	10	
4.0 fl oz (120 ml)	1	15:1	15	
6.76 fl oz (200 ml)	1	25:1	25	
2.71 fl oz (80 ml)	1	5:1	5	0.1
5.41 fl oz (160 ml)	1	10:1	10	
8.0 fl oz (240 ml)	1	15:1	15	
13.53 fl oz (400 ml)	1	25:1	25	

CONTROL OF WOOD-DESTROYING INSECTS

Use Optigard Flex Liquid to control the following wood-destroying insects. For specific application instructions refer to label text.

Pest	Application Method	Finished Dilution (% active ingredient)	Comments
Drywood Termites Remedial Control	Foam – Galleries Liquid – Galleries	0.1%	Re-treat as directed.
Carpenter Bees	Liquid or Foam – Gallery treatment	0.1%	
Wood-Destroying Beetles and Borers	Liquid or Foam-Gallery or Wood Surface treatment	0.1%	

Pest	Application Method	Finished Dilution (% active ingredient)	Comments
Subterranean termites-workers and reproductives (kills only)	Liquid application to existing infestations	0.05-0.1%	NOT intended for structural protection or as a stand-alone treatment. See SUBTERRANEAN TERMITES section of this label for details.

*Finished dilution of foam applications based on concentration in finished foam (See Mixing Table for Optigard Flex Liquid Foam in **MIXING PROCEDURES**.)

Control of Drywood Termites

When used as specified in this label, Optigard Flex Liquid provides effective remedial control of localized infestations of drywood termites, including species of *Incisitermes*, *Cryptotermes* and *Marginitermes*. Knowledge of the biology and behavior of the drywood termite species involved, the locations, and the extent of the infestation(s) will help to ensure successful control.

Treatment requirements for drywood termite control may vary due to state and local regulations. For advice concerning current drywood termite control regulations under local conditions, consult your State structural pest control regulatory agency.

Directions for Remedial Control of Drywood Termites in Infested Wood

To control drywood termites in localized areas of infested wood in structures, apply 0.1% Optigard Flex Liquid as a liquid or foam to voids and galleries in damaged wood, in spaces between wooden structural members or between wood and foundations. Locate galleries by using visual

signs (e.g., fresh fecal pellets or blistered wood), the presence of live pests, mechanical sounding techniques (tapping on the wood surface and listening for changes in sound to indicate changes in wood density), listening devices, motion detection devices or other technologies that help pinpoint drywood termite activity.

Wood Injection Method

Drill small diameter holes of appropriate size for the injection tip, or use a self-puncturing tip, positioned to intersect termite galleries within infested wood. Drywood termite emergence or pellet kick-out holes connect directly to galleries and are indicators of potential sites to drill and inject Optigard Flex Liquid. Care should be taken to avoid electrical wiring, plumbing, etc., when drilling and injecting. Do not drill or puncture completely through wood. Spacing of the holes will depend on the distribution of insect activity and galleries. Injection holes may be clustered in areas with insect activity as indicated by damage, live insects, or other indicators previously described. Injection holes on opposite sides of large (4 inches x10 inches or larger) structural beams may be necessary to effectively penetrate galleries.

Apply up to 50 ml (1.7 fl oz) of finished liquid solution of Optigard Flex Liquid at each injection hole. If using Optigard Flex Liquid as a foam preparation, inject a sufficient amount to fill galleries without allowing runoff.

Re-treatment guidelines: Reapply if insect activity within treated areas is detected 4 or more weeks following treatment. For best results in treating galleries, inject Optigard Flex Liquid into new injection holes positioned between previous injection sites.

Control of Carpenter Bees (localized treatment)

Apply a 0.1% dilution of Optigard Flex Liquid into carpenter bee galleries as a spray, mist, or foam application. Apply up to 50 ml (1.7 fl oz) of finished liquid solution of Optigard Flex Liquid at each injection hole. If using Optigard Flex Liquid as a foam preparation, inject a sufficient amount to fill galleries without allowing runoff.

Control of Wood-Destroying Beetles and Borers

For control of wood-destroying beetles or borers, including: old house borers, powderpost beetles, false powderpost beetles,

death-watch beetles, ambrosia or bark beetles. Apply Optigard Flex Liquid diluted to 0.1% as a spray, mist, or foam to galleries, structural voids and or as wood surface treatments. For old house borers, or other beetles that form large galleries, treat the gallery system by drilling and injecting product with sufficient volume to cover the galleries. For beetles or borers that do not form galleries which can be readily injected (e.g., powderpost beetles), apply product as a liquid, mist or foam to exposed wooden surfaces in non-living space areas in crawlspaces, basements, attics, to structural voids, to spaces between wood elements of a structure or at joints between wood and foundations. Apply as a coarse liquid spray with low pressure (<25 psi), as a foam or mist application, or by brushing diluted product onto the surface. Applications should be made in sufficient volumes to coat the target surface but less than the volume that creates runoff. Re-treat as directed to maintain protection. Allow treated surfaces to dry before contacting them.

Surface applications may also be used to supplement spot treatment for termites, as a means to prevent re-infestation by swarming adult termites. Apply a 0.05%-0.1% dilution as a surface spray or mist to exposed wood surfaces in areas not used as living spaces, such as attics, crawlspaces, unfinished basements, or structural voids.

SUBTERRANEAN TERMITES (SPOT TREATMENT WITH LIQUID APPLICATION ONLY)

Do not use this product as the sole source of control for active, structural infestations by subterranean termites; the purpose of this application is to kill workers or winged reproductive forms of termites which are present at the time of treatment. It is not intended to provide structural pest control. It is not a substitute for mechanical alteration, soil and foundation treatment, but merely a supplement. For active, structural infestations by subterranean termites, this product can only be used to supplement a federally registered conventional product that is

registered as a sole source for termite control. This product will not eliminate termite infestations or provide protection against future infestations.

Use Optigard Flex Liquid as a 0.05-0.1% dilution to kill active subterranean termites. Apply as a coarse spray at 1 gallon per 10 square feet directly to infested sites.

CONTROL OF PESTS IN VOIDS

Arthropod pests may occasionally invade structures through wall voids or other structural voids by entering cracks or other openings to the exterior. In conjunction with other appropriate methods such as exclusion or perimeter insecticide applications, Optigard Flex Liquid can control nuisance arthropods that move through or harbor in wall void areas. For best results, use Optigard Flex Liquid as part of an Integrated Pest Management (IPM) approach, in conjunction with other appropriate control methods such as perimeter insecticide applications, use of baits, and the use of exclusion or other non-chemical control methods.

Method of Injection into Voids

To control (listed) pests, apply Optigard Flex Liquid at 0.05%-0.1% finished solution/foam to surfaces inside structural voids. Application to structural voids such as wall voids should be done by drilling a small hole into the void area, or using a self-puncturing tip, and injecting product as liquid or foam so that wood surfaces inside the void area are treated. Existing openings such as those around door or window frames may also be used as entry points to inject product. Apply enough volume to lightly coat the target surface. Do not exceed liquid volume that would allow runoff (e.g., for wood, runoff is about 0.05-0.1 ml/sq in). For example, a 2 inch x 4 inch x 16 inch wall void with wood frame should be treated with 2-4 ml finished liquid solution per linear foot; other surfaces or wall void sizes may need more or less to achieve a light coating. For foam preparations, see instructions for use provided in the **MIXING PROCEDURES** section of this label. Apply approximately 60-120 ml (2-4 fl oz) finished foam preparation per application point. Alternatively, closed, in-wall delivery systems may be used as described below to apply product to the surfaces inside void areas (see specific instructions in next section).

Use Optigard Flex Liquid for control of the following pests in voids and around structures.

Target Pests	Dosage of Optigard Flex Liquid	Remarks
Ants* (except carpenter ants and Pharaoh ants) Beetles Boxelder bugs Cockroaches Crickets Earwigs Firebrats Lady beetles Millipedes Pillbugs Silverfish Sowbugs	0.05-0.1% 0.27-0.54 fl oz (8-16 ml) Optigard Flex Liquid/gal water or finished foam	Use 0.1% rate for heavy pest infestations. * Optigard Flex Liquid may be used as a liquid or foam treatment to control ants (except carpenter ants and Pharaoh ants) in termite monitoring stations. Ant (except carpenter ant and Pharaoh ant) mounds may also be spot treated with 0.05-0.1% finished liquid or foam.

continued...

Target Pests	Dosage of Optigard Flex Liquid	Remarks
Yellow jackets Wasps	0.1% 0.54 fl oz (16 ml) Optigard Flex Liquid/gal water or finished foam	See Control of Yellow Jackets and Wasps (Localized Treatments) section of this label for details.

For optimal results, use foam application.

Fixed In-Wall Delivery Systems

Closed, in-wall insecticidal delivery systems such as permanently installed piping or flexible tubing may also be used to deliver diluted product to inaccessible areas. Generally, about one ounce of finished liquid product is needed per 35-40 ft of tubing (based on 1/8"-diameter tubes). For these systems, use 0.05%-0.1% dilution rates as listed in the **Application Dilution Table**. Prepare the finished product at the appropriate dilution, inject into system as recommended by delivery system manufacturer.

INTERIOR PEST CONTROL

In addition to void applications (see section **Control of Pests in Voids**), crack-and-crevice or spot applications may be made to control listed pests in areas not easily accessible to humans. Treatment areas include points or cracks between different elements of construction, spaces between equipment and floor or wall, openings leading to voids in walls, spaces beneath equipment or cabinets, or spaces between trim and floors or walls.

Apply 0.1% Optigard Flex Liquid dilution as a spot or crack-and-crevice treatment directly into cracks and crevices or other non-exposure areas as a low pressure spray using equipment capable of delivering a pin stream of insecticide. Applications may also be made as a foam preparation. Do not make surface applications to living spaces.

FOOD/FEED-HANDLING ESTABLISHMENT USE

Apply Optigard Flex Liquid as a crack-and-crevice, void, or spot treatment in both food/feed and non-food/feed areas of Food-Handling Establishments. Food/feed areas include places other than private residences for receiving, storage, packing (canning, bottling, wrapping, boxing), preparing foods, edible waste storage, and enclosed processing systems (mills, dairies, edible oils, syrups). Serving areas are also considered a food/feed area when food is exposed and facility is in operation.

Prior to application, remove or cover all food items in the area to be treated. Do not apply Optigard Flex Liquid to areas where food/feed utensils or processing surfaces may become contaminated. If insecticide contacts an exposed surface where food is handled, wash exposed surface with an effective cleaning compound followed by a potable water rinse prior to use.

EXTERIOR PEST CONTROL

For control of (listed) pests, use Optigard Flex Liquid as a void application, as an outdoor surface spray, a spot application or

crack-and-crevice treatment. Refer to table in the section **Control of Pests in Voids** for a list of target pests and rates. Apply to surfaces of structures where pests are likely to enter including but not limited to: utility entry points, soffit areas, eaves and attic vents, around doors or windows, weep or ventilation holes. Optigard Flex Liquid may also be applied as a mist or foam. For ants (except carpenter ants and Pharaoh ants), treat along sidewalks or landscape edging or other areas where ants (except carpenter ants and Pharaoh ants) are likely to trail. Ant (except carpenter ants and Pharaoh ants) mounds may also be treated with a spot application or with a sub-surface injection tool. Retreat as necessary to maintain control. For perimeter applications, do not exceed 17.0 fl oz (502 ml) of Optigard Flex Liquid product per acre per year. When using a banded spray around the perimeter of the structure, a swath extending 3 feet up the structure exterior from the ground and 7 feet away from the foundation may be used.

CONTROL OF YELLOW JACKETS AND WASPS (LOCALIZED TREATMENT)

For control of ground-nesting yellow jacket wasps, make an application of 0.1% liquid or finished foam into the below-ground nest. Apply a sufficient amount of foam to fill the nest and the opening to the nest. It is recommended that an extension wand be used when applying the liquid or foam to reduce the risk of being stung.

For application to paper-covered wasp nests (for example, bald-faced hornets), apply a 0.1% dilution of Optigard Flex Liquid as a finished foam or as a spray into the opening of the nest. Apply a sufficient amount of foam to fill the nest without allowing runoff. As a spray, apply product to the entire outside surface of the nest as well as the nest opening. It is recommended that an extension wand be used when applying the foam to reduce the risk of being stung.

For visible wasp nests, spray the outside of the nest with a 0.1% dilution. Apply spray to the entire surface of the nest. For wasp nests within voids such as under soffits, behind rain gutters, etc., make an application of 0.1% liquid or foam into the nesting area. Apply a sufficient amount of foam to fill the nesting void. It is recommended that an extension wand be used when applying the liquid or foam to voids to reduce the risk of being stung.

INDIVIDUAL MOUND TREATMENTS (FIRE ANTS)

For ants (*Solenopsis* spp.), prepare a drench solution at a concentration rate of 1 to 3 fluid ounces per ten gallons of water. Thoroughly mix solution and apply directly to mounds. For control of small fire ant mounds (<6 inches in diameter at the surface) apply one gallon of drench solution per mound. For control of larger mounds, apply 2 to 3 gallons of the drench solution per mound. Direct the drench solution to the center of the mound. Do not apply less than 0.5 gallon or more than 3 gallons per mound. Not for broadcast application.

APPLICATION TO LANDSCAPE ORNAMENTAL PLANTS

DO NOT apply this product, by any application method, to linden, basswood, or *Tilia* species.

Optigard Flex Liquid may be used on landscape ornamental plants to reduce populations of aphids, whiteflies, and mealybugs that produce honeydew (which serves as a food source for some ant species). Use a 0.0038% (2.0 fl oz product per 100 gallons) to 0.1% liquid dilution of Optigard Flex Liquid as a foliar or banded application. The 0.1% dilution may be applied up to 2 gallons/1,000 sq ft. Retreat as necessary to maintain control. Do not exceed 17.0 fl oz (502 ml) of Optigard Flex Liquid product per acre per year.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

Pesticide Storage

Store unused product in original container only, out of reach of children and animals and in a cool dry place.

Pesticide Disposal

Pesticide wastes are toxic. Improper disposal of unused pesticide, application mixture, or rinse water is a violation of Federal law. If these wastes cannot be used according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance in proper disposal methods.

continued...

STORAGE AND DISPOSAL *(continued)*

Container Handling

Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Triple rinse container (or equivalent) promptly after emptying. Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container $\frac{1}{4}$ full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use and disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times. Then offer for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures approved by state and local authorities.

Optigard®, the ALLIANCE FRAME 
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON 
are Trademarks of a Syngenta Group Company

©2016 Syngenta

For non-emergency
(e.g., current product information), call
Syngenta Crop Protection at 1-800-334-9481.

Manufactured for:
Syngenta Crop Protection, LLC
P.O. Box 18300
Greensboro, North Carolina 27419-8300

SCP 1306A-L1H 0216
4063261

GROUP 4A INSECTICIDE

 Optigard[®] Flex
Liquid
Insecticide

- For control of listed pests: including cockroaches, ants (except carpenter ants and Pharaoh ants), fire ants, yellow jackets, wasps and beetles
- For control of localized infestations of drywood termites, subterranean termites, carpenter bees, and wood-destroying beetles and borers

Do not use this product as the sole source of control for active, structural infestations by subterranean termites; the purpose of this application is to kill workers or winged reproductive forms of termites which are present at the time of treatment. It is not intended to provide structural pest control. It is not a substitute for mechanical alteration, soil and foundation treatment, but merely a supplement. For active, structural infestations by subterranean termites, this product can only be used to supplement a federally registered conventional product that is registered as a sole source for termite control. This product will not eliminate termite infestations or provide protection against future infestations.

8 fl oz Net Contents

Active Ingredient: Thiamethoxam (CAS No. 153719-23-4)	21.6%
Other Ingredients:	78.4%
Total:	100.0%

Optigard Flex Liquid is a suspension concentrate (SC) formulation. Optigard Flex Liquid contains 2 pounds thiamethoxam per gallon formulated product (244 grams thiamethoxam per liter formulated product).

**KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN.
CAUTION**

See additional precautionary statements and directions for use in booklet.
EPA Reg. No. 100-1306 EPA Est. No. 61282-WI-1
Optigard[®] and the SYNGENTA Logo are Trademarks of a Syngenta Group Company

©2016 Syngenta
Manufactured for:
Syngenta Crop Protection, LLC
P.O. Box 18300, Greensboro, NC 27419-8300
SCP 1306A-L1H 0216
4063261

syngenta[®]

▲
PULL HERE TO OPEN



(01) 0 07 02941 39213 7

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic
Animals

CAUTION

Harmful if inhaled or absorbed through skin. Do not breathe vapor or spray mist. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If **inhaled**: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice. If **in eyes**: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for

treatment advice. If **on skin or clothing**: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

If **swallowed**: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

HOT LINE NUMBER: For 24-Hour Medical Emergency Assistance (Human or Animal) or Chemical Emergency Assistance (Spill, Leak, Fire, or Accident), Call **1-800-888-8372**.

Refer to **Storage and Disposal**, **Environmental Hazards**, and **Physical and Chemical Hazards** sections in booklet.

SCP 1306A-L3D 1214
4049390

Grupo4^a Insecticida OPTIGARD LIQUID FLEX

Insecticida

Ingrediente Activo:

Active Ingredient:

Thiamethoxam (CAS No. 153719-23-4)

21.6%

Otros Ingredientes:

78.4%

Total:

100%

Optigard Flex Liquid contiene thiamethoxam de 2 libras por gal. producto formulado (thiamethoxam de 244 gramos por litro producto formulado).

Núm. Reg. EPA 100-1306 Establecimiento EPA
61282-WI-1

Producto de India

Formulado en los EE.UU.

- Para el control de plagas listadas: incluyendo cucarachas, hormigas (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón), hormigas de fuego y escarabajos.
- Para el control de infestaciones localizadas de termitas madera seca, termitas subterráneas, las abejas carpintero, y escarabajos y barrenadores que destruyen madera.

No usar este producto como la única fuente de control de infestaciones activas, estructurales por termitas subterráneas; el propósito de esta aplicación es matar a las formas reproductivas de termitas trabajadoras o con alas que están presentes en el momento de tratamiento. No es para ser utilizado para proveer control de plagas estructurado. No es un sustituto de la alteración mecánica, tratamiento de suelos y de la fundación, sino simplemente un suplemento. Para infestaciones activas, estructurales por las termitas subterráneas, este producto sólo puede utilizarse para complementar un producto convencional federalmente registrado que esté registrado como una única fuente para el control de termitas. Este producto no eliminará las infestaciones de termitas o proporcionará una protección contra futura infestación.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN


Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.

Vea la declaración de precauciones e instrucciones adicionales de uso en el panfleto.

SCP 1306A-L1H 0216 4063261

8 onzas fluidas Contenido neto

PRIMERO AUXILIOS	
Si es inhalado	- Mueva la persona a un lugar de aire fresco. - Si la persona no está respirando, llame al 911 o una ambulancia, luego aplique respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. - Llame un centro de control de envenenamiento o doctor para consejos de tratamiento.
Si en los ojos	- Mantenga el ojo abierto y enjuague despacio y suavemente con agua por 15-20 minutos. - Remueva lentes de contacto, de estar presentes, luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. - Llame un centro de control de envenenamiento o doctor para consejos de tratamiento.
Si en la piel o ropa	- Remueva la ropa contaminada. - Enjuague la piel de inmediato con gran cantidad de agua por 15-20 minutos. - Llame un centro de control de envenenamiento o doctor para consejos de tratamiento.
Si es ingerido	- Llame un centro de control de envenenamiento o doctor de inmediato para consejos de tratamiento. - Haga que la persona absorba un vaso de agua si puede tragar. - No induzca el vómito a menos que le sea indicado por el centro de control de envenenamiento o doctor. - No administre nada por boca a una persona inconsciente.
Tenga el recipiente o etiqueta del producto consigo cuando llame al centro de control de envenenamiento o doctor, o en camino para tratamiento.	
NÚMERO DE LÍNEA DE EMERGENCIA Para Asistencia de Emergencia Médica las 24 horas (Humana o Animal) o Asistencia Emergencia Química (Derrame, Filtración, o Accidente), Llame al 1-800-888-8372	



DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Riesgos a Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN

Perjudicial si es inhalado o absorbido a través de la piel. No respire el vapor o las partículas roseadas. Evite contacto con los ojos, piel o ropa. Lave a fondo con jabón y agua luego de manejar y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño. Remueva y lave la ropa contaminada antes de reutilizar.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Aplicadores y otros manejadores deben usar:

- Pantalones largos y camisas de manga larga
- Guantes químico-resistente Categoría A, hecho de cualquier material a prueba de agua (tal como goma natural ≥ 14 mils)
- Zapatos y medias

Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y mantener PPE. Si no hay instrucciones para lavables, use detergente y agua caliente. Mantenga y lave PPE separado de cualquier otro lavado de ropa.

Recomendaciones de Seguridad del Usuario

Los usuarios deben:

- Lave las manos cabalmente antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño.
- Remover ropa inmediatamente si el producto le entra. Luego lávese cabalmente y cámbiese con ropa limpia.

Riesgos Ambientales

Este producto es altamente tóxico a abejas expuestas a tratamiento directo o residuos en plantas florecientes o hierbajos si las abejas están en forrajeo.

Este pesticida es tóxico a la vida silvestre y altamente tóxico a invertebrados acuáticos. No aplique directamente al agua, o hacia áreas donde la superficie de agua está presente, o a áreas en medio de marea por debajo de la marca del medio de marea alta. No contamine el agua cuando disponga del agua de lavado de equipo.

PROTECCIÓN DE POLINIZADORES

USO RESTRINGIDO

LOS USOS DE ESTE PRODUCTO ESTÁN RESTRINGIDOS A CAUSA DEL RIESGO QUE PODRÍA REPRESENTAR PARA LAS ABEJAS Y OTROS INSECTOS POLINIZADORES.

Para cada lugar de aplicación, localice el ícono que indica peligro para las abejas [insert icon here] en las Directrices de Uso y refiérase a los usos específicos restringidos e instrucciones para proteger abejas y otros insectos polinizadores.

Este producto puede matar abejas y otros insectos polinizadores.

Abejas y otros insectos polinizadores forrajean de plantas que están floreciendo, arrojan polen o producen néctar.

Abejas y otros insectos polinizadores pueden estar expuestos a este pesticida a causa de:

- Tener contacto directo durante aplicación foliar o contacto con residuos en la superficie de la planta tras la aplicación foliar.
- Digerir residuos contenidos en el néctar y polen cuando el pesticida ha sido usado como tratamiento para semillas, aplicado en el suelo, inyectado a árboles, al igual que para la aplicación foliar.

Al usar este producto, asegúrese de tomar medidas apropiadas para:

- Minimizar la exposición de este producto a abejas y otros insectos polinizadores cuando están alimentándose de plantas polinizadoras atractivas ubicadas en lugares donde el producto fue aplicado.
- Minimizar la deriva de este producto a colmenas de abejas o a hábitats polinizadores atractivos fuera del área de aplicación del producto.

Puede hallar información acerca de cómo proteger abejas y otros insectos polinizadores en la página de internet de Pesticide Environmental Stewardship: <http://pesticidestewardship.org/PollinatorProtection/Pages/default.aspx>.

Incidentes ocasionados por el pesticida (por ejemplo, abejas muertas) se deben informar inmediatamente a la agencia encargada en el estado o tribu. Para hallar el número de contacto encargado de su estado, debe acceder: www.aapco.org/officials.html. También debe reportar el incidente al Centro Nacional de Información de Pesticidas (NPIC, por sus siglas en inglés) a través de su página de internet www.npic.orst.edu; o directamente a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) enviando un correo electrónico a beekill@epa.gov.

Riesgos físicos o químicos

No use, eche, derrame o almacene cerca de calor o llama abierta.

CONDICIONES DE VENTA Y LIMITACION DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD

NOTA: Lea las Direcciones de Uso y Condiciones de Venta y Limitación de Garantía y Responsabilidad en su totalidad antes de comprar o usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva el producto de inmediato, sin abrir, y el precio de venta le será devuelto.

Las Direcciones para Uso de este producto deben ser seguidas cuidadosamente. Es imposible el eliminar todos los riesgos consecuentes asociados con el uso de este producto. Daño a la cosecha, ineffectividad u otras consecuencias no intencionadas podrían resultar debido a tales factores como la manera de uso o aplicación, condiciones del tiempo o cosecha, presencia de otros materiales u otros materiales influyentes en el uso de este producto, los cuales están todos fuera del control de SYNGENTA CROP PROTECCION, INC. o el Vendedor. En la medida permitida por la ley aplicable, el Comprador y Usuario acuerdan mantener a SYNGENTA y al Vendedor libre de responsabilidad por cualquier reclamación relacionado con dichos factores.

SYNGENTA garantiza que este producto es conforme a la descripción química en la etiqueta y que es razonablemente apto para los propósitos a los que se refiere en las Instrucciones de Uso sujeto a los riesgos inherentes referidos anteriormente, cuando es usado de

acuerdo a las direcciones bajo condiciones normales de uso. En la medida permitido por la ley aplicable, (1) esta garantía no es extensiva al uso de este producto contraria a las instrucciones de etiqueta, o bajo condiciones no razonablemente previstas hacia o más allá del control del Vendedor o SYNGENTA, y (2) el Comprador y el Usuario asumen el riesgo de cualquiera de estos usos. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SYNGENTA NO OFRECE GARANTIAS DE COMERCIALIZACION O CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO PARTICULAR NI CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA EXCEPTO COMO GARANTIZADO EN LA ETIQUETA.

En la medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso SYNGENTA o el Vendedor serán responsables de daños incidentales, consecuentes o especiales resultantes del uso o manejo de este producto. **EN LA MEDIDA PERMITIDA por la ley APLICABLE, EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL USUARIO O COMPRADOR, Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SYNGENTA Y VENDEDOR PARA CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES, PERDIDAS, AGRAVIOS O DAÑOS (INCLUYENDO RECLAMACIONES BASADAS EN VIOLACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ECTRICA O DE OTRA MANERA) RESULTANTE DEL**

USO O MANEJO DE ESTE PRODUCTO, SERA LA DEVOLUCION DEL PRECIO DE VENTA DE ESTE PRODUCTO O, A LA ELECCIÓN DE SYNGENTA O VENDEDOR, EL REEMPLAZO DE ESTE PRODUCTO.

SYNGENTA y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y Usuario lo aceptan, sujeto a las Condiciones de Venta y Garantía precedentes, las cuales no podrán ser variadas, excepto únicamente por un acuerdo escrito firmado por un representante de SYNGENTA debidamente autorizado

DIRECCIONES DE USO

El usar este producto de manera inconsistente con su etiqueta es una violación a las Leyes Federales.

No aplique Optigard Flex Liquid mientras las abejas forrajeen. No le vierta Optigard Flex Liquid sobre plantas que están floreciendo; aplique el producto solo cuando todos los pétalos de flores han se han desprendido.

Manejo de la resistencia

Optigard Flex Liquid pertenece a la clase de los neonicotinoides de química (Grupo 4A insecticida). Parásitos que son resistentes a los insecticidas en otras clases químicas no son conocidos por tener resistencia cruzada al Optigard Flex Liquid. Sin embargo, las plagas de insectos son conocidas a desarrollar resistencia a productos usados repetidamente para control. Como no se puede predecir el desarrollo de la resistencia, el uso de Optigard Flex Liquid deben cumplir con estrategias de manejo de resistencia sanas para el sitio de uso. Estrategias deben incluir la rotación de los productos químicos con diferentes modos de acción, limitación del número de generaciones sucesivas de el parásito objetivo a ser tratado con el mismo compuesto, y cumplimiento de las instrucciones del etiquetado.

SYNGENTA y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y Usuario lo aceptan, sujeto a las Condiciones de Venta y Garantía precedentes, las cuales no podrán ser variadas, excepto únicamente por un acuerdo escrito firmado por un representante de SYNGENTA debidamente autorizado

Consulte a su asesor de control de plagas local o la oficina de extensión para métodos adicionales para prevenir el desarrollo de la resistencia. SYNGENTA anima a mayordomía responsable de producto a asegurar un control eficaz a largo plazo de las plagas de insectos en esta etiqueta.

RESTRICCIONES DE USO

- No aplicar este producto de manera que haga contacto con cualquier otra persona. Sólo aplicadores protegidos pueden estar en el área durante la aplicación. Mantener a personas o animales domésticos lejos de la zona tratada hasta seco.
- En las áreas de estar (salas), no aplique Optigard Flex Liquid como un aerosol de difusión. En estas áreas use solo como una aplicación de vacío, o como un tratamiento localizado (por ejemplo, bajo o detrás de dispositivos) o aplicaciones de grietas en zonas donde no se expongan a sus ocupantes al contacto directo.
- Al aplicar Optigard Flex Liquid como tratamiento localizado a grietas en las áreas de estar, no exceda de 0.5 galones/1000 pies cuadrados de un 0.1% de dilución terminada.
- Para aplicaciones de vacíos, no aplique hasta que la ubicación de los tubos de calor, conductos, líneas de agua y alcantarillado, y conductos eléctricos son conocidos. Debe tenerse precaución para evitar la inyección y pinchando en estos elementos estructurales. No aplique en conmutadores eléctricos o recipientes u otros cableado o receptáculos donde existen riesgos de choque eléctrico.
- No aplique este producto, por ningún tipo de método, a especies de *linden*, *basswood* o *Tilia*.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

Optigard Flex Liquid debe aplicarse como una aplicación diluida terminada siguiendo las instrucciones de mezcla que figuran en esta etiqueta. Técnicas de tratamiento usadas deben proporcionar la colocación del producto en las zonas infestadas o lo más cerca posible. Optigard Flex Liquid puede aplicarse a vacíos estructurales, en grietas, esquinas u otros lugares que no estén en medio, tales como debajo y detrás de los aparatos de cocina y zócalos, bajo los fregaderos, alrededor de marcos de puertas y ventanas, tuberías y calentadores de agua y en el ático, espacio de rastreo y garaje. Ubicaciones aceptables para el tratamiento también incluyen áreas de espacios no vivibles incluyendo espacios de rastreo, áticos y sótanos no-terminados. Las aplicaciones podrán ser hechas como un aerosol de grietas, un aerosol grueso de baja presión, un aerosol de superficie o como una aplicación de vacío estructural. Aplicación a vacíos estructurales tales como paredes huecas puede hacerse mediante la perforación de un pequeño agujero en área hueca o usando una punta de agujero e inyectando producto diluido para que las superficies dentro de las áreas huecas sean tratadas. También se pueden utilizar agujeros existentes creados por características de construcción para acceder a las áreas de tratamiento hueco.

Como se describe en la sección **CONTROL de Plagas en Huecos**, sistemas de paredes cerradas puede utilizarse para aplicar el producto a las superficies dentro de áreas huecas.

Optigard Flex Liquid también puede utilizarse como un tratamiento de bandas localizado, o aplicación a grietas para áreas exteriores de perímetro de estructuras para el control de plagas enumeradas.

Para el control correctivo de insectos que destruyen madera incluyendo termitas de madera seca, escarabajos que destruyen madera, y abejas carpinteras, Optigard Flex Liquid puede ser utilizado como un tratamiento localizado, aplicación de superficie de madera, o aplicación hueca.

Mezcla

Consulte la **Tabla de Dilución de Aplicación** para una cantidad adecuada de Optigard Flex Liquid que se utilizará para lograr la dilución correcta. Consulte las instrucciones de uso de plagas específicas para el procedimiento de aplicación y tasas de uso.

Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque de aplicación 1/4–1/3 del volumen deseado con agua antes de agregar Optigard Flex Liquid. Luego agregue lentamente la cantidad de Optigard Flex Liquid. Añada la cantidad restante de agua y agite hasta que el producto es completamente mezclado.

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA

Tabla de dilución de aplicación

Galones de Solución Terminada Deseada	Cantidad en fl. oz. (o ml) de Optigard Flex Liquid requerida para obtener los siguientes porcentajes de dilución de ingrediente activo	
	0.05%	0.1%
1	0.27 fl oz (8ml)	0.54 floz (16ml)
3	0.81 fl oz (24 ml)	1.62 fl oz (48 ml)
5	1.35 fl oz (40 ml)	2.71 floz (80ml)
6	1.62fl oz (48ml)	3.24 floz (96ml)
10	2.71 fl oz (80ml)	5.41 fl oz (160 ml)

ENTREGA DE OPTIGARD FLEX LIQUID CON ESPUMA

El producto terminado diluido puede convertirse en espuma y aplicado para controlar las infestaciones de plagas. Dependiendo de las circunstancias, aplicaciones de espuma pueden utilizarse solos o en combinación con aplicaciones de líquidos.

ENTREGA DE OPTIGARD FLEX LIQUID CON ESPUMA

El producto terminado diluido puede convertirse en espuma y aplicado para controlar las infestaciones de plagas. Dependiendo de las circunstancias,

Mezcla de procedimientos y aplicación de espuma

Usando la tabla siguiente, mezclar la cantidad apropiada de Optigard Flex Liquid en el agua con el volumen de agente espumante recomendado por el fabricante de espuma para aplicación por equipo espumante.

Tabla de Mezclas para Espuma Optigard Flex Liquid

Cantidad de Optigard Flex Liquid	Galón de Agua	Tasa de Expansión de Espuma	Espuma Terminada (galones)	Dilución Terminada (% ingrediente activo)
1.35 floz (40ml)	1.0	5:1	5	0.05
2.71f.oz (80ml)	1.0	10:1	10	
4.0 fl.oz (120 ml)	1.0	15:1	15	
6.76 fl oz (200 ml)	1.0	25:1	25	
2.71 fl.oz (80ml)	1.0	5:1	5	0.1
5.41 fl.oz. (160ml)	1.0	10:1	10	
8.0 floz (240 ml)	1.0	15:1	15	
13.53 fl.oz. (400ml)	1.0	25:1	25	

CONTROL DE INSECTOS QUE DESTRUYEN MADERA

Use Optigard Flex Liquid para controlar los siguientes insectos que destruyen madera. Para instrucciones de aplicación específica consulte el texto de la etiqueta.

Plaga	Método de Aplicación	Dilución Terminada (% de ingrediente activo)	Comentarios
Termitas de Madera Seca Control Remedial	Espuma-Galerías Líquido-Galerías	0.1%	Vuelva a tratar según instruido
Abejas Carpinteras	Líquido o Espuma -Tratamiento Galería	0.1%	

Plaga	Método de Aplicación	Dilución Terminada (% de ingrediente activo)	Comentarios
Escarabajos y Barrenderas que destruyen madera	Líquido o Espuma -Galería o tratamiento de superficie de madera	0.1%	
Termitas subterráneas – trabajadoras y reproductivas (solo mata)	Aplicación líquida a infestaciones existentes	0.05%-0.1%	No dirigido a protección estructural o como un tratamiento por si solo. Vea la sección de Termitas Subterráneas de esta etiqueta para detalles.

* Dilución terminada de aplicaciones de espuma basadas en concentración en espuma terminada (vea Tabla de Mezclar para Espuma Optigard Flex Liquid en PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA)

Control de termitas de Madera Seca

Cuando se utiliza como se especifica en esta etiqueta, Optigard Flex Liquid proporciona control remedial efectivo de infestaciones localizadas de termitas de madera seca, incluyendo especies de *Incisitermes*, *Cryptotermes* y *Marginitermes*.

Conocimiento de la biología y el comportamiento de las especies de termitas de madera seca involucradas, las ubicaciones y el alcance de la infestación(es) ayudará a garantizar un control con éxito.

Requisitos de tratamiento para el control de termitas de madera seca pueden variar según regulaciones estatales y locales. Para asesoramiento sobre regulaciones actuales de control de termitas de madera seca en las condiciones locales, consulte su organismo estatal regulador de control de plagas estructurales.

Instrucciones de Control Remedial de Termitas de Madera Seca en Madera Infestada

Para controlar las termitas de madera seca en zonas localizadas de madera infestada en estructuras, aplicar 0.1% de Optigard Flex Liquid como un líquido o espuma para huecos y galerías de madera dañada, en espacios entre miembros de madera estructural o entre madera y fundaciones. Localizar galerías usando señales visuales (por ejemplo gránulos fecales frescos o madera enrojecida), la presencia de plagas vivas, técnicas de sondeo mecánico (tocando sobre la superficie de la madera y escuchar los cambios en el sonido para indicar cambios en la densidad de la madera), dispositivos para escuchar, dispositivos de detección de movimiento u otras tecnologías que ayudan a identificar actividad de termitas de madera seca.

Método de inyección de madera

Taladrar agujeros de diámetro pequeño de tamaño adecuado para la punta de la inyección, o utilizar una punta de agujero, posicionado para intersectar galerías de termitas entre la madera infestada. Aparición de termitas de madera seca o agujeros de patada de salida se conectan directamente a galerías y son indicadores de sitios potenciales para taladrar e inyectar Optigard Flex Liquid. Debe tenerse cuidado para evitar el cableado eléctrico, plomería, etc., cuando taladra e inyecta. No taladre o perfore completamente a través de la madera. Espacio entre los orificios dependerá de la distribución de la actividad de insecto y galerías. Orificios de inyección pueden agruparse en áreas de actividad de insecto como se indica por daños, insectos vivos u otros indicadores descritos anteriormente. Orificios de inyección en lados opuestos del grandes (4 "x 10" o más grande) vigas estructurales pueden ser necesarios para penetrar efectivamente las galerías.

Aplicar hasta 50 ml. (1.7 fl. Oz.) solución líquida terminada de Optigard Flex Liquid en cada agujero de inyección. Si usa Optigard Flex Liquid como una preparación de espuma, inyecte una cantidad suficiente de para llenar galerías sin permitir arrastre.

Directrices de retratamiento: Volver a aplicar si se detecta actividad de insecto dentro de las zonas tratadas 4 o más semanas después del tratamiento. Para obtener mejores resultados en el tratamiento de galerías, inyectar el Optigard Flex Liquid en nuevos agujeros de inyección posicionados entre los sitios de inyección anterior.

Control de abejas Carpinteras (tratamiento localizado)

Aplicar una dilución de 0.1% de Optigard Flex Liquid en galerías de abeja carpinteras como una aplicación de aerosol, rocío o espuma. Aplicar hasta 50 ml. (1.7 fl. Oz.) de solución líquida terminada de Optigard Flex Liquid en cada agujero de inyección. Si usa Optigard Flex Liquid como una preparación de espuma, inyecte una cantidad suficiente de para llenar galerías sin permitir arrastre.

Control de escarabajos destructores de madera y barrenadores

Para el control de escarabajos destructores de madera o barrenadores, incluyendo: barrenadores de casa vieja, escarabajos powderpost, escarabajos powderpost falsos, escarabajos de reloj de la muerte, ambrosía o escarabajos de la corteza. Aplicar Optigard Flex Liquid diluido al 0.1% como un aerosol, rocío o espuma a galerías, vacíos estructurales y o tratamientos de superficies de madera. Para barrenadores de casa vieja u otros escarabajos que forman grandes galerías, tratar el sistema de Galería taladrando e inyectando el producto con volumen suficiente para cubrir las galerías. Para escarabajos o barrenadores que no forman galerías que pueden fácilmente ser inyectadas (por ejemplo, escarabajos powderpost) aplicar producto como un líquido, rocío o espuma a superficies de madera expuesta en zonas de espacio no habitable en lugares de gateo, sótanos, áticos, a vacíos estructurales, a los espacios entre los elementos de madera de una estructura o en las uniones entre madera y fundaciones. Aplicar como una gruesa pulverización líquida con baja presión (< 25 psi), como una aplicación de espuma o rocío o mediante la aplicación con cepillo del producto diluido en la superficie. Las aplicaciones deben hacerse en suficiente volúmenes para cubrir la superficie deseada pero menos que el volumen que crea arrastre. Volver a tratar según instruido para mantener la protección. Permitir que las superficies tratadas sequen antes de tocarlas.

También pueden utilizarse aplicaciones de superficie para complementar el tratamiento localizado de termitas, como un medio para prevenir re-infestaciones de termitas adultas. Aplicar una dilución de 0.05%-0.1% como un aerosol de superficie o rocío a superficies de madera expuesta en las áreas no utilizadas como espacios habitables, tales como áticos, espacios de ganeo, sótanos no terminados o vacíos estructurales.

TERMITAS SUBTERRANEAS (TRATAMIENTOS LOCALIZADOS CON SOLO APLICACIONES LIQUIDAS)

No usar este producto como la única fuente de control de infestaciones activas, estructurales por termitas subterráneas; el propósito de esta aplicación es matar a termitas trabajadoras o a las formas reproductivas voladoras que están presentes en el momento del tratamiento. No es para proveer control de plagas estructural. No es un sustituto para tratamiento mecánico de alteración, el suelo y la fundación, pero simplemente un suplemento. Para infestaciones activas, estructurales por las termitas subterráneas, este producto puede sólo utilizarse para complementar un producto convencional federalmente registrado que esté registrado como una única fuente para el control de termitas. Este producto no puede eliminar infestaciones de termitas o proporcionar protección contra infestaciones futuras.

Utilice Optigard Flex Liquid como un 0.05-0.1% de dilución para matar a las termitas subterráneas activas. Aplicar un aerosol grueso de 1 galón por 10 pies cuadrados directamente a sitios infestados.

CONTROL DE PLAGAS EN HUECOS

Plagas artrópodos ocasionalmente pueden invadir las estructuras a través de huecos de pared u otros vacíos estructurales entrando por grietas u otras aperturas al exterior. En conjunción con otros métodos adecuados como exclusión o aplicaciones de insecticida de perímetro, Optigard Flex Liquid puede controlar molestias de artrópodos que se mueven a través o albergan en zonas de vacío de pared. Para obtener mejores resultados, utilice Optigard Flex Liquid como parte de un enfoque de Manejo Integrado de Plagas (IPM), junto con otros métodos de control adecuados, como aplicaciones de insecticida de perímetro, uso de cebos y el uso de exclusión o de otros métodos no químicos de control.

Método de inyección en huecos

Para controlar las plagas (listadas), aplicar Optigard Flex Liquid a 0.05%-0.1% de solución terminada/espuma a superficies dentro de los huecos estructurales. Aplicación a vacíos estructurales tales como huecos de pared debe hacerse perforando en el hueco un pequeño agujero, o mediante una punta auto-perforadora e inyección producto como líquido o espuma para que las superficies de madera dentro de la zona hueca sean tratadas. Aperturas existentes, como los que rodean marcos de puerta o ventana también pueden utilizarse como puntos de entrada para inyectar el producto. Aplicar suficiente volumen para recubrir ligeramente la superficie destinada. No exceder del volumen de líquido que permitiría el arrastre (por ejemplo, para madera, el arrastre es aproximadamente 0.05-0.1 ml. / pulgadas cuadradas). Por ejemplo, un muro hueco de 2 "x 4" x 16 " con marco de madera debe ser tratado con 2-4 ml. de solución líquida terminada por pie lineal; otras superficies o tamaños de pared hueco tamaños pueden necesitar más o menos para lograr un recubrimiento ligero. Para preparaciones de espuma, vea las instrucciones de uso provistas en la sección de PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA en esta etiqueta. Aplicar aproximadamente 60-120ml (2-4 foz) de preparación terminada de espuma por punto de aplicación. Alternativamente, sistemas cerrados de entrega de pared interna podrán utilizarse como se describe a continuación para aplicar el producto a las superficies dentro de áreas nulas (véase instrucciones específicas en la siguiente sección).

Utilice Optigard Flex Liquid para el control de las siguientes plagas siguientes en vacíos y alrededor de estructuras.

Plagas destinadas	Dosis de Optigard Flex Liquid	Observaciones
Hormigas * (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón) Escarabajos Insectos Boxelder Cucarachas Grillos Tijeretas Firebrats Escarabajos de dama Milpiés Cochinillas Pescado plateado Sowbugs	.05-0.1% .27 foz [8ml.] - .54 foz [16 ml] Optigard Flex Liquid/gal de agua o espuma terminada	Use una tasa de 0.1% para infestaciones pesadas de plagas *Optigard Flex líquido puede utilizarse como un tratamiento líquido o espuma para el control de hormigas (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón) en estaciones de control de termitas. Hormiga (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón) montículos pueden ser también tratados con tratamiento localizado con 0.05 – 0.1% de líquido terminado o espuma.

Continuado en la próxima página...

Chalecos Amarillos Avispas	0.1% 0.54 fl oz [16ml] Optigard Flex Liquid/ gal. agua o espuma terminada	Vea la sección de Control de Chalecos Amarillos y Avispas (tratamiento localizado) en esta etiqueta.
-------------------------------	---	--

Para mejores resultados, use aplicación de espuma.

Sistemas de Entrega de Pared Fija Interna

Sistemas de entrega, cerrados, de insecticidas pared interna como tubería instalada permanentemente o tubos flexibles también puede utilizarse para entregar un producto diluido a zonas inaccesibles. Por lo general, alrededor de una onza de producto acabado líquido es necesario por 35-40 pies de tubería (basado en 1/8"-tubos de diámetro). Para estos sistemas, utilizar tasas de dilución de 0.05%-0.1% como se muestra en la Tabla de Dilución de Aplicación . Preparar el producto terminado en la dilución adecuada, inyectar en el sistema según recomendado por el fabricante de sistema de entrega.

CONTROL DE PLAGAS EN INTERIOR

Además de aplicaciones de vacíos (ver sección Control de plagas en huecos), aplicaciones a grietas o aplicaciones localizadas pueden hacerse para controlar las plagas enumeradas en zonas no fácilmente accesibles para los seres humanos.

Áreas de tratamiento incluyen puntos o grietas entre diferentes elementos de construcción, espacios entre equipos y piso o pared, aperturas hacia huecos en paredes, espacios debajo de equipos o archivadores o espacios entre recortes y pisos o paredes.

Aplicar 0.1% de dilución Optigard Flex Liquid como tratamiento localizado o de grietas directamente en fisuras y grietas u otras áreas no expuestas como un aerosol de baja presión usando equipos capaces de entregar una corriente de insecticida. Aplicaciones también pueden hacerse como una preparación de espuma. No se hagan aplicaciones de superficies a espacios habitables.

USO DE ESTABLECIMIENTO QUE MANEJAN COMIDA/ALIMENTOS

Áreas de comida/alimento incluyen áreas para recibir, almacenar, empacar (embotellar, enlatar, envolver, encajar), preparar comidas, almacenar desperdicio comestible, y sistemas procesadores encerrados (molinos, empresas de productos lácteos, aceites comestibles, jarabes). Áreas de servir también se consideran un área de alimentos y comida cuando la comida está expuesta y la facilidad está en funcionamiento.

Antes de su aplicación, remueva o cubra todo ítem de comida en el área a ser tratada. No aplicar Optigard Flex Liquid a las zonas donde utensilios de comida/alimento o superficies de procesamiento puedan contaminarse. Si el insecticida entra en contacto con una superficie expuesta donde se manejan alimentos, lave la superficie expuesta con compuesto de limpieza efectivo seguido de un enjuague de agua potable enjuague previo a su uso.

CONTROL DE PLAGAS EXTERIOR

Para el control de plagas (listados), utilizar una dilución de 0.1% de Optigard Flex Liquid como una aplicación de vacío, como un aerosol de superficie al aire libre, un tratamiento de aplicación localizada tratamiento de fisura y grietas. Consulte la tabla en la sección Control de Plagas en Huecos para obtener una lista de las plagas destinadas. Apliquen a las superficies de las estructuras donde las plagas probablemente entren incluyendo pero no limitado a: puntos de entrada de utilidad, áreas de intradós, aleros y ventilación del ático, alrededor de puertas o ventanas, orificios de ventilación. Aplicar hasta 2 galones/1000 sq. pies como un líquido. Optigard Flex Liquid también puede aplicarse como un rocío o espuma. Para las hormigas (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón), tratar a lo largo de aceras o esquinas paisajistas u otras áreas donde las hormigas (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón) es probable que transcurran.

Hormiga (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón) montículos también pueden ser tratadas con una aplicación localizada o con una herramienta de inyección subterránea. Vuelva a tratar según necesario para mantener el control. Para aplicaciones de perímetro, no supere 17.0 fl. Oz (502 ml.) de producto Optigard Flex Liquid por hectárea al año. Cuando se utiliza un aerosol de banda alrededor del perímetro de la estructura, una franja que se extiende 3 pies hasta el exterior de la estructura del suelo y 7 pies lejos de la fundación puede utilizarse.

CONTROL DE CHAQUETAS AMARILLAS Y AVISPAS (TRATAMIENTO LOCALIZADO)

Para el control de avispas chaqueta amarilla de anidan en el suelo, hacer una aplicación de 0.1% líquido en el nido bajo tierra. Aplique una cantidad suficiente de espuma para llenar el nido y la apertura al nido. Se recomienda utilizar una varita de extensión al aplicar el líquido o espuma para reducir el riesgo de ser picado.

Para aplicación a nidos de avispas cubierto de papel (por ejemplo, bald-faced hornets), aplique una dilución de 0.1 % de Optigard Flex Liquid como un aerosol o espuma terminada en la apertura del nido. Aplique una cantidad suficiente de espuma para llenar el nido sin permitir arrastre. Como un aerosol, aplicar el producto a toda la superficie exterior del nido, así como a la apertura del nido. Se recomienda que una varita de extensión sea usada al aplicar la espuma para reducir el riesgo de ser picado.

Para nidos de avispas visible, rociar el exterior del nido con una dilución de 0.1%. Aerosol se aplica a toda la superficie del nido. Para los nidos de avispas dentro de huecos, como en esquineros, detrás de canalones de lluvia, etc., haga una aplicación de 0.1% de líquido o espuma en la zona de anidación. Aplicar suficiente cantidad de espuma para llenar el hueco del nido. Se recomienda que una varita de extensión se use al aplicar el líquido o espuma en huecos para reducir el riesgo de ser picado.

TRATAMIENTOS INDIVIDUALES DE MONTÍCULO (HORMIGAS DE FUEGO)

Para hormigas (*Solenopsis* spp.), preparar una solución de drenaje a una tasa de concentración de 1-3 onzas fluidas por diez galones de agua. Mezclar la solución completamente y aplicar directamente en montículos. Para control de montículos pequeños de hormigas de fuego (< 6 pulgadas de diámetro en la superficie) aplicar un galón de solución de drenaje por montículo. Para el control de montículos más grandes, aplicar 2 a 3 galones de la solución drenaje por montículo.

Dirija la solución drenaje al centro del montículo. No se aplican menos de 0.5 galones o más de 3 galones al montículo. No para aplicaciones de banda ancha.

APLICACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES PAISAJISTAS

No aplique este producto, por ningún método de aplicación, a especies de *linden*, *basswood* o *Tilia*.

Optigard Flex Liquid puede utilizarse en plantas ornamentales paisajistas para reducir las poblaciones de áfidos, las moscas blancas y cochinillas que producen melaza (que sirve como fuente de alimento para algunas especies de hormiga. Utilizar un 0.0038% (2.0 fl oz de producto por 100 galones) al 0.1% de dilución líquida de Optigard Flex Liquid como una aplicación foliar o agrupada. La dilución de 0.1% puede aplicarse hasta 2 galones/1000 pies cuadrados. Vuelva a tratar como sea necesario para mantener el control. No exceder 17.0 fl. Oz (502 ml.) de producto Optigard Flex Liquid por hectárea al año.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, comida, o forrajes por el almacenamiento y eliminación.

Almacenamiento del Pesticida

Almacene producto no usado en los recipientes originales solamente, fuera del alcance de niños y animales y en un lugar seco y fresco.

Eliminación del Pesticida

Residuos de plaguicidas son tóxicos. Eliminación incorrecta de plaguicidas no utilizados, mezcla de aplicación o agua de enjuague es una violación de la ley Federal. Si estos desechos no pueden utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con la Agencia de Control Ambiental o agencia de plaguicida de su estado o con el representante de residuos peligrosos en la Oficina Regional de la EPA más cercana para orientación en métodos de eliminación adecuada.

Continuado en la próxima página...

Manejo de los Recipientes

Recipientes No-recargables. No reutilice o rellene este recipiente. Ofrezca para el reciclaje si está disponible. Triple enjuague el contenedor (o equivalente) inmediatamente después de vaciado. Triple enjuague como sigue: vaciar el contenido restante en el equipo de aplicación o un tanque de mezcla y drene durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llenar el contenedor 1/4 lleno de agua y vuelva a tapar. Agitar durante 10 segundos. Eche el enjuague en el equipo de aplicación o un tanque de mezcla o almacene para su posterior uso y disposición. Drene por 10 segundos después de que el flujo comienza a gotear. Repita este procedimiento dos veces más. Luego ofrezca para reciclaje si está disponible o perfore y disponga en un relleno sanitario o mediante incineración, o mediante otros procedimientos aprobados por autoridades estatales y locales.

Optigard®, el Marco Alianza

El logo de SYNGENTA y el icono de propósito

Son marcas de Syngenta Group Company

©2016 Syngenta

Para no emergencias (ej., información actual del producto) llame a Syngenta Crop Protection al 1-800-334-9481.

Manufacturado por:
Syngenta Crop Protection, LLC
P.O. Box 18300

Greensboro, Carolina del Norte 27419-8300

SCP 1306A-L1H 0216
4063261

Grupo 4^º Insecticida

OPTIGARD FLEX LIQUID

Insecticida

Para ser aplicado por aplicadores comerciales responsables por programas de control de plagas, o personas bajo su supervisión.

- Para el control de plagas listadas: incluyendo cucarachas, hormigas (excepto las hormigas carpintero y las hormigas faraón), hormigas de fuego y escarabajos.
- Para el control de infestaciones localizadas de termitas madera seca, termitas subterráneas, las abejas carpintero, y escarabajos y barrenadores que destruyen madera.

No usar este producto como la única fuente de control de infestaciones activas, estructurales por termitas subterráneas; el propósito de esta aplicación es matar a las formas reproductivas de termitas trabajadoras o con alas que están presentes en el momento de tratamiento. No es para ser utilizado para proveer control de plagas estructurado. No es un sustituto de la alteración mecánica, tratamiento de suelos y de la fundación, sino simplemente un suplemento. Para infestaciones activas, estructurales por las termitas subterráneas, este producto sólo puede utilizarse para complementar un producto convencional federalmente registrado que esté registrado como una única fuente para el control de termitas. Este producto no eliminará las infestaciones de termitas o proporcionará una protección contra futura infestación.

8 fl. ozs. Contenido Neto

Ingrediente Activo:
Thiamethoxam (CAS No. 153719-23-4) .21.6%

Otros Ingredientes: 78.4%

Total: 100%

Optigard Flex Liquid es una formulación de concentrado de suspensión (SC) Optigard Flex Liquid contiene thiamethoxam de 2 libras por gal. producto formulado (thiamethoxam de 244 gramos por litro producto formulado).

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

PRECAUCION

Vea la declaración de precaución e instrucciones adicionales de uso impresa en el panfleto.

Núm. Reg. EPA 100-1306 Establecimiento EPA 61282-WI-1

Optigard y el logo SYNGENTA son marcas de fábrica de Syngenta Group Company
2016 Syngenta
Manufacturado para:
Syngenta Crop Protection, LLC
PO Box 18300
Greensboro, Carolina del Norte 27419-8300
SCP 1306A-L1H 0216
4063261

Syngenta



INDICACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN

Causa daño si es inhalado o absorbido por la piel. No inhale el vapor ni el rocío del spray. Evite que el producto entre en contacto con los ojos, piel o vestimenta. Después de manejar el producto, lávese bien las manos con jabón y agua antes de ingerir comida, bebidas, goma de mascar, tabaco o usar el baño sanitario. Remuévase la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS

Si es inhalado: Traslade a la persona de forma tal que pueda respirar aire limpio. Si la persona no está respirando, llame al 911 o una ambulancia, y proceda a suministrarle respiración artificial si es posible, preferiblemente boca a boca. Llame a un centro de control de envenenamiento o un doctor para que lo asesore sobre tratamientos. **Si cayó en los ojos:** Mantenga el ojo abierto mientras lo aclara lenta y suavemente con agua por unos 15-20 minutos. Si la persona tenía lentes de contacto puestos, remuévalos después de haber enjuagado el ojo por cinco minutos y luego continúe enjuagando. Llame a un centro de control de envenenamiento o un doctor para que lo asesore sobre tratamientos.

Si cayó en la piel o vestimenta: Remueva la ropa contaminada.

Inmediatamente lave la piel con abundante agua por unos 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamiento o un doctor para que lo asesore sobre tratamientos. **Si es ingerido o tragado:** Inmediatamente llame a un centro de control de envenenamiento o un doctor para que lo asesore sobre tratamientos. Tome un vaso de agua, si le es posible tragar. No induzca el vómito, salvo sea ordenado por un centro de control de envenenamiento o un doctor. No le suministre nada por boca a una persona inconsciente.

Mantenga el envase del producto o la etiqueta consigo cuando llame a un centro de control de envenenamiento o un doctor, o al recibir tratamiento.

LÍNEA DIRECTA DE EMERGENCIA: Para asistencia médica en emergencias (para humanos o animales) o asistencia en emergencia químicas (derrame, escape, fuego o accidente), llame al **1-800-888-8372**, abierto 24 horas.

Refiérase a las secciones de Almacenamiento Y Eliminación, Riesgos Ambientales y Riesgos físicos y químicos en este folleto.

**SCP 1306A-L3D 1214
4049390**