


(NEW 1/10/11)

94



WEED & FEED



Effectively Controls Dandelions
And Other Broadleaf Weeds

Feeds for 3 months

Nutre durante 3 meses

**Feeds up to 3 times longer than
ordinary soluble lawn fertilizer**

Nutre durante hasta 3 veces más tiempo que el fertilizante soluble
común para césped

Lawn Fertilizer Plus Weed Control

Fertilizante de césped y control de malezas

ACTIVE INGREDIENTS:	
Dimethylamine Salt of 2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid	0.809%
Dimethylamine Salt of (+)-R-2-(2-Methyl-4-Chlorophenoxy)propanoic Acid	0.157%
Dicamba (3,6-Dichloro-o-Anisic Acid)	0.050%
OTHER INGREDIENTS	98.973%
TOTAL	100.000%

Isomer Specific Method. Equivalent to:
2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid 0.65%
(+)-R-2-(2-Methyl-4-Chlorophenoxy)propanoic Acid 0.13%
*CONTAINS THE SINGLE ISOMER FORM OF MECOPROP.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION / PRECAUCIÓN

Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.
(If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)
SEE INSIDE BOOKLET FOR FIRST AID AND ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS



WEED & FEED

28-0-3

28-0-3

WEED & FEED



COVERS 5,000 SQ FT
MONEY BACK GUARANTEED • NET WT 16 LB (7.26 KG)

28-0-3
SEE BACK PANEL FOR
ANALYSIS DESCRIPTION

ACTIVE INGREDIENTS:

Dimethylamine Salt of 2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid*	0.808%
Dimethylamine Salt of (+)-R-2-(2-Methyl-4-Chlorophenoxy)propionic Acid**†	0.157%
Dicamba (3,6-Dichloro-o-Anisic Acid)	0.060%
OTHER INGREDIENTS:	98.975%
TOTAL:	100.000%

Isomer Specific Method, Equivalent to:

*2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid	0.66%
**(+)-R-2-(2-Methyl-4-Chlorophenoxy)propionic Acid	0.13%

†CONTAINS THE SINGLE ISOMER FORM OF MECOPROP-p

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION / PRECAUCIÓN**


Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a usted en detalle.
(If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)

SEE INSIDE BOOKLET FOR FIRST AID AND ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

20



PHOSPHATE FREE FERTILIZER



GUARANTEED ANALYSIS

28-0-3

Total Nitrogen (N)28.00%
28.00% Urea Nitrogen*
Soluble Potash (K₂O)3.00%

Derived from: Urea, Polymer Coated Urea and Muriate of Potash.

*Part of the nitrogen in this product has been polymer coated to provide 5.60% coated slow release nitrogen.

READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT. USE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH LABEL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND DIRECTIONS.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION / PRECAUCIÓN: Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Remove immediately after handling this product. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

Environmental Hazards

This pesticide may adversely affect non-target plants. Do not apply directly to water. Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Runoff of this product will be reduced by avoiding applications when rainfall is forecasted to occur within 48 hours. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

FIRST AID

- | | |
|-------------------------------|--|
| If on Skin or Clothing | <ul style="list-style-type: none"> Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| If in Eyes | <ul style="list-style-type: none"> Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. |

HOT LINE NUMBER

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-325-1840 for emergency medical treatment information.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT. USE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH LABEL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND DIRECTIONS. This product is a stable mixture of three herbicides. It is for use on residential turf.

A lawn typically will utilize 1 to 4 pounds of nitrogen per 1,000 square feet per growing season. When used as directed, this product will supplement your regular fertilizer program by providing .89 pounds of nitrogen per 1,000 square feet and herbicide to control listed weeds. Please consult your local extension office for questions regarding a regular fertilizer program.

This product may be used on Bahia, common Bermuda, Blue Grass, Centipede, Fescue, Rye, St. Augustine, and Zoysia grass. DO NOT USE on Dichondra and Carpet grass. DO NOT USE this product where desirable clovers are present or allow the product to "wind drift" onto flowers, vegetables, ornamentals, shrubs, trees or other desirable plants. Do not apply this product in a way that will contact any person or pets, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.


OTHER USE PRECAUTIONS

Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn or garden and sweep any product landing the driveway, sidewalk, gutter or street, back onto the treated area. To prevent product runoff, do not over water the treated area to the point of runoff or apply when raining or rain is expected that day.

This product is designed to promote lush green growth in lawns and controls many broadleaf weeds such as:

Beggarick	English daisy	Marshelder	Redstem	Wild aster
Bindweed	Far hen	Mexican poppy	Sheep sorrel	Wild carrot
Black medic	Fennel	Morningglory	Shepherdspurse	Wild garlic
Buckhorn	Florida pusley	Mustard	Sicklepod	Wild geranium
Burcucumber	Frenchweed	Nettle	Smartweed	Wild gooseberry
Burdock	Galinsoga	Oxalis	Sneezeweed	Wild jute
Buttercup	Goatsbeard	Pennycress	Sowthistle	Wild lettuce
Canada thistle	Goldenrod	Pennywort	Spanishchelle	Wild marigold
Carpenterweed	Ground ivy	Peppergrass	Speedwell	Wild onion
Catsear	Halbert-leaved saltbush	Pepperweed	Spurge	Wild penunia
Chervil	Hawkweed	Pigweed	Spurweed	Wild radish

FERTILIZANTE SIN FOSFATO



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. RESPETE EstrictAMENTE LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA.

PRECAUCIONES

Riesgos para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN: Su absorción por la piel es perjudicial. Produce irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Lávese las manos antes de comer, beber, mascar goma, usar tabaco o ir al baño. Quítese las prendas inmediatamente si el plaguicida les traspasa. A continuación, lávese bien y póngase prendas limpias. Quítese la ropa de inmediato después de manipular el producto. Lávese bien y póngase prendas limpias a la brevedad.

Riesgos Ambientales

Este plaguicida puede afectar adversamente las plantas a cuya aplicación no está destinado. No aplicar directamente sobre el agua. Su derrame puede ser riesgoso para los organismos acuáticos de los cuerpos de agua adyacentes a las áreas tratadas. Puede reducirse el derrame evitando la aplicación si se han pronosticado lluvias dentro de las 48 horas siguientes. No contamine el agua al desechar el agua del lavado o enjuague de equipos.

PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|---|--|
| En caso de Contacto con la piel o la Vestimenta: | <ul style="list-style-type: none"> Quítese de inmediato las prendas contaminadas. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para solicitar indicaciones para el tratamiento. |
| En caso de Contacto con los ojos: | <ul style="list-style-type: none"> Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y delicadamente con agua durante 15-20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si es que usa, después de los primeros 5 minutos. Luego siga enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para obtener indicaciones para el tratamiento. |

LLAMADOS A LÍNEAS DE URGENCIA

Tenga el envase del producto o la etiqueta junto a usted al llamar a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando solicite tratamiento. Puede llamar al 1-877-325-1840 para obtener información sobre el tratamiento médico de urgencia.

INSTRUCCIONES DE USO

La utilización del producto en contravío de las indicaciones del etiquetado constituye una violación de la legislación federal.

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. RESPETE EstrictAMENTE LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. Este producto es una mezcla estable de tres herbicidas. Para la aplicación en césped residencial.

En general, el césped consume entre 1 y 4 libras de nitrógeno cada 1,000 pies² por temporada de crecimiento. Si se usa de acuerdo con las instrucciones, este producto complementará su programa habitual de fertilización incorporando 0.89 libras de nitrógeno cada 1,000 pies² y herbicida para controlar las malezas indicadas. Consulte a la oficina local de difusión en caso de dudas sobre programas periódicos de fertilización.

Este producto puede aplicarse en zacate bahía (*Paspalum notatum*), zacate Bermuda (*Cynodon dactylon*), zacate azul (*Poa annua*), hierba ciempiés (*Eremochloa ophiuroides*), césped del género Fescue, césped del género Lolium, pasto San Agustín (*Stenotaphrum secundatum*) y Zoysia. NO APLIQUE SOBRE dichondra ni sombrerito (*Hydrocotyle umbellata*).

NO UTILICE este producto en áreas que contengan árboles desahilados y evitar que el viento lo "arrastre" hacia flores, vegetales, plantas decorativas, arbustos, árboles u otras plantas desahiladas.

No aplique este producto de manera que tenga contacto con personas o mascotas, ya sea en forma directa o por arrastre. Mantenga a personas y mascotas fuera del área a tratar durante la aplicación.

OTRAS PRECAUCIONES DE USO

No aplique directamente ni cerca de cuerpos de agua, bocas de tormenta, alcantarillas, sumideros ni zanjas de drenaje. No aplique a distancias menores de 25 pies de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, presas, pantanales, estuarios, bahías ni océanos. No aplique si el clima es ventoso. Aplique el producto directamente sobre el césped o jardín y barra cualquier cantidad del producto que se deposite en entradas para automóviles, veredas, alcantarillas o calles nuevamente hacia el área tratada. Para prevenir el derrame, no riegue el área tratada excesivamente ni aplique bajo lluvia o si se han pronosticado lluvias en el día.

CUÁNDO APLICAR

Los mejores resultados se obtienen cuando la maleza se encuentra en crecimiento activo durante la primavera o a inicios del otoño. Evite el contacto con arbustos, plantas, vegetales o flores desahiladas, especialmente al aplicar con un esparcidor por viento (giratorio). No reintente hasta que no hayan transcurrido al menos 3 o 4 semanas después de la aplicación. No aplique sobre césped recién sembrado ni tepes recién colocados antes de haberlos cortado 3 veces. Para obtener resultados óptimos: (1) Evite cortar el césped 1 ó 2 días antes y después de la aplicación; (2) Aplique mientras el césped esté húmedo (después de la caída de lluvia rocío); (3) Evite las interrupciones innecesarias, incluido el riego de las áreas tratadas, durante las 48 horas posteriores a la aplicación. El riego quita el material que mata las malezas y (4) Evite la aplicación si se han pronosticado lluvias dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento. Podrá efectuarse una segunda aplicación 30 días después del tratamiento inicial si el césped está densamente invadido por malezas o en caso de que predominen las condiciones adversas de baja humedad y el estado de desarrollo de las malezas sea deficiente. No exceda las cantidades máximas anuales de aplicación al voleo (1.5 lb de exposición anual MCPP-p por acre). No exceda las cantidades especificadas porque puede dañarse el césped. NOTA: Al aplicar sobre malezas suaves (en condiciones de humedad inadecuada, alta temperatura y alta humedad) la aplicación excesiva puede provocar un cambio leve y temporal de color en la hierba ciempiés y el pasto de San Agustín. Se recomienda reducir las cantidades aplicadas un 50% durante épocas de alta temperatura y aridez para evitar la posible deshidratación del césped o que adquiera una tonalidad amarillada.

CÓMO APLICAR

Faza bolsa de 48 libras rinde 15,000 pies². Aplique uniformemente con un esparcidor para césped en una sola pasada. También es aceptable aplicar en dos pasadas entrecruzadas.

OTHER USE PRECAUTIONS

Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn or garden and sweep any product landing the driveway, sidewalk, gutter or street, back onto the treated area. To prevent product runoff, do not over water the treated area to the point of runoff or apply when raining or rain is expected that day.

This product is designed to promote lush green growth in lawns and controls many broadleaf weeds such as:

Beggartick	English daisy	Marshelder	Reistern	Wild aster
Bindweed	Fir hen	Mexican poppy	Sheep sorrel	Wild carrot
Black medic	Fennel	Morningglory	Shepherdspurge	Wild garlic
Buckhorn	Florida pusley	Mustard	Sicklepod	Wild geranium
Burcucumber	Frenchweed	Nettle	Smartweed	Wild gooseberry
Burdock	Gallinsow	Oxalis	Sneezeweed	Wild jute
Buttercup	Goatshead	Pennycress	Snowflake	Wild lettuce
Canada thistle	Goldenrod	Pennywort	Spanishneedle	Wild marigold
Carpetweed	Ground ivy	Peppergass	Speedwell	Wild onion
Catscar	Halber-leaved salbrush	Pepperweed	Spurge	Wild petunia
Chervil	Hawweed	Pigweed	Spurweed	Wild radish
Chickweed	Healall	Plantain	Stinging nettle	Wild sage
Chicory	Heartleaf drymary	Poison hemlock	Stinkweed	Wintercress
Cinquefoil	Hempnettle	Poison ivy	Stitchwort	Witchweed
Clover	Henbit	Poison oak	Sunflower	Woodsorrel
Cocklebur	Hoary cress	Prickly lettuce	Thistle	Yarrow
Croton	Honeysuckle	Puncture vine	Thornapple	Yellow charlock
Daisy	Jimsonweed	Purslane	Toadflax	Yellow daisy
Dandelion	Knorweed	Ragweed	Veronica	Yellow rocket
Dock	Kochia	Red clover	Vetch	
Dogfennel	Lambquarter	Red root	Whitebrush	
Dragonhead mint	Mallow	Red sorrel	White top	

WHEN TO APPLY

Best results are obtained when weeds are growing actively in spring or early fall. Avoid contact with desirable shrubs, plants, vegetables, or flowers; especially when applying with a rotary (spinner) type spreader. Do not reseed for at least 3 to 4 weeks after application. Do not apply to newly seeded or sodded lawn until after 3 mowings. For optimum results (1) Avoid mowing 1 to 2 days before and after application; (2) **Apply when grass is moist (after a rain sprinkling or dew)**; (3) Avoid unnecessary disturbances, including watering of treated areas for 48 hours after application. Watering will wash off weed killing material; and (4) Avoid applying if rainfall is expected within 48 hours following treatment. If lawn is heavily overrun with weeds or if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor health, a second application may be made 30 days after initial treatment; however, do not exceed the maximum yearly broadcast application rate (1.5 lbs a.e. MCP-P-p per acre). Do not exceed specified rates because damage to turf may occur.

NOTE: When applying to Southern Grasses - under conditions of inadequate moisture, high temperature and high humidity, over-application may cause minor transitory discoloration on Centipede and St. Augustine grasses. It is recommended that during hot, dry conditions, application rates should be reduced 50% to avoid possible dehydration or browning of grass.

HOW TO APPLY

This 16 pound bag treats 5,000 square feet. Apply evenly with a lawn spreader as a one pass application. A two pass application, cross-crossing the area at half the rate each time is also acceptable. The following settings are approximate for applying contents of this package at a suggested rate of 3.2 pounds per 1,000 square feet. Settings are based on an average walking speed. Reduce setting for slower speed; raise setting for higher speed. Check your spreader on 250 square feet and adjust to apply at the rate of .8 pound 250 square feet.

Restrictions: Do not apply more than 2 applications per year with a minimum retreatment interval of 30 days.

SUGGESTED SPREADER SETTINGS

ONE PASS APPLICATION

DROP SPREADERS:

First, mow lawn then apply 2 border strips along each end of the lawn. Apply fertilizer along the length of the lawn overlapping slightly between passes.

ROTARY SPREADERS:

First, mow lawn then apply fertilizer in a circular pattern, working from the outer edge towards the center of the lawn. Overlap slightly to insure uniform application and complete coverage.

The listed suggested spreader settings are approximate. In general, spreaders should be calibrated to apply 1 lb. of this fertilizer product per 275 square feet of lawn. Be sure to close spreader openings when loading, turning or when stopped.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Always use original container to store pesticides and keep any bags containing unused product in locked storage area inaccessible to children and domestic animals. Do not store near other feed or foodstuffs. To prevent cross-contamination, do not store near open containers of fertilizers, seed or other pesticides.

PESTICIDE DISPOSAL: If empty - Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled - If product cannot be used as directed, or offered to others for their use, call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor (including toilet) or outdoor (including sewer) drain. For nonrefillable bags of granular or dry formulation

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Completely empty bag into application equipment, then offer for recycling if available, or dispose of empty bag in a sanitary landfill or by incineration or, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

Sweep (do not wash) all fertilizer materials from surfaces immediately after application, because certain fertilizer ingredients can cause permanent stains. Wash out spreader after each use and allow it to dry thoroughly. Treat any exposed metal spreader areas with oil to reduce corrosion.

EPA Reg. No. 228-330-59144

EPA Est. No. 59144-GA-1(A), 32802-MO-1(B), 37351-CO-1(C), 8378-IN-1(D), 9404-FL-1(E), 961-PA-01(F), 961-IL-01(G), 35497-OR-1(H), 49991-TX-2(Q)

Letter in parenthesis is first letter of lot number.

No aplique directamente en la cara de cuerpos de agua, como lagos, estanques, arroyos, presas, pantanos, estuarios, bahías ni océanos. No aplique si el clima es ventoso. Aplique el producto directamente sobre el césped o jardín y barra cualquier cantidad del producto que se deposite en entradas para automóviles, veredas, alcantarillas o calles nuevamente hacia el área tratada. Para prevenir el derrame, no riegue el área tratada excesivamente ni aplique bajo lluvia o si se han pronosticado lluvias en el día.

CUÁNDO APLICAR

Los mejores resultados se obtienen cuando la maleza se encuentra en crecimiento activo durante la primavera o a inicios del otoño. Evite el contacto con arbustos, plantas, vegetales o flores desahables, especialmente al aplicar con un esparcidor por voleo (giratorio). No riebre hasta que no hayan transcurrido al menos 3 o 4 semanas después de la aplicación. No aplique sobre césped recién sembrado ni tepes recién colocados antes de haberlos cortado 3 veces. Para obtener resultados óptimos: (1) Evite cortar el césped 1 ó 2 días antes y después de la aplicación; (2) **Aplique mientras el césped esté húmedo (después de la caída de lluvia rocío)**; (3) Evite las interrupciones innecesarias, incluido el riego de las áreas tratadas, durante las 48 horas posteriores a la aplicación. El riego quita el material que mata las malezas y (4) Evite la aplicación si se han pronosticado lluvias dentro de las 48 horas posteriores al tratamiento. Podrá efectuarse una segunda aplicación 30 días después del tratamiento inicial si el césped está densamente invadido por malezas o en caso de que predominen las condiciones adversas de baja humedad y el estado de desarrollo de las malezas sea deficiente. No exceda las cantidades máximas anuales de aplicación al voleo (1.5 lb de exposición anual MCP-P-p por acre). No exceda las cantidades especificadas porque puede dañarse el césped.

NOTA: Al aplicar sobre malezas suenas (en condiciones de humedad inadecuada, alta temperatura y alta humedad) la aplicación excesiva puede provocar un cambio leve y temporal de color en la hierba ciemply y el pasto de San Agustín. Se recomienda reducir las cantidades aplicadas un 50% durante épocas de alta temperatura y aridez para evitar la posible deshidratación del césped o que adquiera una tonalidad amarillada.

CÓMO APLICAR

Esta bolsa de 48 libras rinde 15,000 pies². Aplique uniformemente con un esparcidor para césped en una sola pasada. También es aceptable aplicar en dos pasadas entrecruzadas distribuyendo la mitad de la cantidad en cada pasada. Las siguientes son configuraciones aproximadas para aplicar el contenido del paquete en la cantidad recomendada de 3.2 libras cada 1,000 pies². Las configuraciones corresponden a una velocidad promedio de caminata. Reduzca la configuración en caso de una velocidad menor; aumentela en caso de velocidad mayor. Controle el esparcidor cada 250 pies² y ajuste para aplicar la cantidad de 0.8 libras cada 250 pies².

Restricciones: No efectúe más de 2 aplicaciones por año con un intervalo mínimo de 30 días entre repeticiones.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL ESPARCIDOR

APLICACIÓN EN UNA PASADA:

ESPARCIDORES POR GRAVEDAD:

En primer lugar, corte el césped y luego aplique 2 franjas en los bordes de cada extremo del césped. Aplique fertilizante a lo largo del césped superponiendo levemente las pasadas.

ESPARCIDORES POR VOLEO:

En primer lugar corte el césped y luego aplique el fertilizante en forma circular, desde el borde exterior hacia el centro. Superponga levemente para asegurar una aplicación uniforme y una cobertura total.

Las configuraciones recomendadas para el esparcidor son aproximadas. En general, es necesario calibrar los esparcidores para aplicar 1 lb. de fertilizante cada 275 pies² de césped. No olvide cerrar las aberturas del esparcidor al cargarlo, girar o cuando esté detenido.

ALMACENAMIENTO Y DESHECHO

No contamine el agua, los alimentos ni el pienso al almacenar o deshechar el producto.

ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS: use siempre el envase original para almacenar plaguicidas y mantenga las bolsas con producto sin usar en un área bajo llave a la que no puedan acceder niños ni animales domésticos. No almacene cerca de piensos ni alimentos. Para evitar la contaminación cruzada, no almacene cerca de recipientes abiertos de fertilizante, semillas u otros plaguicidas.

DESECHO DEL PLAGUICIDA: Si el envase está vacío: no vuelva a utilizar este recipiente. Deposite en la basura o, si es posible, ofrézcalo para su reciclaje. Si el envase está parcialmente lleno: nunca vacíe el frasco del producto sin usar en drenajes interiores (incluidos inodoros) ni exteriores (incluidos sumideros). En el caso de bolsas no recargables de formulación seca o granulada.

DESECHO DEL ENVASE: envase no recargable. No vuelva a utilizar ni rellene este envase. Vacíe la bolsa por completo en el interior del equipo aplicador y, si fuera posible, ofrézcala para su reciclaje o deséchela en un relleno sanitario o incinerar. Alternativamente, si las autoridades estatales o locales lo autorizan, quémela. En este caso, aléjese del humo.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.aapfco.org/metals.htm>

WARRANTY DISCLAIMER

The directions for use of this product must be followed carefully. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, (1) THE GOODS DELIVERED TO YOU ARE FURNISHED "AS IS" BY MANUFACTURER OR SELLER AND (2) MANUFACTURER AND SELLER MAKE NO WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THE PRODUCT SOLD, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE, OR ELIGIBILITY OF THE PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. UNINTENDED CONSEQUENCES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INEFFECTIVENESS, MAY RESULT BECAUSE OF SUCH FACTORS AS THE PRESENCE OR ABSENCE OF OTHER MATERIALS USED IN COMBINATION WITH THE GOODS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, INCLUDING WEATHER, ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF MANUFACTURER OR SELLER AND ASSUMED BY BUYER OR USER. THIS WRITING CONTAINS ALL OF THE REPRESENTATIONS AND AGREEMENTS BETWEEN BUYER, MANUFACTURER AND SELLER, AND NO PERSON OR AGENT OF MANUFACTURER OR SELLER HAS ANY AUTHORITY TO MAKE ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OR AGREEMENT RELATING IN ANY WAY TO THESE GOODS.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, MANUFACTURER OR SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR DAMAGES IN THEIR NATURE OF PENALTIES RELATING TO THE GOODS SOLD, INCLUDING USE, APPLICATION, HANDLING, AND DISPOSAL. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, MANUFACTURER OR SELLER SHALL NOT BE LIABLE TO BUYER OR USER BY WAY OF INDEMNIFICATION TO BUYER OR TO CUSTOMERS OF BUYER, IF ANY, OR FOR ANY DAMAGES OR SUMS OF MONEY, CLAIMS OR DEMANDS WHATSOEVER, RESULTING FROM OR BY REASON OF OR ARISING OUT OF THE MISUSE, OR FAILURE TO FOLLOW LABEL WARNINGS OR INSTRUCTIONS FOR USE, OF THE GOODS SOLD BY MANUFACTURER OR SELLER TO BUYER. ALL SUCH RISKS SHALL BE ASSUMED BY THE BUYER, USER, OR ITS CUSTOMERS. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, BUYER'S OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY SHALL BE FOR DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THE PRODUCT.

If you do not agree with or do not accept any of the directions for use, the warranty disclaimers, or limitations on liability, do not use the product, and return it unopened to the Seller, and the purchase price will be refunded.

*MONEY BACK GUARANTEE

If you are not completely satisfied with this product, please mail your name, address and proof of purchase (package UPC) and a brief explanation for seeking a refund.

Theresa Martinez, 2010 Used under license from Shutterstock.com

Manufactured for
Gro Tec, Inc.
P. O. Box 290
Madison, GA 30650

Covers up to 5,000 sq ft
Net Wt 16 lb (7.26 kg)

RV092310

