



**Vigoro**  
Beautiful Lawns Since 1924

Beautiful Lawns Since 1924™  
**Vigoro®**

# Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer

Herbicide para prevenir el zacate mano de  
cangrejo y fertilizante para césped

**Prevents crabgrass  
up to 4 months!**

¡Previene el zacate mano de cangrejo hasta por 4 meses!



**Greens in 72 hours and promotes thick, green growth!**

¡Reverdece su césped en 72 horas y fomenta un crecimiento tupido y verde!

**Contains time-released nitrogen for extended feeding**

Contiene nitrógeno de liberación gradual para una fertilización prolongada

**Non-staining formula!**

¡Fórmula que no mancha!

**Crabgrass Preventer  
& Lawn Fertilizer**

Herbicide para prevenir el  
zacate mano de cangrejo  
y fertilizante para césped

**Feeds  
5,000 sq ft**

**SAFE  
FOR  
TREATING  
5,000  
SQ FT**

ACTIVE INGREDIENT.....0.20%  
Dithiopyr\*.....99.80%  
OTHER INGREDIENTS.....99.80%  
TOTAL.....100.00%  
\*CAS# 97886-45-8

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION** See back panel for additional  
precautionary statements.

**MANTÉNGASE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN** Consulte el panel posterior para ver  
riesgos de precaución adicionales.

For Outdoor Residential Use Only.  
Para Utilizar en Exteriores  
Residenciales Solamente.

**Feeds 5,000 SQ FT**

**APPLY EARLY SPRING OR FALL**

**APLÍQUELO A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA O EN OTOÑO**



**GARDEN CLUB**  
MEMBERSHIP IS FREE!  
¡LA MEMBRÍA ES GRATIS!  
[www.homedepotgardenclub.com](http://www.homedepotgardenclub.com)

**30-0-4**

**Net Wt/Peso Neto  
14.5 lb (6.5 kg)**

EPA Reg No. 73327-5 (5M)  
Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer

# Why Fertilize the Lawn?

¿Por qué fertilizar el césped?

- 1 Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener, longer and bounces back faster
- 2 Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning
- 3 Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds



While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...

Aunque es fácil ver ese satisfactorio verde profundo al fertilizar, las fertilizaciones regulares en realidad pueden hacer mucho más...

- 1 Fomenta un sistema de raíces profundo y denso que está en mejores condiciones para llegar al agua y encontrar los nutrientes durante el calor fuerte y la sequía, por lo que el césped se mantiene más verde durante más tiempo y se recupera más rápidamente
- 2 Tupa el césped con hojas adicionales de grama, haciéndolo más resistente contra áreas vacías y ralas
- 3 Ayuda a prevenir las malezas al hacer más difícil que las semillas de las malezas en el aire encuentren tierra para arraigarse, así como a desplazar las malezas existentes

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not allow people or pets to enter the treated area until this material is washed into turf and grass is dry.

### Before You Use:

- Read and follow these use precautions when you use this product.
- Apply only to lawns and ornamental turf that are well established.
- Wait at least 12 weeks after using this product before reseeding, overseeding or springing of grass into areas that have been treated.
- Use of product on new lawns or grass that has been weakened or stressed by drought, excessive temperatures or pests increases chance of injury to grass.
- Heavy raking should be done prior to application as raking after application may scratch the barrier and reduce the effectiveness of this product.
- When applying around ponds or other bodies of water, do not apply in windy conditions or where product can run off into water.
- Do not use grass clippings as mulch around vegetables or fruit trees.
- Do not use on grass growing in areas where the maximum application rate of Dithiopyr is 0.25 lb of active ingredient per acre per year. Do not make more than one application of this product to the same area in the same year.
- FOR ALL OTHER STATES, the maximum number of applications is two per year. Allow at least a 4-month interval between applications.

### General Use Directions:

1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in square feet (length x width). **Never, subtract non-lawn areas.**
2. Apply the spreader setting chart to determine appropriate setting.
3. Treat as directed — thorough coverage is important. Be sure to water in after application.

### When To Use:

- In New York, this product may be applied only in the early spring OR early fall for the control of weeds. See New York directions above.
- Product may be applied in early spring AND early fall for the control of weeds.
- Product will provide up to 4 months control of listed weeds when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.
- To get control of listed weeds other than crabgrass, applications must be made before weeds emerge.

### What It Does:

- This product provides nutrients your lawn needs to grow thick and green while forming a protective barrier on the soil that blocks crabgrass and other listed weeds from germinating.
- This product will control crabgrass up to the first tillering, which is when crabgrass is first visible in a lawn or turf.
- This product will provide season-long crabgrass control up to 4 months when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.

### Where To Use:

This product can be used on the following types of grass when applied as directed:  
Cool Season Grasses: Kentucky Bluegrass (Kentucky), Fescue (fine), Fescue (tall), Ryegrass (perennial)  
Warm Season Grasses: Bahia, Bermuda, Buffalograss, Carpetgrass, Centipede, Kikuyagrass, St. Augustine, Zoysiagrass

### How To Apply:

- Always use a fertilizer spreader. See spreader settings chart for spreader settings.
- Apply this product at the rate of 2.9 lb per 1,000 sq ft (one bag treats 5,000 sq ft). For best results, water within two to three days after application.
- Calibrate your spreader according to the spreader manufacturer's directions. Adjust settings as needed to apply the recommended rate of product.
- Using a drop-type or rotary spreader, apply granules evenly over grass, avoiding streaking, skips or overlaps. Avoid using spreaders that apply product in narrow or concentrated bands.
- Check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly. **IMPORTANT:** Follow directions carefully as overapplication may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed of application, and roughness of area treated. Be sure to calibrate spreader before beginning, and adjust as necessary. NEVER APPLY BY HAND.
- Avoid gaps and streaks. First spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk on a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn. Typically, a lawn utilizes 1 to 4 lb of nitrogen per 1,000 sq ft per growing season. When applied as directed, this product provides 0.67 lb of nitrogen per 1,000 sq ft. Contact your local Extension Service for information specific to your geographic region.

## WEEDS CONTROLLED

### Pre- and Early Post-Emergent Crabgrass

Pre-Emergent (Preventative): Annual Bluegrass, Annual Ryegrass, Barnyardgrass, Crabgrass, Crowsfootgrass, Goosegrass, Green Foxtail, Smartweed, Yellow Foxtail. Broadleaf Weeds: Bittersweet, Chickweed, Oxalis, Carolina Geranium, Carpetweed, Chickweed, Common Bluegrass, Common Purslane, Corn Speedwell, Creeping Oxalis, henbit, Lawn Rocket, Mustard, Parsley-piert, Pineapple-weed, Prostrate Spurge, Spotted Spurge, Shepherd's-Purse, Redroot Pigweed, Yellow Woodsoor.

Fall Application: When applied pre-emergence (prior to germination) in late summer through early fall (late August through November), this product will control or suppress the following weeds: Annual Bluegrass, Bittersweet, Common Chickweed, Carolina Geranium, Corn Speedwell, Henbit, Mustard, Parsley-piert, Pineapple-weed, Shepherd's-Purse.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### Hazards to Humans & Domestic Animals

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Harmful if inhaled. Avoid breathing dust. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Prolonged or repeated skin contact may cause allergic skin reactions in some individuals.

### First Aid

- If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
- If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

### Environmental Hazards:

This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including surface and shrimp. Do not apply to areas where surface water is present, or to inland areas below the mean high water mark. Do not apply to areas where surface water is present, or to inland areas below the mean high water mark. Do not apply to areas where surface water is present, or to inland areas below the mean high water mark. Do not apply to areas where surface water is present, or to inland areas below the mean high water mark.

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.  
**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** If empty: Nonhazardous container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with terms of this label and directions of use.

### Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 30-0-4

### GUARANTEED ANALYSIS:

Total Nitrogen (N) 30.0%  
30.0% Urea Nitrogen\*  
Soluble Potash (K<sub>2</sub>O) 4.0%

\*Derived from: Polymer-coated Urea, Urea, and Potassium Chloride.

\*Contains 6.1% slowly available Nitrogen from coated Urea.

### VIGORO GARANTIE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase, and we will mail you a refund check promptly.

Information regarding the contents and levels of nutrients in this product is available on the Internet at <http://www.aspla.com/metal.htm>

EPA Reg. No. 73327-5

EPA Est. Nos. 9198-OH-16, 9198-OH-27, 9198-AL-001, 35512-FL-27, 538-OH-27, 084175-TX-001, 13497-OH-17, 82757-FL-001, 82751-OH-002, 034637-OH-27, 66876-OH-01

Superscript used is first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754 ©2011

## Next Feeding

Feed every 8 weeks for optimal results  
Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos



### Apply anytime weeds are actively growing!

Aplicarlo en cualquier momento en que las malezas están creciendo activamente.

Maximum of 2 applications per year



### Or Apply anytime during the growing season.

Aplicarlo en cualquier momento durante la temporada de crecimiento.

DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED  
DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA QUE SERÁ TRATADA



**SPREADER SETTINGS:**  
POSICIONES DEL ESPARCIDOR:  
A 14.5 lb. bag covers 5,000 sq. ft. Use the settings below to apply at a rate of 2.9 lb per 1,000 sq. ft.

BROADCAST/ROTARY SPREADERS: VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000 3%

SCOTT'S BROADCAST/ROTARY SPREADERS: SCOTT'S BASIC™, STANDARD™, DELUXE™, EDGEQUARD™, LAWN PRO™, SPEEDGREEN™ 4%

SCOTT'S TURF BUILDER™, EDGEQUARD™, DLX OR MINI 7%

DRIP SPREADERS: SCOTT'S DROP SPREADERS, SCOTT'S ACQUADROP, SCOTT'S TURF BUILDER™ CLASSIC DROP 7%



## INSTRUCCIONES

Es una violación de la ley Federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta. No permita que ninguna persona o mascota ingrese al área tratada hasta que este material haya entrado en el césped y la grama esté seca.

### Antes de Usar:

- Leer y seguir estas precauciones cuando use este producto:
- Aplíquelo sólo en céspedes y césped decorativo bien arraigado.
- Espere por lo menos 12 semanas después de usar este producto para resembrar, esparcir semilla o colocar retoños nuevos de césped en las áreas tratadas.
- El uso del producto en césped nuevo o césped que ha sido debilitado o ha sido sometido a estrés por sequía, temperaturas excesivas o plagas aumenta las probabilidades de dañar el césped.
- Se debe rastrear bien antes de la aplicación ya que el rastro lateral posterior a la aplicación puede dañar la barrera y disminuir la efectividad del producto.
- Cuando lo aplique alrededor de estanques u otros cuerpos de agua, no lo haga cuando haya viento o donde el producto pueda desplazarse hacia el agua.
- No utilice los restos de grama como cubrensores orgánicos alrededor de vegetales y árboles frutales.
- En Nueva York: la aplicación máxima de dithiopyr es de 0.25 lb de ingrediente activo por acre por año. No realice más de una aplicación de este producto en la misma área del mismo año.
- PARA LOS DEMÁS ESTADOS: la cantidad máxima de aplicaciones es de dos por año. Deje un intervalo de un mínimo de 4 meses entre cada aplicación.

### Instrucciones de Uso General:

1. Determine el tamaño del área a tratar: mida el largo y el ancho en pies y luego multiplíquelos para determinar el área de cobertura en pies² (largo x ancho). **Luego, reste las áreas que no sean césped.**
2. Utilice la tabla de posiciones del esparcidor para determinar la posición adecuada.
3. Aplíquelo según lo indicado; es importante cubrir por completo. Asegúrese de regar después de la aplicación.

### Cuándo Usar:

- En Nueva York, este producto puede aplicarse sólo a principios de primavera O a principios de otoño para controlar las malezas. Consulte las instrucciones para Nueva York mencionadas anteriormente.
- Este producto puede aplicarse a principios de primavera Y a principios de otoño para controlar las malezas.
- El producto proporcionará un control de las malezas enumeradas cuando se use según las instrucciones. Sin embargo, la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y la presión de las malezas.
- Para lograr el control de las malezas enumeradas, excepto el zacate mano de cangrejo, las aplicaciones deben realizarse antes de que las malezas germinen.

### Lo Que Hace:

- Este producto proporciona los nutrientes que su césped necesita para crecer rápido y verde mientras forma una barrera protectora en el suelo que evita la germinación de zacate mano de cangrejo y otras malezas enumeradas.
- Este producto controla el crecimiento de cangrejo hasta el primer movimiento de tierra, que es el momento en que el zacate mano de cangrejo es visible por primera vez en el césped.
- Este producto proporcionará un control de malezas para toda la temporada hasta por 4 meses; cuando se use según las instrucciones. Sin embargo, la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y la presión de las malezas.

### Dónde Usar:

Este producto puede usarse en los siguientes tipos de césped cuando se aplica según las instrucciones:  
Césped de temporada fría: grama bent grass (estolonaria), pasto azul (Kentucky), calahua (tall fescue), riel (perenne)  
Césped de temporada cálida: grama Bahia, Bermuda, buffalo, alfombra, Cempes, Kikuyu, San Agustín, zoysa

### Cómo Aplicar:

Use siempre un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de posiciones del esparcidor para ver las proporciones de las posiciones del esparcidor.

1. Aplique el producto en una proporción de 2.9 lb por cada 1,000 pies² (una bolsa sirve para tratar 5,000 pies²). Para obtener mejores resultados, regue dentro de los 2 a 3 días posteriores a la aplicación.
2. Calibre el esparcidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Ajuste las posiciones según sea necesario para aplicar la proporción de producto recomendada.
3. Usando un esparcidor por golpe o giratorio, aplique granulos de forma pareja sobre el césped, evitando líneas de separación, cruces y líneas sin aplicar. Evite aplicar en estructuras que actúan o producen en bandos escarpados o contenidos.
4. Compruebe la calibración del esparcidor con frecuencia para asegurarse de que funcione correctamente y aplique el producto de forma pareja.

**IMPORTANTE:** Siga las instrucciones cuidadosamente ya que una aplicación excesiva podría dañar el césped. Las posiciones del esparcidor son aproximadas. Puede haber diferencias debido a la condición del esparcidor, la velocidad de aplicación del producto y la aspereza del área tratada. Asegúrese de calibrar el esparcidor antes de comenzar y ajustar si es necesario. NUNCA LO APLIQUE CON LA MANO.

Para evitar que queden áreas sin aplicar o líneas de separación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable para aplicar el producto de manera uniforme de desechos sólidos más cenizas para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto no utilizado en un drenaje interno o externo.

Comunique con el Servicio de Extensión local si desea información específica para su región geográfica.

## MALEZAS CONTROLADAS

### Antes y al inicio de la germinación: zacate mano de cangrejo

Antes de la germinación (preventiva): Malezas gramíneas: pasto azul anual, rielgras anual, capón anual, zacate mano de cangrejo, zacate egipcio, pie de gallina, zacate coque de zorro, verde, pasto almizcle (plantillas), zacate coque de zorro amarillo. Malezas de hoja ancha: berro anual, celidonia menor, geranio silvestre, ancillo, estallido, espespeque común, verdolaga común, verónica del mulo, apocis, ortiga mayor, mostaza, mostaza por de León, mentrillo, bieta, rastrojero, tatarajo mojado, bolsa del pastor, sanguinaria, agrotis anual.

Aplicación en otoño: cuando se aplica antes de la germinación desde finales del verano hasta principios del otoño (finales de agosto hasta noviembre), este producto controla o suprime las siguientes malezas: pasto azul anual, berro amarillo, espespeque común, geranio silvestre, verónica del mulo, ortiga menor, mostaza, pie de León, mentrillo, bieta, rastrojero.

## RIESGOS DE PRECAUCIÓN

### Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN:** Causa una irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Llévese completamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, consumir goma de mascar o tabaco. Dálmelo se inhaló. Evite respirar el polvo. Quedese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usar. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas.

### Primeros Auxilios

- Si entra en los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, retirarlos después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.
- Si se inhaló: Llevar a la persona al aire fresco. Si la persona no puede respirar, llamar al 911 o a una ambulancia y luego, darle respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.

NOTA: Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

### Riesgos Ambientales:

Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos tales como crustáceos y camarones. No lo aplique directamente al agua, en áreas donde haya agua superficial o en áreas entre mareas bajas la marea alta promedios de agua. La deriva y desplazamiento puede ser peligroso para los organismos acuáticos en las áreas vecinas. No contamine el agua al desahucarse de la que usó para limpiar o enjuagar el equipo. No se debe aplicar cuando las condiciones climáticas favorecen el flujo de la parte desde las áreas tratadas. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se acumule en drenajes pluviales, canales de drenaje, canales o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima tranquilo cuando no haya pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o viertan el pesticida del área de tratamiento. Bese el producto que cae en el camino de escape, antes o en la ruta de regreso al área tratada del césped ayudará a evitar que se escurra a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guárdelo en un lugar limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Si está vacío: Envase que no se puede relleno. No vuelva a usar o relleno: Tirelo en la basura o puede ofrecerse para reciclaje, si existe esa opción. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de eliminación de desechos sólidos más cenizas para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto no utilizado en un drenaje interno o externo.

NOTA: En la medida en que lo permita la ley aplicable, el comprador asume toda responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

### GARANTÍA VIGORO:

Si por cualquier razón usted, el consumidor, no está satisfecho después de usar este producto, tiene derecho a que le devolvamos su dinero. Simplemente envíenos su prueba de compra y nosotros le enviaremos rápidamente por correo un cheque de reembolso.



Visit Us On The Internet  
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visitenos en el Internet  
Para información en español

vigoro.com or 1-866-779-5850



VIG-PP P52202-1  
100% SIZE  
FOR POSITION ONLY  
REPLACE WITH LINE CODE  
71645 152202  
0

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 30-0-4

Beautiful Lawns Since 1924™  
**Vigoro®**

# Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer

Herbicida para prevenir el zacate mano de  
cangrejo y fertilizante para césped

**Prevents crabgrass  
up to 4 months!**

¡Previene el zacate mano de cangrejo hasta por 4 meses!



**Greens in 72 hours and promotes thick, green growth!**

¡Reverdece su césped en 72 horas y fomenta un crecimiento tupido y verde!

**Contains time-released nitrogen for extended feeding**

Contiene nitrógeno de liberación gradual para una fertilización prolongada

**Non-staining formula!**

¡Fórmula que no mancha!

**ACTIVE INGREDIENT:**

Dithiopyr\*.....0.20%  
OTHER INGREDIENTS..... 99.80%  
TOTAL.....100.00%

\*CAS# 97886-45-8

For Outdoor Residential Use Only.  
Para Utilizar en Exteriores  
Residenciales Solamente.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION** See back panel for additional  
precautionary statements.

**MANTÉNGASE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN** Consulte el panel posterior para ver  
riesgos de precaución adicionales.

**Feeds 5,000 SQ FT**

**APPLY EARLY SPRING OR FALL**

**APLÍQUELO A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA O EN OTOÑO**

3/17/11 SSL

Page 4 of 6



**GARDEN CLUB**

MEMBERSHIP IS FREE!

¡LA MEMBRESÍA ES GRATIS!

[www.homedepotgardenclub.com](http://www.homedepotgardenclub.com)

**30-0-4**

**Net Wt/Peso Neto  
14.5 lb (6.5 kg)**

EPA Reg No. 73327-5 (5M)

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer

# Why Fertilize the Lawn?


## ¿Por qué fertilizar el césped?

1. Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener, longer and bounces back faster
2. Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning
3. Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds

United Lawn  
Césped sin fertilización



Regularly Fed Lawn  
Césped con fertilización regular



1. Fomenta un sistema de raíces profundo y denso que está en mejores condiciones para llegar al agua y encontrar los nutrientes durante el calor fuerte y la sequía, por lo que el césped se mantiene más verde durante más tiempo y se recupera más rápidamente
2. Tupe el césped con hojas adicionales de grama, haciéndolo más resistente contra áreas vacías y ralas
3. Ayuda a prevenir las malezas al hacer más difícil que las semillas de las malezas en el aire encuentren tierra para arraigarse, así como a desplazar las malezas existentes

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not allow people or pets to enter the treated area until this material is washed into turf and grass is dry.

### Before You Use:

Read and follow these use precautions when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf that are well established.
- Wait at least 12 weeks after using this product before reseeding, overseeding or sprigging of grass into areas that have been treated.
- Use of product on new lawns or grass that has been weakened or stressed by drought, excessive temperatures or pests increases chance of injury to grass.
- Heavy raking should be done prior to application as raking after application may scratch the barrier and reduce the effectiveness of this product.
- When applying around ponds or other bodies of water, do not apply in windy conditions or where product can run off into water.
- Do not use grass clippings as mulch around vegetables or fruit trees.
- In New York — The maximum application rate of Dithiopyr is 0.25 lb of active ingredient per acre per year. Do not make more than one application of this product to the same area in the same year.
- FOR ALL OTHER STATES, the maximum number of applications is two per year. Allow at least a 4-month interval between applications.

### General Use Directions:

1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in square feet (length x width). Next, subtract non-lawn areas.
2. Use the spreader setting chart to determine appropriate setting.
3. Treat as directed — thorough coverage is important. Be sure to water in after application.

### When To Use:

- In New York, this product may be applied only in the early spring OR early fall for the control of weeds. See New York directions above.
- Product may be applied in early spring AND early fall for the control of weeds.
- Product will provide up to 4 months control of listed weeds when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.
- To get control of listed weeds other than crabgrass, applications must be made before weeds emerge.

### What It Does:

- This product provides nutrients your lawn needs to grow thick and green while forming a protective barrier on the soil that blocks crabgrass and other listed weeds from germinating.
- This product will control crabgrass up to the first tillering, which is when crabgrass is first visible in a lawn or turf.
- This product will provide season-long crabgrass control up to 4 months when used as directed, although length of control can be affected by weather, grass conditions and weed pressures.

### Where To Use:

This product can be used on the following types of grass when applied as directed:

**Cool Season Grasses:** Bentgrass (creeping), Bluegrass (Kentucky), Fescue (fine), Fescue (tall), Ryegrass (perennial)  
**Warm Season Grasses:** Bahia, Bermuda, Buffalograss, Carpetgrass, Centipede, Kikuyugrass, St. Augustine, Zoysiagrass

### How To Apply:

Always use a fertilizer spreader. See spreader settings chart for spreader setting rates.

1. Apply this product at the rate of 2.9 lb per 1,000 sq ft (one bag treats 5,000 sq ft). For best results, water within two to three days after application.
2. Calibrate your spreader according to the spreader manufacturer's directions. Adjust settings as needed to apply the recommended rate of product.
3. Using a drop-type or rotary spreader, apply granules evenly over grass, avoiding streaking, skips or overlaps. Avoid using spreaders that apply product in narrow or concentrated bands.
4. Check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly.

**IMPORTANT:** Follow directions carefully as overapplication may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed of application, and roughness of area treated. Be sure to calibrate spreader before beginning, and adjust as necessary. NEVER APPLY BY HAND.

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn. Typically, a lawn utilizes 1 to 4 lb of nitrogen per 1,000 sq ft per growing season. When applied as directed, this product provides 0.87 lb of nitrogen per 1,000 sq ft. Contact your local Extension Service for information specific to your geographic region.

## Next Feeding

Feed every 8 weeks for optimal results  
Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos



Apply anytime  
weeds are actively  
growing.\*

Aplicarlo en cualquier  
momento en que las  
malezas están creciendo  
activamente.\*

\* Maximum of 2  
applications per year

(Maximum 2 aplicaciones al año)


or

Apply anytime  
during the  
growing season.

Aplicarlo en cualquier  
momento durante la  
temporada de crecimiento



DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED  
DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA QUE SERÁ TRATADA



**SPREADER SETTINGS:  
POSICIONES DEL ESPARCIDOR:**  
A 14.5 lb. bag covers 5,000 sq ft. Use the settings below to  
apply at a rate of 2.9 lb per 1,000 sq ft.

| BROADCAST/ROTARY SPREADERS<br>AL VOLADO/ROTATORIOS                                                                                                                 | ESPARCIDORES DE SIEMBRAS<br>AL VOLEO/ROTATORIOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VIGORO® BROADCAST/ROTARY SPREADERS<br>VIGORO 4360, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000                                                                                    | 3 1/2                                           |
| SCOTTS® BROADCAST/ROTARY SPREADERS<br>SCOTTS BASIC™, STANDARD™, DELUXE™ EDGE GUARD®,<br>LAWN PRO®, SPEEDY GREEN®,<br>SCOTTS TURF BUILDER® EDGE GUARD®, DLX OR MINI | 4 1/2                                           |

## INSTRUCCIONES

Es una violación a la ley Federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta. No permita que ninguna persona o mascota ingrese al área tratada hasta que este material fluya entre el césped y la grama esté seca.

### Antes de Usar:

Lea y siga estas precauciones cuando use este producto:

- Aplíquelo sólo en céspedes y césped decorativo bien arraigado.
- Espere por lo menos 12 semanas después de usar este producto para resombrar, esparcir semilla o colocar retoños nuevos de césped en las áreas tratadas.
- El uso del producto en césped nuevo o césped que ha sido debilitado o ha sido sometido a estrés por sequía, temperaturas excesivas o plagas aumenta las probabilidades de dañar el césped.
- Se debe rastillar bien antes de la aplicación ya que el rastillado posterior a la aplicación puede dañar la barrera y disminuir la efectividad del producto.
- Cuando lo aplique alrededor de estanques u otros cuerpos de agua, no lo haga cuando haya viento o donde el producto pueda desplazarse hacia el agua.
- No utilice los recortes de grama como cubresuelos orgánico alrededor de vegetales y árboles frutales.
- En Nueva York: la aplicación máxima de dithiopyr es de 0.25 libras de ingrediente activo por acre por año. No realice más de una aplicación de este producto en la misma área el mismo año.
- PARA LOS DEMÁS ESTADOS: la cantidad máxima de aplicaciones es de dos por año. Deje un intervalo de un mínimo de 4 meses entre cada aplicación.

### Instrucciones de Uso General:

1. Determine el tamaño del área a tratar: mida el largo y el ancho en pies y luego multiplíquelos para determinar el área de cobertura en pies<sup>2</sup> (largo x ancho). Luego, reste las áreas que no sean césped.
2. Utilice la tabla de posiciones del esparcidor para determinar la posición adecuada.
3. Aplíquelo según lo indicado: es importante cubrir por completo. Asegúrese de regar después de la aplicación.

### Cuándo Usar:

- En Nueva York, este producto puede aplicarse sólo a principios de primavera O a principios de otoño para controlar las malezas. Consulte las instrucciones para Nueva York mencionadas anteriormente.
- Este producto puede aplicarse a principios de primavera Y a principios de otoño para controlar las malezas.
- El producto proporcionará hasta 4 meses de control de las malezas enumeradas cuando se use según las instrucciones. Sin embargo, la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y la presión de las malezas.
- Para lograr el control de las malezas enumeradas, excepto el zacate mano de cangrejo, las aplicaciones deben realizarse antes de que las malezas germinen.

### Lo Que Hace:

- Este producto proporciona los nutrientes que su césped necesita para crecer tupido y verde mientras forma una barrera protectora en el suelo que evite la germinación de zacate mano de cangrejo y otras malezas enumeradas.
- Este producto controlará el zacate mano de cangrejo hasta el primer movimiento de tierra, que es el momento en que el zacate mano de cangrejo es visible por primera vez en el césped.
- Este producto proporcionará un control de malezas para toda la temporada (hasta por 4 meses) cuando se use según las instrucciones. Sin embargo, la duración del control puede estar afectada por el clima, las condiciones del césped y la presión de las malezas.

### Dónde Usar:

Este producto puede usarse en los siguientes tipos de césped cuando se aplica según las instrucciones:  
Césped de temporada fría: grama Bent grass (estolonifera), pasto azul (Kentucky), cañuela (fina), cañuela (lata), raigrás (perenne)  
Césped de temporada cálida: grama Bahía, Bermuda, búfalo, alfombra, ciempiés, kikuyu, San Agustín, zoysia

### Cómo Aplicar:

Use siempre un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de posiciones del esparcidor para ver las proporciones de las posiciones del esparcidor.

1. Aplique el producto en una proporción de 2.9 libras por cada 1,000 pies<sup>2</sup> (una bolsa sirve para tratar 5,000 pies<sup>2</sup>). Para obtener mejores resultados, riegue dentro de los 2 a 3 días posteriores a la aplicación.
2. Calibre el esparcidor de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Ajuste las posiciones según sea necesario para aplicar la proporción de producto recomendada.
3. Usando un esparcidor por gajos o giratorio, aplique granulos de forma pareja sobre el césped, evitando líneas de separación, traslapes y áreas sin aplicar. Evite usar esparcidores que aplican el producto en bandas estrechas o concentradas.
4. Compruebe la calibración del esparcidor con frecuencia para asegurarse de que funcione correctamente y aplique el producto de forma pareja.

**IMPORTANTE:** Siga las instrucciones cuidadosamente ya que una aplicación excesiva podría dañar el césped. Las posiciones del esparcidor son aproximadas. Puede haber diferencias debido a la condición del esparcidor, la velocidad de aplicación del producto y la espesura del área tratada. Asegúrese de calibrar el esparcidor antes de comenzar y ajustarlo si es necesario. NUNCA LO APLIQUE CON LA MANO.

Para evitar que crezcan áreas sin aplicar o líneas de separación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable para aplicar el producto de manera uniforme sobre todo el césped. El césped generalmente utiliza entre 1 y 4 libras de nitrógeno por cada 1,000 pies<sup>2</sup> por temporada de crecimiento. Cuando se aplica según lo indicado, este producto proporciona 0.87 libras de nitrógeno por cada 1,000 pies<sup>2</sup>. Comuníquese con el Servicio de Extensión local si desea información específica para su región geográfica.

## WEEDS CONTROLLED

**Pre- and Early Post-Emergent:** Crabgrass

**Pre-Emergent (Preventative):** Grass Weeds: Annual Bluegrass, Annual Ryegrass, Barnyardgrass, Crabgrass, Crowfootgrass, Goosegrass, Green Foxtail, Smutgrass (seedling), Yellow Foxtail. **Broadleaf Weeds:** Bittercress, Buttercup Oxalis, Carolina Geranium, Carpetweed, Chickweed, Common Lespedeza, Common Purslane, Corn Speedwell, Creeping Oxalis, Henbit, London Rocket, Mustard, Parsley-piert, Pineapple-weed, Prostrate Spurge, Spotted Spurge, Shepherd's-Purse, Redroot Pigweed, Yellow Woodsorrel.

**Fall Application:** When applied pre-emergence (prior to germination) in late summer through early fall (late August through November), this product will control or suppress the following weeds: Annual Bluegrass, Bittercress, Common Chickweed, Carolina Geranium, Corn Speedwell, Henbit, Mustard, Parsley-Piert, Pineapple-weed, Shepherd's-Purse.

SCOTT'S BASIC®, STANDARD®, DELUXE®, EDGE GUARD®,  
LAWN PRO®, SPEEDY GREEN®,  
SCOTT'S TURF BUILDER® EDGE GUARD® DLX OR MINI 4½

**DROP SPREADERS** **ESPARCIDORES POR GOTEÓ**

SCOTT'S® DROP SPREADERS  
SCOTT'S ACCUGREEN®  
SCOTT'S TURF BUILDER® CLASSIC DROP 7½



## MALEZAS CONTROLADAS

**Antes y al inicio de la germinación:** zacate mano de cangrejo

**Antes de la germinación (preventivo):** Malezas gramíneas: pasto azul anual, raigrás anual, capín arroz, zacate mano de cangrejo, zacate egipcio, pie de gallina, zacate cola de zorro verde, pasto alambre (plántulas), zacate cola de zorro amarillo. **Malezas de hoja ancha:** berro amargo, celidonia menor, geranio silvestre, anicillo, estalaria, lespedeza común, verdolaga común, verónica del maíz, agritos, ortiga mansa, mostacilla, mostaza, pie de león, matricaria, bledo rastro, tártago moteado, bolsa del pastor, sanguinaria, agritos amarillo.

**Aplicación en otoño:** cuando se aplica antes de la germinación desde finales del verano hasta principios del otoño (finales de agosto hasta noviembre), este producto controlará o suprimirá las siguientes malezas: pasto azul anual, berro amargo, estalaria común, geranio silvestre, verónica del maíz, ortiga mansa, mostaza, pie de león, matricaria, bolsa del pastor.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

**Hazards to Humans & Domestic Animals**

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Harmful if inhaled. Avoid breathing dust. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Prolonged or repeated skin contact may cause allergic skin reactions in some individuals.

### First Aid

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If in eyes: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.</li> </ul>          |
| If Inhaled: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Move person to fresh air.</li> <li>If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.</li> <li>Call a Poison Control Center or doctor for further treatment advice.</li> </ul> |

**NOTE:** Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

### Environmental Hazards:

This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas.

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off in to storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.

**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**NOTICE:** To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with terms of this label and directions of use.

### Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 30-0-4

#### GUARANTEED ANALYSIS:

**F1305**

Total Nitrogen (N) ..... 30.0%  
30.0% Urea Nitrogen\*  
Soluble Potash (K<sub>2</sub>O).....4.0%

**Derived from:** Polymer-coated Urea, Urea, and Potassium Chloride.

\*Contains 6.1% slowly available Nitrogen from coated Urea.

#### VIGORO GUARANTEE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase, and we will mail you a refund check promptly.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.aapfco.org/metals.htm>

EPA Reg. No. 73327-5

EPA Est. Nos. 9198-OH-1<sup>st</sup>, 9198-OH-2<sup>nd</sup>, 9198-AL-001<sup>st</sup>, 35512-FL-2<sup>nd</sup>, 538-OH-1<sup>st</sup>, 538-OH-2<sup>nd</sup>, 084175-TX-001<sup>st</sup>,

35497-OR-1<sup>st</sup>, 82757-FL-001<sup>st</sup>, 82757-OH-001<sup>st</sup>, 82757-MA-002<sup>nd</sup>, 034637-OH-2<sup>nd</sup>, 66876-OR-001<sup>st</sup>

Superscript used is first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754 ©2011

## RIESGOS DE PRECAUCIÓN

**Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos**

**PRECAUCIÓN:** Causa una irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese completamente con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, consumir goma de mascar o tabaco. Dañino si se inhala. Evite respirar el polvo. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas.

### Primeros Auxilios

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si entra en los ojos: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, retirarlos después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos.</li> <li>Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.</li> </ul> |
| Si se inhala:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Llevar a la persona al aire fresco.</li> <li>Si la persona no puede respirar, llamar al 911 o a una ambulancia y luego, darle respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.</li> <li>Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.</li> </ul>              |

**NOTA:** Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

### Riesgos Ambientales:

Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos tales como ostras y camarones. No lo aplique directamente al agua, en áreas donde hay agua superficial o en áreas entre mareas bajo la marca alta promedio de agua. La deriva y desplazamiento puede ser peligroso para los organismos acuáticos en las áreas vecinas. No contamine el agua al deshacerse de la que usó para limpiar o enjuagar el equipo. No se debe aplicar cuando las condiciones climáticas favorecen el flujo por tierra desde las áreas tratadas.

Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima tranquilo cuando no haya pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a asegurarse que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Barrer el producto que cae en el camino de acceso, aceras o en la calle de regreso al área tratada del césped ayudará a evitar que se escurra a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN


**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guárdelo en un lugar limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Si está vacío: Envase que no se puede rellenar. No vuelva a usar o rellenar este envase. Tirelo en la basura o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de eliminación de desechos sólidos más cercana para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto no utilizado en un drenaje interno ni externo.

**NOTA:** En la medida en que lo permita la ley aplicable, el comprador asume toda responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

#### GARANTÍA VIGORO:

Si por cualquier razón usted, el consumidor, no está satisfecho después de usar este producto, tiene derecho a que se le devuelva su dinero. Simplemente envíenos su prueba de compra y nosotros le reembolsaremos rápidamente por correo un cheque de reembolso.



**Visit Us On The Internet**  
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

**Visitenos en el Internet**  
Para información en español

**vigoro.com or 1-866-779-5850**

**VID-PP P52202-1**  
**Proof of Purchase**

**100% SIZE**  
FOR POSITION ONLY

**EPO**  
REPLACE WITH LIVE BAR CODE  
FROM THIS NUMBER

71645 52202

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 5M 52202-1