



Fresa (control del tizón de la hoja, la mancha de la hoja y el oídio): Mezcle 1½ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. Este producto se puede aplicar hasta el día de la cosecha. No aplique más de 6 veces por temporada. No siembre un nuevo cultivo en el mismo lugar que el cultivo al que se aplicó el tratamiento antes de los 30 días de la última aplicación. Aplique cuando aparezca la enfermedad por primera vez o cuando las condiciones (tiempo calor y húmedo) favorezcan la aparición de la enfermedad. Aplique nuevamente cada 14 a 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

MORAS

Para todas las moras, este producto se puede aplicar hasta el día de la cosecha.

Zarzamora*, frambuesa*, mora de Logan (control de la roya marrón de la hoja y la caña, la mancha de la hoja, la roya naranja, el oídio y la roya amarilla): Mezcle 2½ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No aplique más de 4 veces por temporada. Aplique en la brotación y vuelva a aplicar cada 10 a 14 días mientras persistan los síntomas de enfermedad.

Grosella (control del oídio): Mezcle 1¼ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No aplique más de 8 veces por temporada. Aplique antes de la floración, durante la misma y hasta 2 semanas después de la floración.

Grosella espinosa (control de antracnosis y oídio): Mezcle 1¼ onz. líq. de concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox® con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No aplique más de 8 veces por temporada. Para la antracnosis, aplique cuando la primera hoja se haya abierto por completo. Si las condiciones favorecen la aparición de la enfermedad (tiempo calor y húmedo), vuelva a aplicar cada 10 a 14 días. Para el oídio, aplique este producto antes de la floración, durante la misma y hasta 2 semanas después de la floración.

*Incluye su uso en los siguientes integrantes del grupo de moras, incluyendo sus variedades y/o híbridos:

- Bingoberry
- Coryberry
- Lavacaberry
- Mora perenne de Oregon
- Mora Black Satin
- Darrowberry
- Zarza terrena
- Lucretiaberry
- Phenomenberry
- Moras de Boysen
- Dirksen
- Zarzamora gigante
- Rangeberry
- Zarzamora
- Thomless
- Ravenberry
- Berry
- Marionberry
- Rosberry
- Zarzamora Shawnee
- Chesterberry
- Himalayaberry
- Nectarberry
- Zarzamora
- Cheyenne
- Hullberry
- Olallieberry
- Youngberry

Uvas (control de antracnosis, podredumbre negra y oídio): Mezcle 1¼ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No lo aplique en los 14 días previos a la cosecha. No aplique más de 5 veces por temporada. Para la antracnosis y la podredumbre negra, aplique cuando los brotes nuevos tengan entre 1 y 3 pulgadas de largo. Aplique nuevamente cada 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. Para el oídio, aplique este producto cuando los brotes tengan entre 12 y 18 pulgadas de largo (antes de la floración). Aplique nuevamente cada 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

Menta verde e hierbabuena (control del oídio y la roya): Mezcle 1¼ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No lo aplique en los 30 días previos a la cosecha. No aplique más de 3 veces por temporada. Aplique a principios de primavera cuando las plantas han finalizado el período de latencia. Aplique nuevamente cada 14 a 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

HORTALIZAS

Espárragos (control de la roya): Mezcle 1¼ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. No aplique a brotes para cosecha. En todos los estados, **excepto** en California: Este producto se puede aplicar en los 180 días previos a la cosecha. No lo aplique más de una vez por temporada de cultivo. **Sólo** en California: El concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox® se puede aplicar en los 30 días previos a la cosecha. No lo aplique más de 4 veces por año. En todos los lugares, aplique a hechos en crecimiento después de la cosecha. Aplique nuevamente cada 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. **Cucurbitáceas** (control del oídio):** Mezcle 1¼ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. El concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox se puede aplicar hasta, e incluyendo, el día de la cosecha. No aplique más de 5 veces por temporada. No siembre un nuevo cultivo en el mismo lugar que el cultivo al que se aplicó el tratamiento antes de los 30 días de la última aplicación. Aplique el concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox cuando la enfermedad aparezca por primera vez. Aplique nuevamente cada 7 a 10 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

Ejotes (control de la podredumbre de la vaina y la roya): Mezcle 1¼ onz. líq. de concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. Este producto se puede aplicar hasta, e incluyendo, el día de la cosecha. No aplique más de 4 veces por temporada. No siembre un nuevo cultivo en el mismo lugar que el cultivo al que se aplicó el tratamiento antes de los 30 días de la última aplicación. Para la roya, aplique este producto cuando la enfermedad aparezca por primera vez. Para la podredumbre de la vaina, aplique cuando las vainas se empiecen a desarrollar. Para ambas enfermedades, si las condiciones favorecen la aparición de la enfermedad (tiempo calor y húmedo), vuelva a aplicar cada 7 a 10 días.

Tomate (control del oídio): Mezcle 1 onz. líq. de concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes de la planta hasta el punto de escumamiento. Este producto se puede aplicar hasta, e incluyendo, el día de la cosecha. No aplique más de 4 veces por temporada. No siembre un nuevo cultivo en el mismo lugar que el cultivo al que se aplicó el tratamiento antes de los 30 días de la última aplicación. Aplique cuando aparezca la enfermedad por primera vez o si las condiciones (tiempo calor y húmedo) favorecen la aparición de la enfermedad. Aplique nuevamente cada 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

**Incluye su uso en los siguientes integrantes del grupo de las cucurbitáceas:

- Calabaza acrom
- Calabaza China
- Melón dulce
- Calabaza espagueti
- Balsamina (Balsam
- Sandía (citron melon)
- Calabaza tipo Hubbard
- Calabaza de cuello
- Balsamina (Balsam
- Melón crenshaw
- Melón escrito
- Calabaza ornamental
- Calabaza de verano
- Melón amargo
- Calabaza de cuello
- Melón persa
- Calabaza marrow
- Calabaza de olor
- Calabaza comestible
- Melón piña
- Calabaza de invierno
- Calabaza
- Pepino
- Melón persa
- Sandía
- Melón Casaba
- Pepinillo
- Melón Golden
- Calabaza de castilla
- Melón Santa Claus
- Melón Pershaw
- Zapallo patián
- Melón Honey Balls
- Melón serpiente

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor o del fuego.

Eliminación del pesticida: **Si está vacío:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Ofrezcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

STOP READ ALL INSTRUCTIONS INSIDE BEFORE USE.
ALTO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DENTRO ANTES DE USAR.

PEEL HERE
RESEALABLE LABEL
ABRA AQUÍ
ETIQUETA
RESEALABLE

Spectracide

IMMUNOX® MULTI-PURPOSE FUNGICIDE

SPRAY CONCENTRATE
FOR GARDENS

Concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín
 Protects Fruits, Nuts & Vegetables

 Controls Brown Patch, Powdery Mildew, Black Spot, Rust, Blights, Leaf Spot, Mold, Scab & More

PRODUCT FACTS

WHAT IT DOES:

Prevents and cures all major diseases including Brown patch, Powdery mildew, Black spot, Rust and others listed.

WHERE TO USE:

Outdoors on roses, flowers, ornamental shrubs, trees, lawns, nuts and vegetables.

QUESTIONS & COMMENTS:

Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

*GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-123-8845
EPA Est. Nos. 39754-WI-1 (R), 9688-MO-1 (I),
79533-WI-1 (BT), 11623-GA-3 (CN), 58996-MO-1 (AE),
11623-GA-1 (CR). Circled letter is first letter of lot number.
17-14413 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
071121 61000 3

STOP READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For home use only.*

 Do not allow people or pets to contact treated plants until spray has dried.

USE RESTRICTIONS FOR LAWNS AND ORNAMENTALS

Do not use treated plants, grass or clippings for food or feed.

NOTE: This product is non-staining to most home siding depending on age and cleanliness. However, before using in areas where the spray may contact home siding (vinyl siding in particular), test in an inconspicuous area and recheck in a few hours. Do not use if any staining is observed.

HOW TO USE

CHOOSE AN APPLICATION METHOD.

PUMP-UP SPRAYER OR TRIGGER BOTTLE SPRAYER

Fill with required amount of water. Add the amount of concentrate specified. Replace sprayer top and shake well before spraying.

DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYER

Set sprayer to the "fl oz/gallon" level specified. Use only enough product for the area to be treated. Close sprayer, attach to hose and apply.

CONCENTRATE PLUS WATER-STYLE SPRAYER

Determine the amount of concentrate required. Pour concentrate into sprayer jar to the required "fl oz" level. Then add the required amount of water to the "gallon" level. Replace sprayer top on jar and shake well before spraying.

USE TIPS

- Spectracide Immunox® Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens is highly effective when it is used to prevent diseases or applied at the first sign of disease. Consider treating early in the season.
- When using this product on ornamental plants not listed, test on a small area first.
- If it rains before product has dried, reapply.
- If you need more information about lawn, ornamental, fruit and vegetable diseases, contact your local County Extension Service.
- Handy conversions: $\frac{1}{2}$ fl oz = 1 Tbsp and 1 fl oz = 2 Tbsp.
- Food utensils such as measuring cups and spoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.
- Wash hands with soap and water promptly after use and after contact with treated plants on day of application.

LAWNS

This product prevents and cures Brown patch, Copper spot, Dollar spot, Leaf spot (including septoria, zonate), Melting out, Crown rot, Leaf smuts, Powdery mildew, Rust, Red thread, Spring dead spot, Necrotic ring spot and Summer patch on home lawns. For lawn application in Nassau and Suffolk counties in New York State, do not apply more than three times per given area per year.

HOW TO TREAT

Use 7 fl oz/gallon of water to treat 500 sq ft. Start treating when grass begins to turn

green in the spring or when signs of diseases are first noticed. For best disease control, treat every two weeks. Do not apply more than 16 treatments per year.

USE TIP

For Crown rot, use 3½ fl oz/gallon of water to treat 250 sq ft.

ROSES, FLOWERS, ORNAMENTAL SHRUBS & TREES

Spectracide Immunox® Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens prevents and cures Black spot, Blight (blossom, cercospora leaf, ovulinia petal), Leaf spot (including cercospora), Powdery mildew, Rust (including needle, fusiform), Scab (including fusicipladium) and other diseases on a wide variety of roses, flowers, trees and ornamental shrubs. See table for a complete list of plants.

HOW TO TREAT

Use 1 fl oz/gallon of water. Apply to the point when spray just begins to run off the leaves. Apply once every two weeks throughout the season or until conditions favoring disease development (hot, moist weather) are no longer present. Allow spray to dry before watering.

USE TIPS

- Treat roses on a seven- to 10-day schedule. If Black spot is not a problem, a 10- to 14-day schedule is recommended.
- When treating azaleas, mountain laurel or rhododendrons, begin spraying when flowers start to show color.
- When treating irises, increase use rate to 2 fl oz/gallon of water.
- For douglas fir, loblolly pine and slash pine, use 3 fl oz/gallon of water. Begin treating in early spring and continue treating every two to three weeks until threat of infection has passed.

PLANT (Number following plant refers to the specific Use Tip above.)	DISEASES
Rose ⁽¹⁾	Black spot, Powdery mildew, Rust
Azalea ⁽²⁾ , mountain laurel ⁽²⁾ , rhododendron ⁽²⁾	Petal blight (<i>Ovulinia spp.</i>), Powdery mildew
Abelia, acalypha (copper-leaf), catalpa, flowering cherry, hackberry, honeysuckle, privet, trumpet creeper, zinnia	Cercospora leaf spot, Powdery mildew
Ageratum, anemone, angelica, ash, aster, birch, China aster, chokeberry, chrysanthemum, columbine, cornflower, dianthus, flowering quince, flowering maple (abutilon), four o'clock, fuchsia, iris ⁽³⁾ , marigold, moonflower, ninebark, Russian olive, smoke-tree (gothus)	Rust
Achillea (yarrow), alder, amelanchier (juneberry, shadblush), barberry, carnation, delphinium, gaillardia, gardenia, geranium, hollyhock, mock orange, pansy, petunia, photinia, salvia, snapdragon, viburnum	Powdery mildew, Rust

PLANT Cont'd (Number following plant refers to the specific Use Tip on previous panel.)	DISEASES Cont'd
African violet, begonia, bittersweet, buckeye, California poppy, chestnut (horse), cosmos, crepe myrtle, dahlia, elm, euonymus, gourd (ornamental), grape leaf ivy, lilac, locust, maple, oak, poinsettia, spirea, sycamore, walnut, willow	Powdery mildew
Flowering almond	Blossom blight (<i>Monilinia spp.</i>)
Amorpha (false indigo), bellflower, buttonbush, fleabane, phlox, sunflower	Cercospora leaf spot, Powdery mildew, Rust
Calendula, hydrangea, leucothoe	Cercospora leaf spot
Flowering crabapple, flowering pear, hawthorn	Powdery mildew, Rust, Scab
Dogwood	Anthracnose, Powdery mildew
Douglas fir ⁽⁴⁾	Needle rust
Loblolly pine ⁽⁴⁾ , slash pine ⁽⁴⁾	Fusiform rust
Pyracantha	Fusicipladium scab

FRUITS AND NUTS

Almond (Blossom blight, Rust and Shothole control; Anthracnose suppression): Mix $\frac{1}{2}$ fl oz of Spectracide Immunox® Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Do not apply within 90 days of harvest. Do not apply more than three times per season. For Anthracnose, Blossom blight and Shothole, apply at pink bud stage (when about 5 percent of the buds have bloomed). If conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist, reapply at full bloom and when the petals fall. For Rust, apply this product about eight weeks after flowering if conditions favoring disease development exist. Reapply every 21 days so long as disease symptoms persist.

Apple and mayhaw (Powdery mildew, Rusts and Scab control): Mix $\frac{2}{3}$ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Reapply every seven to 10 days so long as disease symptoms persist. Do not apply within 14 days of harvest. Do not apply more than 10 times per season. For Powdery mildew and Rusts, apply at pink bud stage when the buds are opening and the pink petals are visible. For Scab, apply this product when the first green leaf tips are visible.

Stone fruits: For all stone fruits, this product may be applied up to the day of harvest.

Apricot and nectarine (Brown rot blossom blight, Brown rot, Powdery mildew and Shothole control): Mix $\frac{1}{2}$ fl oz of Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens with 1 gal of water

and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Do not apply more than seven times per season. Apply at early red bud stage (the tips of the petals are visible and the flowers are still closed) before infection occurs. Reapply every seven to 14 days so long as disease symptoms persist.

Cherry (Brown rot blossom blight, Brown rot, Leaf spot and Powdery mildew control): Mix ½ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Do not apply more than seven times per season. Apply when single flower buds are visible (but still closed), on short stalks and before infection occurs. Reapply every seven to 14 days so long as disease symptoms persist. For Leaf spot, make an additional application of this product after harvest.

Peach (Brown rot blossom blight, Brown rot, Powdery mildew and Rust control): Mix ½ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Do not apply more than seven times per season. For Brown rot blossom blight, Brown rot and Powdery mildew, apply at early pink bud stage (the tips of the petals are visible and the flowers are still closed) before infection occurs. Reapply every seven to 14 days so long as disease symptoms persist. For Rust, apply this product about eight weeks after flowering if conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist. Reapply every 21 days so long as disease symptoms persist.

Plum and Prune (Brown rot blossom blight, Brown rot and Rust control): Mix ½ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the tree to point of runoff. Do not apply more than seven times per season. For Brown rot blossom blight and Brown rot, apply when the first green leaf tips are visible and before infection occurs. Reapply every seven to 14 days so long as disease symptoms persist. For Rust, apply this product about eight weeks after flowering if conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist. Reapply every 21 days so long as disease symptoms persist.

Strawberry (Leaf blight, Leaf spot and Powdery mildew control): Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. This product may be applied up to the day of harvest. Do not apply more than six times per season. Do not plant a new crop in the same place as the crop that was treated within 30 days of the last application. Apply when the disease first appears or when conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist. Reapply every 14 to 21 days so long as disease symptoms persist.

BERRIES

For all berries, this product may be applied up to the day of harvest.

Blackberry*, raspberry*, loganberry (Cane and Leaf rust, Leaf spot, Orange rust, Powdery mildew and Yellow rust control): Mix 2/3 fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Do not apply more than four times per season. Apply at budbreak and reapply every 10 to 14 days so long as disease symptoms persist.

Currant (Powdery mildew control): Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of

runoff. Do not apply more than eight times per season. Apply before bloom, through bloom and up to two weeks post-bloom.

Gooseberry (Anthracnose and Powdery mildew control): Mix 1¼ fl oz of Spectracide Immunox® Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Do not apply more than eight times per season. For Anthracnose, apply when the first leaf has completely unfolded. If conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist, reapply every 10-14 days. For Powdery mildew, apply this product before bloom, through bloom and up to two weeks post-bloom.

*Includes use on the following members of the caneberry group including varieties and/or hybrids:

- bingeberry
- coryberry
- lavacaberry
- Oregon evergreen berry
- black satin berry
- darrowberry
- lowberry
- phenomenalberry
- boysenberry
- dewberry
- lucretiaberry
- mammoth
- Cherokee
- dirksen
- thornless
- blackberry
- chesterberry
- berry
- Cheyenne
- Himalayaberry
- hullberry
- lavacaberry
- lowberry
- lucretiaberry
- mammoth
- blackberry
- marionberry
- nectarberry
- olallieberry
- Oregon evergreen berry
- phenomenalberry
- ravenberry
- rossberry
- shawnee blackberry
- youngberry

Grapes (Anthracnose, Black rot and Powdery mildew control): Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Do not apply within 14 days of harvest. Do not apply more than five times per season. For Anthracnose and Black rot, apply when new shoots are 1 to 3 inches in length. Reapply every 14 days so long as disease symptoms persist. For Powdery mildew, apply this product when shoots are 12 to 18 inches in length (before bloom). Reapply every 21 days so long as disease symptoms persist.

Peppermint and spearmint (Powdery mildew and Rust control): Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Do not apply within 30 days of harvest. Do not apply more than three times per season. Apply in the early spring when the plants have broken dormancy. Reapply every 14 to 21 days so long as disease symptoms persist.

VEGETABLES

Asparagus (Rust control): Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Do not apply to harvestable spears. In all states **except California:** This product may be applied within 180 days of harvest. Do not apply more than one time per growing season. In California **only:** Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens may be applied within 30 days of harvest. Do not apply more than four times per year. In all locations, apply to the developing ferns after harvest. Reapply every 14 days so long as disease symptoms persist.

Cucurbits (Powdery mildew control):** Mix 1¼ fl oz of this product with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens may be applied up to and including the day of harvest. Do not apply more than five times per season. Do not plant a new crop in the same place as the crop that was treated within 30 days of the last application. Apply Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens when the

disease first appears. Reapply every seven to 10 days so long as disease symptoms persist.

Snap bean (Pod tip rot and Rust control): Mix 1¼ fl oz of Spectracide Immunox® Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. This product may be applied up to and including the day of harvest. Do not apply more than four times per season. Do not plant a new crop in the same place as the crop that was treated within 30 days of the last application. For Rust, apply when the disease first appears. For Pod tip rot, apply when pods begin to develop. For both diseases, if conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist, reapply every seven to 10 days.

Tomato (Powdery mildew control): Mix 1 fl oz of Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide Spray Concentrate for Gardens with 1 gal of water and uniformly apply to all parts of the plant to point of runoff. This product may be applied up to and including the day of harvest. Do not apply more than four times per season. Do not plant a new crop in the same place as the crop that was treated within 30 days of the last application. Apply when the disease first appears or if conditions favoring disease development (hot, moist weather) exist. Reapply every 21 days so long as disease symptoms persist.

**Includes use on the following members of the cucurbits group:

- acorn squash
- Chinese
- honey balls
- scallop squash
- balsam apple
- waxgourd
- honeydew melon
- snake melon
- balsam pear
- citron melon
- hubbard squash
- spaghetti squash
- bitter melon
- crenshaw melon
- mango melon
- straightneck
- butternut
- crookneck
- muskmelon
- squash
- calabaza
- cucumber
- ornamental gourd
- summer squash
- cantaloupe
- edible gourd
- Persian melon
- vegetable marrow
- casaba
- gherkin
- pineapple melon
- watermelon
- Chinese
- golden pershaw
- pumpkin
- winter squash
- cucumber
- melon
- Santa Claus
- zucchini

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Store in cool, dry place away from heat or open flame.

Pesticide Disposal: If **empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. If **partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

ALTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Sólo para uso residencial.



No permita que las personas ni las mascotas entren en contacto con las plantas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

RESTRICCIONES DE USO PARA CÉSPEDES Y PLANTAS ORNAMENTALES

No use plantas, césped ni recortes tratados como alimento de personas ni animales.

NOTA: Este producto en general no mancha la mayoría de los revestimientos del hogar, dependiendo de la antigüedad y limpieza de los mismos. No obstante, antes de utilizarlo en zonas donde el rocío pueda entrar en contacto con el revestimiento del hogar (en particular con revestimientos vinílicos), pruébelo en un lugar que no sea muy visible y verifique su efecto unas horas más tarde. No lo utilice si observa manchas.

CÓMO USAR

ELEJA UN MÉTODO DE APLICACIÓN.

BOMBA ROCIADORA O BOTELLA ROCIADORA

Llene con la cantidad requerida de agua. Agregue la cantidad especificada del concentrado. Vuelva a poner la tapa del rociador y agite bien antes de rociar.

ROCIADOR CON APlicador TIPO MANGUERA CON SELECTOR

Ajuste el rociador al nivel de "onza líquida/galón" especificado. Use sólo la cantidad de producto adecuada para la zona que se va a tratar. Cierre el rociador, conecte a la manguera y aplique.

ROCIADOR PARA CONCENTRADO Y AGUA

Determine la cantidad requerida del concentrado. Vierta el concentrado dentro de la jarra del rociador hasta el nivel necesario de "onza líquida." Despues agregue la cantidad requerida de agua hasta el nivel de "galón." Vuelva a poner la tapa del rociador en la jarra y agite bien antes de rociar.

CONSEJOS SOBRE EL USO

- El concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox® es muy eficaz cuando se usa para prevenir enfermedades o se aplica al primer signo de enfermedad. Consideré efectuar el tratamiento a principios de la temporada.
- Cuando este producto se use en plantas ornamentales no incluidas en la lista, pruébelo primero en una zona pequeña.
- Vuelva a aplicarlo si llueve antes de que el producto se haya secado.
- Si necesita más información sobre enfermedades del césped, plantas ornamentales, frutas u hortalizas, póngase en contacto con su oficina local del servicio de extensión agrícola del condado.
- Conversiones útiles: $\frac{1}{2}$ onz. líq. = 1 cda. soperas y 1 onz. líq. = 2 cdas. soperas.
- No deben utilizarse utensilios para alimentos como tazas de medir y cucharas para preparar alimentos después de usarlos con pesticidas.
- Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de usar y después de tener contacto con plantas tratadas el día de la aplicación.

CÉSPEDES

Este producto previene y cura la mancha marrón, mancha cobrizá, mancha de dólar, mancha de la hoja (incluyendo septoria, zonada), mal de pie, pudrición de la raíz, leaf smuts, oídio, roya, hilo rojo, mancha muerta de primavera, mancha del anillo necrótico y mancha de verano en céspedes residenciales. Para aplicaciones del césped en los condados de Nassau y Suffolk en el estado de Nueva York, no aplique más de 3 veces por zona determinada por año.

CÓMO TRATAR

Use 7 onz. líq. por galón de agua para tratar 500 pies cuadrados. Comience el tratamiento cuando el césped empieza a ponerse verde en la primavera o cuando observe los primeros signos de enfermedad. Para el mejor control de la enfermedad, trate cada 2 semanas. No aplique más de 16 tratamientos por año.

CONSEJO PARA EL USO

Para la pudrición de la raíz, use $\frac{3}{4}$ onz. líq. por galón de agua para tratar 250 pies cuadrados.

ROSAS, FLORES, ARBUSTOS ORNAMENTALES Y ÁRBOLES

El concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox previene y cura la mancha negra, el tizón (de la floración, cercosporiosis, de los pétalos (ovulinia)), mancha de la hoja (incluyendo cercospora), oídio, roya (incluyendo roya de las agujas, fusiforme), sama (incluyendo fusicladium) y otras enfermedades en una amplia variedad de rosas, flores, árboles y arbustos ornamentales. Consulte la tabla para

ver una lista completa de plantas.

CÓMO TRATAR

Use 1 onz. líq. por galón de agua. Aplique hasta que el rocío comience a escurrirse de las hojas. Aplique una vez cada 2 semanas durante la temporada o hasta que las condiciones que favorezcan la aparición de la enfermedad (tiempo calor y húmedo) hayan desaparecido. Permita que el rocío se seque antes de regar.

CONSEJOS SOBRE EL USO

- Trate las rosas de acuerdo a un programa de 7 a 10 días. Si la mancha negra no es un problema, se recomienda un programa de 10 a 14 días.
- Cuando trate azaleas, laurel de montaña o rododendros, comience a rociar cuando las flores empiecen a tener color.
- Cuando trate iris, aumente la dosis de uso a 2 onz. líq. por galón de agua.
- Para el abeto Douglas, el pino blanco y el pino resinoso, use 3 onz. líq. por galón de agua. Comience el tratamiento a principios de primavera y continúe cada 2 a 3 semanas hasta que la amenaza de infección haya pasado.

PLANTA (El número a continuación de la planta se refiere al "Consejo sobre el uso" específico indicado más arriba.)	ENFERMEDADES
Rosa ^①	Mancha negra, oídio, roya
Azalea ^② , laurel de montaña ^② , rododendro ^②	Tizón de los pétalos (<i>Ovulinia spp.</i>), oídio
Abelia, acálfila (cobrizá de la hoja), catalpa, cerezo en flor, palo blanco, madreselva, ligustró, jazmín trompeta, zinia	Cercosporiosis, oídio
Agerato, arénoma, angelica, fresno, astér, abedul, aster de China, cerezo de Virginia, crisantemo, aquilegia, aciano, dianthus, membrillo en flor, arce en flor (abutilón), maravilla, fucsia, iris ^③ , caléndula, flor de luna, fisocarpo, olivo de Bohemia, árbol del humo (gothus)	Roya
Aquialea (arrow), aliso, cornillo (juneberry, shadblush), agracejo, clavel, espuelas de caballero, gártanda, gardenia, geranio, malvón, mock orange, pensamiento, petunia, folinia, salvia, boca de dragón, viburno	Oídio, roya
Violeta africana, begonia, dulcamara, ojo de venado, amapola de California, castaño (de Indias), cosmos, árbol de Júpiter, dalia, olmo, evónimo, calabaza (ornamental), cisio, lirio, algarrobo, arce, roble, nochebuena, espiraea, sicamoro, nogal, sauce	Oídio
Almendro en flor	Tizón de la floración (<i>Morötinia spp.</i>)
Amorpha (falso índigo), campanilla, jazmín, erigerón, phlox, girasol	Cercosporiosis, oídio, roya
Caléndula, hortensia, leucothoe	Cercosporiosis
Manzano silvestre en flor, peral en flor, espino	Oídio, roya, sama
Cornejo florido	Antracnosis, oídio
Abeto Douglas ^④	Roya de las agujas
Pino blanco ^④ , Pino resinoso ^④	Roya fusiforme
Pyracantha (espino de fuego)	Fusicladium sama

FRUTAS Y NUECES

Almendro (control del tizón de la floración, roya y mal de la munición; eliminación de antracnosis): Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox® con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. No lo aplique en los 90 días previos a la cosecha. No aplique más de 3 veces por temporada. Para la antracnosis, el tizón de la floración y el mal de la munición, aplique en la etapa de los brotes rosas (cuando aproximadamente 5 por ciento de los brotes han florecido). Si las condiciones favorecen la aparición de la enfermedad (tiempo calor y húmedo), vuelva a aplicar en plena floración y cuando caigan los pétalos. Para la roya, aplique este producto aproximadamente 8 semanas después de la floración si las condiciones favorecen la aparición de la enfermedad. Aplique nuevamente cada 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

Manzano y mayhaw (control del oídio, roya y sama): Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. Aplique nuevamente cada 7 a 10 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. No lo aplique en los 14 días previos a la cosecha. No aplique más de 10 veces por temporada. Para el oídio y royas, aplique en la etapa de los brotes rosas, cuando se están abriendo y se ven los pétalos de color rosado. Para la sama, aplique este producto cuando se ven las primeras puntas de hojas verdes.

Frutas de hueso: Para todas las frutas de hueso, este producto se puede aplicar hasta el día de la cosecha. **Chabacano y nectarina (control de la podredumbre parda del melocotonero, la podredumbre morena, el oídio y el mal de la munición):** Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de concentrado multiuso de fungicida en rocío para jardín de Spectracide Immunox con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. No aplique más de 7 veces por temporada. Aplique en la etapa inicial de los brotes rojos (se ven las puntas de los pétalos y las flores aún están cerradas) antes de que ocurra la infección. Aplique nuevamente cada 7 a 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

Cerezo (control de la podredumbre parda del melocotonero, la podredumbre morena, la mancha de la hoja y el oídio): Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. No aplique más de 7 veces por temporada. Aplique cuando se ven los brotes de las flores (pero aún están cerrados), en tallos cortos y antes de que ocurra la infección. Aplique nuevamente cada 7 a 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. Para la mancha de la hoja, efectúe otra aplicación de este producto después de la cosecha.

Duraznero (control de la podredumbre parda del melocotonero, la podredumbre morena, el oídio y la roya): Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. No aplique más de 7 veces por temporada. Para la podredumbre parda del melocotonero, la podredumbre morena y el oídio, aplique en la etapa inicial de los brotes rosas (se ven las puntas de los pétalos y las flores aún están cerradas) antes de que ocurra la infección. Aplique nuevamente cada 7 a 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. Para la roya, aplique este producto aproximadamente 8 semanas después de la floración si las condiciones (tiempo calor y húmedo) favorecen la aparición de la enfermedad. Aplique nuevamente cada 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

Ciruela y ciruela pasa (control de la podredumbre parda del melocotonero, la podredumbre morena y la roya): Mezcle $\frac{1}{2}$ onz. líq. de este producto con 1 galón de agua y aplique uniformemente a todas las partes del árbol hasta el punto de escurrimiento. No aplique más de 7 veces por temporada. Para la podredumbre parda del melocotonero y la podredumbre morena, aplique cuando se vean las primeras puntas de hojas verdes y antes de que ocurra la infección. Aplique nuevamente cada 7 a 14 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad. Para la roya, aplique este producto aproximadamente 8 semanas después de la floración si las condiciones (tiempo calor y húmedo) favorecen la aparición de la enfermedad. Aplique nuevamente cada 21 días mientras persistan los síntomas de la enfermedad.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

First Aid • If in Eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards • To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese muy bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

Primeros Auxilios • Si entra en contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retirelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurriramiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corp.
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-123-8845

EPA Est. Nos. 39754-WI-1(R), 9688-MO-1(U), 79533-WI-1(BT),

11623-GA-3(CN), 58996-MO-1(AE), 11623-GA-1(CK)

Circled letter is first letter of lot number. 17-14413 © 2012 UIC