



OUTDOOR

Many Purpose Dust₁

Kills On Contact



Spider



Fire Ant



Scorpion

ACTIVE INGREDIENT:

Deltamethrin (S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl-
cyclopropanecarboxylate 0.05%

OTHER INGREDIENTS 99.95%

TOTAL 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See Booklet For Additional
Precautionary Statements

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Vea en el folleto las
precauciones adicionales

Use On Vegetable Gardens

NET WEIGHT 1 lb (454g)

LB3866

continuación

HORTALIZAS	PLAGAS OBJETIVO	OBSERVACIONES	Proporción de aplicación: Onzas de polvo/ 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados)	Máximo de aplicaciones/ temporada de cultivo
Hortalizas curcubitáceas: cantalupo, chayote, calabaza china, melón citrón, pepino, pepinillo, calabazas, especies del género Momordica (manzana balsámica, pera balsámica, melón amargo, pepino chino), melón reticulado, calabaza, zapallo, sandía	Gusanos soldado, gusanos falso medidor, escarabajo de la patata de Colorado, gusano del maíz, escarabajos del pepino, gusanos cortadores, polilla dorso de diamante (larva), escarabajos pulga, saltamontes, áfidos verdes del durazno, cicadélicos, barrenadores de hojas, gusano del melón, gusano barrenador del fruto, chinches apestosas, chinches Lygus, cogollero del tabaco, gusano pin del tomate, gorgojos de las hortalizas (adultos), cogollero occidental, mosca blanca (adulta)	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (76 gramos [0.168 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha.	2.13	6
Hortalizas con fruto: berenjena, uchuva, pepinos, pimientos, tomatillo, tomate	Áfidos, gusanos soldado, gusanos falso medidor, escarabajo de la patata de Colorado, escarabajo del pepino, gusanos cortadores, polilla dorso de diamante, barrenadores del maíz europeo, escarabajos pulga, gusano del repollo importado, minadores de hojas, gorgojos del pimiento, chinches apestosas, chinches Lygus, pulgones, gusanos del tomate (gusanos del maíz), gusanos pin del tomate, gusano cortador variegado, mosca blanca	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (76 gramos [0.168 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 5 días entre aplicación y aplicación. No aplique a un día de la cosecha.	2.13	6
Hortalizas de raíz: zanahoria, apio, perifollo (tuberoso), achicoria	Gusanos soldado, gusanos falso medidor, gusanos cortadores, barrenadores del maíz europeo, escarabajos pulga, áfidos verdes del durazno, cicadélicos, chinches Lygus (chinches de plantas), gorgojos de las habas, chinches de planta moteada	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (63.5 gramos [0.14 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha. No se deben realizar aplicaciones en hortalizas de raíz cuya parte superior u hojas se cosechen para consumo humano.	2.13	5
Hortalizas de tubérculo y bulbo: papa, batata, arracacha, arumuz, alcachofa china, alcachofa de Jerusalén, canna comestible, mandioca amarga y dulce, chayote (raíz), chufa, malanga, jengibre, lerén, yautía, cúrcuma, jiquima, macal	Gusanos soldado, gusanos falso medidor, gusanos cortadores, barrenadores del maíz europeo, escarabajos pulga, áfidos verdes del durazno, cicadélicos, chinches Lygus (chinches de plantas), gorgojos de las habas, chinches de planta moteada	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (63.5 gramos [0.14 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 3 días entre aplicación y aplicación. No aplique dentro de los 3 días de la cosecha. No se deben realizar aplicaciones en hortalizas de tubérculo o bulbo cuya parte superior u hojas se cosechen para consumo humano.	2.13	5

USO PARA EL TRATAMIENTO DE HORMIGAS DE FUEGO - TRATAMIENTO DE HORMIGUEROS DE HORMIGAS ROJAS IMPORTADAS

Aplique *Green Light® Many Purpose Dust*₁ con una lata para espolvorear. Aplique el polvo completamente para cubrir de manera adecuada los montículos de los hormigueros y alrededor del perímetro (45 cm (18 pulg.) a partir del borde exterior del hormiguero). Si no se obtiene un control completo, podría ser necesaria una segunda aplicación. **NO PERTURBE LOS HORMIGUEROS ANTES DE LA APLICACIÓN.** De ser posible, trate todas las colonias en la vecindad. Además, trate las colonias que no han construido hormigueros todavía. Instrucciones alternativas: espolvóree uniformemente una cucharada (aproximadamente 1/2 onza) *Green Light® Many Purpose Dust*₁ encima de cada hormiguero. No riegue agua ni moleste el hormiguero. Aplíquelo cuando la temperatura esté entre 18° y 27° C (65° y 80° F). Deje pasar entre 3 y 4 días para obtener máximo control y después repita si es necesario. Luego de usar para pesticidas algún utensilio de comida, tal como una cucharita o una tasa para medir, no se le debe usar para alimentos.

NOTA:

En conformidad con la ley aplicable, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

GARANTÍA DE SWISS FARMS PRODUCTS, INC.:

Si por cualquier razón usted, el consumidor, no está satisfecho con este producto, envíenos por correo el comprobante original de compra para recibir un reembolso total del precio de compra.

LB3866

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: May be harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-877-478-3711 for general information and/or medical information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Not for use in commercial food/feed handling establishments, restaurants or other establishments where food/feed is commercially prepared, processed or served.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store product in original container in a cool, dry, locked storage area out of reach of children and pets. **PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

IMPORTANT: Read the entire Directions for Use, Precautions and Disclaimer of Warranties before using this product.

Green Light® Many Purpose Dust₁ is a ready-to-use insecticide dust which exhibits effective knockdown and long-lasting control against the pests listed when used according to label directions. *Green Light® Many Purpose Dust₁* can be used for long-lasting pest control in and around homes and their immediate surroundings. Permitted areas of use include: animal quarters, household greenhouses, ornamentals and vegetables. This product is intended for applications with a hand duster or from the container or by other suitable means, to hiding and runway areas and other places where insects are found.

OUTDOOR USES

ORNAMENTAL PLANT PESTS	For the control of: aphids, beet armyworms, blister beetles, boxelder bugs, certain leafminers (boxwood, holly, oak, spruce needle), elm leaf beetle, flea beetles, Japanese beetles, leafhoppers, leafrollers, orange tortrix, periodical cicada, plant bugs, rose chafer, rose slugs, tent caterpillars, thrips and weevils.
SHRUBS AND ORNAMENTALS	Apply when insects or their damage first appear and repeat at weekly intervals if necessary. Apply 8 ounces per 1,000 square feet; or thoroughly apply to place a thin layer of dust on both upper and lower sides of leaves, stems and flowers.
ROSES, PETUNIAS, CHRYSANTHEMUMS, GERANIUMS, CARNATIONS, AND OTHER RELATED FLOWERS	To control many leaf and flower chewing insects, apply as soon as the insect appears and repeat at 7 day intervals or as long as insects continue to appear. Apply a thin layer of dust on both upper and lower sides of leaves, stems and flowers.
PERIMETER TREATMENT	Use <i>Green Light® Many Purpose Dust₁</i> as a residual treatment for control of: ants, bees, centipedes, cockroaches, crickets, firebrats, fleas, ground beetles, millipedes, scorpions, silverfish, slugs, sowbugs (pillbugs), spiders, ticks and wasps. Make a residual treatment around windows and doors, porches, screens, eaves, patios, garages, under stairways, in crawl spaces and other areas where pests hide. To help prevent the invasion of buildings and structures by these pests, apply thoroughly and uniformly to the foundation and crawl spaces where pests are active and may find entrance.

HOME VEGETABLE GARDENS: Dust lightly to cover both upper and lower leaf surfaces with a thin, even film of dust. Apply when air is calm to avoid drift and contact with eyes and skin. Start applying at the farthest corner of the treatment area and work backward to avoid contact with dusted surfaces. Allow dust to settle in treated areas before reentering.

EPA Reg. No. 73327-14 EPA Est. No. 084175-TX-001B,
39578-TX-001G, 85652-0H-1W

Superscript is first letter of lot number

Sold by: Swiss Farms Products, Inc.
3933 Howard Hughes Pkwy., Suite 250
Las Vegas, NV 89169

©2013 Swiss Farms Products, Inc.
World rights reserved.

LB3866

www.greenlightco.com

1-877-478-3711



0 71459 04247 7

1005

VEGETABLES	TARGET PESTS	REMARKS	Application Rates: Ounces of Dust/100 sq ft	Max Applications/ Growing Season
Bulb Vegetables: garlic, leeks, onions, shallots	Cutworms, stink bugs, thrips	Do not apply more than recommended amount [0.112 lb ai/A] in one growing season. Allow 5 days between applications. Do not apply within one day of harvest.	2.13	4
Corn, Sweet	Aphids, armyworms, chinch bugs, click beetle, corn earworm, corn rootworm (adult), cutworms, European corn borer, flea beetles, grasshoppers, Japanese beetle (adult), June beetle (adult), masked chafer (adult), southern corn borer, southwestern corn borer, stalk borer, stink bugs, webworms	Do not apply more than recommended amount [0.45 lb ai/A] one growing season. Do not apply within 24 hours of harvest.	2.13	16
Cucurbit Vegetables: cantaloupes, chayote, Chinese waxgourd, citron melon, cucumber, gherkin, gourds, <i>Momordica</i> species (balsam apple, balsam pear, bitter melon, Chinese cucumber), muskmelon, pumpkin, squash, watermelon	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, corn earworm, cucumber beetles, cutworms, diamondback moth (larvae), flea beetles, grasshoppers, green peach aphid, leafhoppers, leafminers, melonworm, pickleworm, stink bugs, tarnished plant bug, tobacco budworm, tomato pinworm, vegetable weevil (adult), western plant bug, whitefly (adult)	Do not apply more than recommended amount [0.168 lb ai/A] in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest.	2.13	6
Fruiting Vegetables: eggplant, groundcherry, pepinos, peppers, tomatillo, tomato	Aphids, armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cucumber beetle, cutworms, diamondback moth, European corn borer, flea beetles, imported cabbageworm, leafminers, pepper weevil, stink bugs, tarnished plant bug, thrips, tomato fruitworm (corn earworm), tomato pinworm, variegated cutworm, whitefly	Do not apply more than recommended amount [0.168 lb ai/A] in one growing season. Allow 5 days between applications. Do not apply within 1 day of harvest.	2.13	6
Root Vegetables: carrot, celeriac, chervil (turnip-rooted), chicory	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cutworms, European corn borer, flea beetles, green peach aphid, leafhoppers, lygus bug (plant bug), pea aphid, tarnished plant bug	Do not apply more than recommended amount [0.14 lb ai/A] in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest. Other than radishes, applications may not be made to root vegetables whose tops or leaves are to be harvested for human consumption.	2.13	5

continued

VEGETABLES	TARGET PESTS	REMARKS	Application Rate: Ounces of Dust/100 sq ft	Max Applications/ Growing Season
Tuberous & Corm Vegetables – potato, sweet potato, arracacha, arrowroot, Chinese artichoke, Jerusalem artichoke, edible canna, bitter and sweet cassava, chayote (root), chufa, dasheen, ginger, leren tanier, turmeric, yam bean, true yam	Armyworm, cabbage looper, Colorado potato beetle, cutworms, European corn borer, flea beetles, green peach aphid, leafhoppers, lygus bug (plant bug), pea aphid, tarnished plant bug	Do not apply more than recommended amount [0.14 lb ai/A] in one growing season. Allow 3 days between applications. Do not apply within 3 days of harvest. Applications may not be made to tuberous or corm vegetables whose tops or leaves are to be harvested for human consumption.	2.13	5

USE DIRECTIONS FOR FIRE ANT TREATMENT - IMPORTED FIRE ANT MOUND TREATMENT

Apply Green Light® Many Purpose Dust₁ with a shaker can. Thoroughly apply dust to adequately cover mound and around the perimeter (18" from the outer edge of the mound). A second treatment may be necessary if complete control is not obtained. DO NOT DISTURB THE MOUND PRIOR TO APPLICATION. If possible, treat all colonies in the vicinity. Also, treat colonies which have not yet constructed a mound. Alternate Directions - Evenly sprinkle one tablespoon (approximately 10 grams) of Green Light® Many Purpose Dust₁ over the top of each mound. Do not water in or disturb the mound. Apply when temperatures are between 65 and 80°F. Allow 3 to 4 days for maximum control, then repeat as necessary. Do not use food utensils, such as a teaspoon or measuring cups, for food after use with pesticides.

NOTICE:

To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not used in accordance with directions.

SWISS FARMS PRODUCTS, INC GUARANTEE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied with this product, mail us original proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.

PRECAUCIONES

PELIGRO PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Podría ser dañino al absorberlo la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Debe lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, utilizar tabaco o usar el baño.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quitese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con suficiente agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Sostenga abiertos los ojos y enjuáguelos con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos. Despues de los primeros 5 minutos quitese los lentes de contacto si los usa y continúe enjuagándose los ojos. Llame a un centro para control de venenos o a un médico para obtener consejo sobre tratamiento.

NÚMERO TELEFÓNICO PARA AYUDA: Al llamar al centro para control de venenos o a un médico, o al ir a un lugar para obtener tratamiento, tenga a la mano la etiqueta o el recipiente del producto. También puede ponerse en llamar al 1-877-478-3711 para obtener información general y/o médica.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Este producto es extremadamente tóxico para los peces e invertebrados acuáticos. A fin de proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o se derive a drenajes para tormentas, canales de desagüe, cañerías o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no sople o lave el pesticida fuera de la zona de tratamiento.

INSTRUCCIONES PARA USO: El usar este producto de una manera diferente a la que se indica en la etiqueta es una violación de las leyes federales. No debe usarse en establecimientos comerciales donde se manipula comida o alimento para animales, restaurantes ni otros establecimientos donde se prepara, procesa o sirve comercialmente comida o alimento para animales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene el producto en el recipiente original en un lugar fresco, seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños y mascotas. **ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE:** Envase no rellenable. No vuelva a utilizar ni llenar este envase. Si está vacío, no vuelva a usar este recipiente. Póngalo en la basura o en la caja para reciclaje, si hay una disponible. Si está parcialmente vacío: llame a su agencia local para desperdicios sólidos para obtener instrucciones para su eliminación. Nunca vierta el producto sobrante en drenajes internos ni externos.

IMPORTANTE: Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones para su uso así como las precauciones y excusión de las garantías.

Green Light® Many Purpose Dust₁ es un polvo insecticida listo para usarse que exhibe eliminación efectiva al contacto así como control a largo plazo contra las pestes listadas cuando se le usa de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta. Green Light® Many Purpose Dust₁ puede usarse para un control de pestes a largo plazo en el hogar y los alrededores inmediatos. Entre las áreas en que se le puede usar se encuentran las siguientes: recintos de animales, viveros en casas, hortalizas y plantas ornamentales. Este producto debe usarse con un pulverizador de mano o directamente del recipiente, o por otros medios convenientes en escondrijos y lugares de tráfico y otras áreas en que se encuentran insectos.

USOS EN EXTERIORES

PESTES DE PLANTAS ORNAMENTALES	Para el control de: áfidos, gusanos de la remolacha, <i>meloidea</i> , insecto del árbol boxelder, ciertas moscas minadoras (boxwood, holly, oak, spruce needle), escarabajo de la hoja del olmo, escarabajos pulga, escarabajos japoneses, saltahojas, enrolladores, tortrix de la naranja, cigarras, chinches de plantas, cetonias, babosas de los rosales, <i>malacosoma americanum</i> , trips y gorgojos.
ARBUSTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES	Aplíquelo cuando los insectos o sus daños aparezcan por primera vez y repítalo semanalmente si es necesario. Aplique 8 onzas por cada 1,000 pies cuadrados o aplíquelo completamente hasta colocar una capa delgada de polvo en la parte superior e inferior de las hojas, los tallos y las flores.
ROSAS, PETUNIAS, CRISANTEMOS, GERANIOS, CLAVELES Y OTRAS PLANTAS RELACIONADAS	Para controlar muchos insectos que se alimentan de hojas y flores, aplíquelo tan pronto como aparezcan los insectos y repítalo a intervalos de 7 días mientras continúen apareciendo insectos. Aplíquelo una capa delgada de polvo en la parte superior e inferior de las hojas, los tallos y las flores.
TRATAMIENTO DE PERÍMETROS	Use Green Light® Many Purpose Dust ₁ como tratamiento residual para el control de: hormigas, abejas, ciempiés, cucarachas, grillos, rapaces del fuego, pulgas, escarabajos de tierra, milpies, alacranes, lepismas, babosas, cochinchillas, arañas, garrapatas y avispas. Haga tratamientos residuales alrededor de ventanas y puertas, porches, pantallas, aletas, patios, cocheras, debajo de escaleras, en espacios de tránsito y otras áreas en las que se esconden las pestes. Para ayudar a evitar que estas pestes invadan edificios y estructuras, aplíquelo minuciosa y uniformemente en los cimientos y los espacios debajo del piso adonde las pestes se encuentran activas y pudieran entrar.

HUERTAS RESIDENCIALES: Aplique el polvo levemente hasta cubrir la superficie superior e inferior de las hojas con una película de polvo delgada y uniforme. Aplique cuando no haya brisa para evitar que se desvíe el polvo y que entre en contacto con los ojos y la piel. Comience la aplicación en el extremo más alejado del área de tratamiento y avance hacia atrás para evitar el contacto con las superficies tratadas. Permita que el polvo se asiente en las áreas tratadas antes de volver a ingresar.

HORTALIZAS	PLAGAS OBJETIVO	OBSERVACIONES	Proporción de aplicación: Onzas de polvo/ 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados)	Máximo de aplicaciones/ temporada de cultivo
Hortalizas de bulbo: ajo, puerros, cebollas y chalotes	Gusanos cortadores, chinches apestosas, pulgones	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (51 gramos [0.112 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. Deje pasar 5 días entre aplicación y aplicación. No aplique a un día de la cosecha.	2.13	4
Maíz dulce	Áfidos, gusanos soldado, chinches, escarabajos de resorte, gusanos del maíz, gusanos de la raíz del maíz (adultos), gusanos cortadores, barrenadores del maíz europeo, escarabajos pulga, saltamontes, escarabajo japonés (adulto), escarabajo de junio (adulto), gusarapo enmascarado (adulto), barrenadores del maíz del sur, barrenadores del maíz del sudeste, barrenadores merodeadores, chinches apestosas, orugas tejedoras	No aplique una cantidad mayor que la recomendada (204 gramos [0.45 lb] de ia/A) en una temporada de cultivo. No aplique dentro de las 24 horas de la cosecha.	2.13	16

continúa