



Preen®

SOUTHERN

WEED PREVENTER

Controlador de malezas de jardín

STOP WEEDS*
Before They Start!

Blocks Weeds*
Up To 4 Months Guaranteed!

Covers 2500 Sq. Ft.

***Not for Use on Vegetable
Gardens or Lawns***

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN

CAUTION

See back panel for
First Aid and additional
Precautionary Statements.

ACTIVE INGREDIENT:

Dithiopyr..... 0.27%

OTHER INGREDIENTS: . . . 99.73%

TOTAL..... 100.00%

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Net Wt. 10.625 lbs (4.8 kg)

STOP WEEDS* ***Before They Start!***

Blocks Weeds*
Up To 4 Months Guaranteed!

Covers 2500 Sq. Ft.

***Not for Use on Vegetable
Gardens or Lawns***

Net Wt. 10.625 lbs (4.8 kg)

**KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN**

CAUTION

See back panel for
First Aid and additional
Precautionary Statements.

ACTIVE INGREDIENT:

Dithiopyr..... 0.27%

OTHER INGREDIENTS: ... 99.73%

TOTAL 100.00%

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Killing Weeds vs. Weed Prevention



Pulling or spraying only eliminates weeds already above ground.



Preventing creates a weed barrier that stops weeds* from germinating.

Reapply product every 4 months. It's never too late or too early to apply Preen Southern Weed Preventer! Use around listed flowers, trees & shrubs.

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Scan the code to watch how Preen prevents weeds or visit: www.preen.com/preventweeds



The Preen Routine *Easy Steps to Weed Prevention*



Remove Existing Weeds



Sprinkle Product Evenly



Water Product Into Soil

Precautionary Statements

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

First Aid

IF IN EYES:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED:

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING:

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED:

- Move person to fresh air.
- If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.
- Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For Emergency Medical Information call (888) 208-1368.

Environmental Hazards

This product is toxic to fish. Drift and runoff may adversely affect aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather will help to ensure that wind does not blow pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

Directions For Use

It is a violation of Federal law to use this product in any manner inconsistent with its labeling.

Product Information

Preen Southern Weed Preventer prevents most weeds from germinating for up to 4 months in flower beds, and around ground covers, trees and shrubs. Although this product will not kill existing weeds, it will prevent new listed weeds from sprouting – eliminating the need for difficult and time-consuming hand weeding. Without weeds, your valuable plants can grow larger and stronger. Your beds will stay neat all season long.

PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS

Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production or for research purposes. For use on plants intended for aesthetic purposes or climatic modifications and being grown in ornamental gardens. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

INTENDED FOR RESIDENTIAL USE / NOT FOR USE ON VEGETABLE GARDENS OR LAWNS

Only apply Preen Southern Weed Preventer to established ornamental plants listed on this label. Do not apply to plants that are under stress. Do not over-apply or mix this product into the soil, as injury may occur to plants which are sensitive to Preen Southern Weed Preventer. **This product is not for use on vegetable gardens or lawns** or for use in enclosed areas, such as greenhouses. Do not apply another herbicide within 4 weeks of application of this product. Do not apply more than 4.25 lbs. of this product per 1,000 sq. ft. per application, and no more than 12.75 lbs. of this product per 1,000 sq. ft. per year.

In the state of New York, do not apply more than 2.1 lbs. per 1,000 sq. ft. per year (equivalent to 0.25 pounds of active ingredient per acre). Use of this product in Nassau and Suffolk counties of New York is prohibited.

ENTRY RESTRICTIONS

Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If product is watered-in, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

Weeds Controlled

GRASSY WEEDS:

Barley
Barnyardgrass
Bluegrass: Annual
Brome

Buttercup
Crabgrass:
Large, Smooth,
Southern
Crowfootgrass

Dallisgrass
(seedling)
Goosegrass
Foxtail: Green, Yellow
Kikuyugrass

Oats, Wild
Ryegrass:
Annual, Perennial
Sandbur
Smutgrass

BROADLEAF WEEDS:

Bittercress
Carpetweed
Chickweed
Geranium, Carolina

Henbit
Knotweed Prostrate
Lespedeza Common
Lambsquarters
Marestail

Medic, Black
Mustard
Pineappleweed
Pigweed,
Redroot

Parsely-piert
Purslane, Common
Rocket, London
Shepherdspurse
Speedwell, Corn

Spurge: Garden,
Prostrate, Spotted
Woodsorrel:
Creeping, Yellow

When To Apply Preen Southern Weed Preventer

Apply Preen Southern Weed Preventer during the growing season only around established plants. Preen Southern Weed Preventer should not be used on flower seeds. It can be used after flowering plants have germinated and are 2-3 inches tall. Since it does not kill existing weeds, you must first remove any that have already begun to grow. By applying Preen Southern Weed Preventer as early as possible, you can eliminate the need for hand weeding. Rain does not wash this product out of the soil. To keep ornamental beds neat all season long, reapply Preen Southern Weed Preventer every 4 months.

How To Apply Preen Southern Weed Preventer

To avoid plant injury, **do not apply Preen Southern Weed Preventer when foliage is wet.** When plants are dry, sprinkle Preen Southern Weed Preventer on soil surface at rate given below. Once activated by watering, Preen Southern Weed Preventer forms a weed control barrier in the top layer of soil, preventing weed seeds from germinating. Disturbance to the soil surface after activation may result in erratic weed control.

Applying Around Established Plants

For flowers, roses, ground covers, ornamental grasses, shrubs and trees: sprinkle Preen Southern Weed Preventer evenly over the entire soil surface, at the rate of 0.68 oz. per 10 sq. ft. (see picture on right), being sure to keep granules away from plant roots and foliage. Water Preen Southern Weed Preventer into soil surface. Always wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

Surface Application Rate: Sprinkle granules at the density shown in this picture.



Applying Preen Southern Weed Preventer With Mulch

For best weed control, apply Preen Southern Weed Preventer after spreading mulch on your flower and shrub beds. Sprinkle Preen Southern Weed Preventer on top of mulch at surface rate (see picture above right), being sure to keep granules away from plant foliage. Water Preen Southern Weed Preventer into mulch. Always wash or brush stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

Preen Southern Weed Preventer Is Suggested For Use Around These Established Plants

BULBS, FLOWERS, GROUND COVERS & ORNAMENTAL GRASSES

Ajuga: Bronze, Beach Grass, Bronze Beauty
Aster, Chinese: Dwarf Queen
Basket Flower
Bee Balm
Begonia
Black-eyed Susan: Goldstrum
Blanket Flower
Blue Fescue
Bugle Carpet
Carex, Variegated
Celosia
Centaura
Cockscomb, Plumoso: Scarlet plumose

Coleus: Red Kewpie
Columbine
Coreopsis: Moonbeam
Corn Flower
Cotoneaster
Daffodil: King Alfred
Daylily: Aztec Gold, Bright yellow (hybrid), Single gold (evergreen), Wilson's Yellow
Dianthus (Sweet William)
Delphinium: Magic fountain
Dusty miller
Fern (various)
Fescue
Fountain Grass

Galium
Geranium
Hosta: Albo marginata
Ice plant
Impatiens
Iris: Dwarf blue, Wedgewood
Ivy, English: Bulgaria, Thorndale
Jasmine, Asian
Lily, African: Lily, African blue
Lilyturf: Evergreen giant, Lilac beauty, Majestic, Monroe white, Variegata
Liriope, Green

Marigold: Honeycomb, Variegata, Wheeleris dwarf
Mondo Grass
Moss Rose: Sunnyside
Narcissus
Osteospermum: Wirligig
Pachysandra
Pampas grass
Pansy
Periwinkle, Dwarf
Petunia: Picoti
Ribbon grass
Rockcress: Snowcap

Salvia: Rhea
Sedum: Dragon blood red, Red carpet, Yellow
Snapdragon
Sweetflag, Grassy-Le
Trumpet flower, Evening
Tulip: Apeldoorn
Tufted hairgrass
Vervain: St. Paul
Vinca (Periwinkle)
Yarrow

SHRUBS

Abelia, Dwarf: Nana
Arborvitae: Nigra, Pyramidali, Smaragh, Techny, Woodwardii
Arborvitae, Golden
Azalea: Brilliant, Buccaneer, Carror, Chimes (Belgian), Elsie Lee, Exbury, Fashion, Hardijzer Beauty, Hershe Red, Higasa, Hinocrimson, Holland (Hybrid), Marion Lee, Northern lights, Orange Cup, Orchid Lights, Snow, Southern charm
Azalea, Flame
Azalea, Kirishima
Bamboo, Heavenly
Barberry: Aurea, Dwarf Pigmy, Green, Kobold, Pygmy Red, Rose Glow
Barberry, Purple: Atropurpurea
Bearberry (common) Massachusetts
Bottlebrush
Boxwood, Japanese
Boxwood, Weller
Broom: Moonlight, Vancouver Gold

Camellia: Chansonette, Debutante, Mathotiana Supreme
Candy Tuft: Snow White
Cedar, Red
Copper Leaf
Coyotebrush
Cycads
Euonymus: Argenteo-variegata, Auereo-marginata, Colorata, Emerald Gaiety, Emerald àN Gold, Gold Edge, Gold Princess, Silver King, Tricolor, Vegetus
Fetterbush: Rainbow
Forsythia: Arnold Dwarf, Bronxensis Dwarf, Lynwood Gold, Meadowlark, Weeping
Fuchsia Gardenia: Mystery, Radicans
Heather, Twisted: Mediterranean Pink
Hibiscus: Blue bird, Brilliant, Hula girl
Holly: Blue boy, Blue girl, Burfodii, China girl, Compacta, Forsteri, Hellerie, Japanese northern beauty, Needlepoint,

Nellie R. Stevens, Savannah
Holly, Chinese
Holly, Japanese
Holly, Yaupon
Honeysuckle: Claveyís Dwarf, Halliana, Tatarian Canadian White, Zebelli, Red Hosta
Juniper: Arcadia, Armstrong, Bar Harbor, Blue Chip, Blue Pacific, Blue Rug, Blue Star, Broadmoor, Buffalo, Calgary Carpet, Emerald Sea, Emerald Spreader, Endora Compacta, Fruilandi, Green, Gold Tip, Hetzi, Hughes, Manhattan Blue, Parsoni, Pfitzeriana, Plumosa, Prince of Whales Procumbens Dwarf, San Jose, Sargent Blue, Sargent Green, Scandia, Scopulorum Moonglow Scopulorum Skyrocket, Spartan, Tamariscifolia, Weberi, Youngstown,

Yukon, Belle
Laurel, Australian
Laurel, Mountain
Leucothoe
Ligustrum, Japanese
Lily of the Valley: Mt. Fire
Myrtle, Crape: Faurei, Langer, Muskogee, Standard Pink
Myrtle, Wax
Nandina: Compacta, Nana
Oleander: Hardy Red, Petite Pink, Sister Agnes
Paper Flower: Barbara Karst
Photinia, Red tip
Pieris
Pine: Mugho
Pine, Swiss Mt.
Pineapple, Guava
Pittosporum, Japan
Potentilla: Abbotswood
Privet: Golden Vicary, Regal, Texanum, Wax, Yellow Tipped
Privet, Glossy
Pyracantha: Gnome, Lalandei, Victory
Rhododendron: Album, Cunningham

White, Fashion, Hardy, PJM, Purple Gem, Silvery Pink
Rhododendron, Carolina
Rhododendron, Catawba
Rodie Max (Rosebay)
Rose: Luta
Rosemary, Bog: Nana
Spiraea: Anthony Waterer red, Dolchica, Fanail, Froebeli Pink, Goldenflame Red, Snowmound White, Van Houtte White
Spriaea, Garland
Verbena, Shrub
Virburnum: American, Cranberry Bush, Arrowood, Common snowball, European, Linden, Mohican, Wright
Xylosma
Yaupon: Dwarf
Yew: Denisiformis

TREES

Almond, Flowering
Ash: Green, Mountain, Purple
Birch, River
Cypress, Bald
Cypress, Italian: Glauca
Cypress, Japanese false: Gracilis
Cypress, Leyland
Dogwood

Dogwood, American: Flavarimaea
Douglas Fir
Elm, Drake
Fan Palm, European
Fan Palm, Mexican
Ficus
Fir Fraser
Gum
Hawthorn: Cockspur White, Crimson Cloud, Enchantress,

Jack Evans, Washington White
Hemlock, Canada
King Palm
Maple, Japanese
Maple, Norway
Maple, Red
Maple, Silver
Maple, Sugar
Oak, Laurel
Oak, Pin
Oak, Red

Oak, Southern L
Oak, Willow
Palm, Bangalow
Pine, Australian
Pine, Japanese Black
Pine, Loblolly
Pine, Longleaf
Pine, Scotch
Pine, Slash
Pine, Virginia
Pine, White
Queen Palm

Sourwood
Spruce, Black Hills
Spruce, Colorado Blue
Spruce, Norway
Spruce, White
Sweetgum
Sycamore
Tree fern (Tiki fern)
Windmill Palm

NONBEARING FRUIT AND NUT TREES AND PLANTS*

Apple
Blueberry: Bluecrop, BlueJay, Jersey, North

Blue, Northland
Mock orange: Golden, Snowflake

Double White
Peach
Quince, Japanese

*Ornamental species only: Do not use on food producing trees and ornamentals.

Storage and Disposal

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal. **Pesticide Storage:** Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. **Pesticide Disposal and Container Handling:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Warranty

NOTE: To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

CAS No. 97886-45-8
 EPA Reg. No. 961-410
 (L) (D)
 EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
 Superscript used is first letter of lot number.

Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation.

Manufactured by / Fabricado por: Lebanon Seaboard Corporation
 1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042



PROOF OF PURCHASE | Comprobante de compra

Declaraciones de precaución

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Provoca irritación ocular moderada. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario deberá quitársela de inmediato. Luego, deberá lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

Primeros auxilios

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
- Si usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

SI SE INGIERE:

- Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
- Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.
- No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.
- Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:

- Quítese la ropa contaminada.
- Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

SI SE ASPIRA:

- Lleve la persona a un lugar con aire fresco.
- Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.
- Llame a un centro de control de envenenamientos para obtener asesoramiento adicional sobre el tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Riesgos ambientales

Este producto es tóxico para los peces. El sedimento y el residuo líquido pueden perjudicar a los organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo ayudará a asegurar que el viento no sople el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del jardín para evitar que se escurra hacia aguas superficiales o sistemas de drenaje.

Instrucciones de uso

Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

Información Del Producto

El controlador de malezas Preen Southern evita la germinación de la mayoría de las malezas por hasta 4 meses en macizos de flores y alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos. Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas lista malezas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin malezas, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes. Sus macizos se mantendrán arreglados y limpios durante toda la temporada.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

No lo use en plantas que se hayan cultivado para la venta u otro uso comercial, para la producción comercial de semillas ni para fines de investigación. Úselo en plantas destinadas para fines estéticos o modificaciones climáticas, y que se estén cultivando en jardines ornamentales. No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

APTO PARA USO RESIDENCIAL / NO APTO PARA USO EN JARDINES DE HORTALIZAS O CÉSPEDES

Aplique el controlador de malezas Preen Southern solo en las plantas ornamentales establecidas enumeradas en esta etiqueta. No aplique en plantas que estén bajo estrés. No aplique de manera excesiva ni mezcle este producto en el suelo, ya que puede producir daños a las plantas sensibles al controlador de malezas Preen Southern. Este producto no se debe usar en jardines de hortalizas, céspedes ni en áreas cerradas como invernaderos. No aplique otro herbicida dentro de las 4 semanas desde la aplicación de este producto. No aplique más de 1,93 kg de este producto por cada 92,90 m² por aplicación, y no más de 5,78 kg de este producto por cada 92,90 m² por año.

En el estado de Nueva York, no aplique más de 0,95 kg por cada 92,90 m² por año, (equivalente a 0,11 kg de ingrediente activo por cada 0,40 ha).

Se prohíbe el uso de este producto en los condados de Nassau y Suffolk en Nueva York.

RESTRICCIONES DE ENTRADA

No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si se va a regar el producto, no ingrese ni permita que otros ingresen en las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.

Malezas que controla

MALEZAS HERBOSAS:

Cebada
Capín arroz
Césped azul: Anual

Bromo
Botón de oro
Digitaria: Grande, suave, del sur
Zacate egipcio

Pasto miel (plántulas)
Pata de gallina
Cola de zorro: Verde, amarilla

Césped Kikuyo
Avena silvestre
Ballico: Anual, perenne
Rosetilla

Pasto alambre

MALEZAS DE HOJA ANCHA:

Mastuerzo amargo
Culantrillo
Pamplina
Geranio Carolina

Ortiga muerta
Sanguinaria postrada
Trébol de los prados común
Cenizo

Corregüela hembra
Lupulina
Mostaza
Hierba de la piña
Yuyo colorado

Alquimila arvense
Verdolaga común
Matacandil
Bolsa de pastor
Verónica arvensis

Hierba de golondrina: De jardín, postrada, manchada
Acedera menor: Rastrera, amarilla

Cuándo aplicar el controlador de malezas Preen Southern

Aplique el controlador de malezas Preen Southern durante la temporada de crecimiento solo alrededor de plantas establecidas. El controlador de malezas Preen Southern no se debe usar en semillas de flores. Se puede usar después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto.

Dado que no mata las malezas existentes, deberá quitar primero cualquier maleza que haya comenzado a crecer. Si aplica el controlador de malezas Preen Southern lo antes posible, podrá eliminar la necesidad de desmalezar manualmente. La lluvia no elimina este producto del suelo. Para mantener los macizos de flores libres de malezas durante toda la temporada, vuelva a aplicar el controlador de malezas Preen Southern cada 4 meses.

Cómo aplicar el controlador de malezas Preen Southern

Para evitar daños en la planta, no aplique el controlador de malezas Preen Southern cuando el follaje esté mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas Preen Southern en la superficie del suelo según las dosis que se indican a continuación. Una vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas Preen Southern forma una barrera de control contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.

Aplicación alrededor de plantas establecidas

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos y árboles: Rocíe el controlador de malezas Preen Southern de manera uniforme sobre toda la superficie del suelo, con una dosis de 20,11 cm³ por cada 0,93 m² (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador de malezas Preen Southern para que se incorpore en la superficie del suelo. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Espolvoree los gránulos a la densidad se muestra en esta imagen.



Para aplicar el controlador de malezas Preen Southern con compuesto orgánico

Para obtener un mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas Preen Southern después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas Preen Southern sobre el compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de abajo a la izquierda), asegurándose de mantener los granulos alejados del follaje de las plantas. Water Preen Southern Weed Preventer into mulch, Lave o limpie siempre los granulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Se recomienda usar el controlador de malezas Preen Southern alrededor de las siguientes plantas establecidas

BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES:

Ajuga: Bronze, Beach
Ajuga Bronze Beauty
Aster chino: Dwarf
Queen
Centaurea americana
Bergamota silvestre
Begonia
Rudbeckia: Goldstrum
Gallardia
Festuca azul
Búgula
Cárex variegado
Celosia
Centaura

Cresta de gallo
plumosa:
Scarlet Plumosa
Cóleo: Red Kewpie
Aguileña
Coreopsis: Moonbeam
Aciano
Cotoneaster
Narciso: King Alfred
Hemerocallis: Aztec
Gold, Bright yellow
(híbrida), Single gold
(perenne), Wilsonis
Yellow Clavel (del

poeta)
Espuela de caballero:
Magic fountain
Senecio cineraria
Helecho (varios)
Festuca
Penisetum chino
Galium
Geranio
Hosta: Albo marginata
Delosperma
Alegría de la casa
Lirio: azul enano,
Wedgewood

Hiedra: Bulgaria,
Thorndale
Jazmín de leche
Lilium africano:
Lilium African Blue
Liriope: Evergreen
giant, Lilac beauty,
Majestic, Monroe
white, variegado
Liriope verde
Maravilla: Honeycomb,
variegada, Wheelers
enana
Convallaria

Portulaca: Sunnyside
Narciso
Caléndula: Wirligig
Diamante
Hierba de la pampa
Pensamiento
Vinca pervinca
enana
Petunia: Picoti
Falaris
Arabis: Snowcap
Salvia: Rhea
Sedum: Dragon blood
red, Red carpet,

Yellow
Boca de dragón
Sweetflag, Grassy-Le
Bignonia Evening
Tulpán: Apeldoorn
Deschampsia
Verbena: St. Paul
Vinca (Pervinca)
Milenrama

ARBUSTOS

Abelia enana: Nana
Tuya: Nigra,
Pyramidal,
Smaragh, Techny,
Woodwardii
Tuya Golden
Azalea: Brilliant,
Buccaneer, Carror,
Chimes (Belga), Elsie
Lee, Exbury, Fashion,
Hardijzer Beauty,
Hershe Red, Higasa,
Hincrimson, Holland
(híbrida), Marion Lee,
Northern lights,
Orange Cup, Orchid
Lights, Snow,
Southern charm
Azalea Flame
Azalea Kirishima
Bambú divino
Agracejo rojo: Aurea,
Dwarf Pigmy, Green,
Kobold, Pygmy Red,
Rose Glow
Agracejo púrpura:
Atropurpurea

Gayuba (común)
Massachusetts
Limpiatubos
Boj japonés
Boj Weller
Retama: Moonlight,
Vancouver Gold
Camelia: Chansonette,
Debutante, Malhotiana
Supreme
Cestillo de plata:
Snow White
Cedro rojo
Hoja de cobre
Arbusto coyote
Cicades
Evónimo:
Argenteo-variegata,
Aureo-marginata,
Colorata, Emerald
Gaiety, Emerald eN
Gold, Gold Edge, Gold
Princess, Silver
King, Tricolor, Vegetus
Lyona lucida: Rainbow
Forsitia: Arnold
enana, Bronxensis
enana, Lynwood

Gold, Meadowlark,
Weeping
Fucsia Gardenia:
Mystery, Radicans
Brezo torcido:
Mediterranean Pink
Hibisco: Blue bird,
Brilliant, Hula girl
Acebo: Blue boy, Blue
girl, Burfordii, China girl,
Compacta, Forsteri,
Hellerie, Japanese
northern beauty,
Needlepoint, Nellie R.
Stevens, Savannah
Acebo chino
Acebo japonés
Acebo Yaupon
Lonicera: Claveyis
enana, Halliana,
Tatarian Canadian
White, Zebelli, Red
Hosta
Junipero: Arcadia,
Armstrong, Bar Harbor,
Blue Chip, Blue Pacific,
Blue Rug, Blue Star,
Broadmoor, Buffalo,

Calgary Carpet,
Emerald Sea,
Emerald Spreader,
Endora Compacta,
Fruittandi, Green,
Gold Tip, Hetzi,
Hughes, Manhattan
Blue, Parsoni,
Pflizeriana, Plumosa,
Prince of Whales,
Procarbena Dwarf,
San Jose, Sargent
Blue, Sargent Green,
Scandia, Scopulorum
Moonglow
Scopulorum
Skyrocket, Spartan,
Tamariscifolia,
Weberi, Youngstown,
Yukon, Belle
Laurel australiano
Laurel de montaña
Leucothoe
Aligustre japonés
Azucena del valle:
Mt. Fire
Árbol de Júpiter:
Faurei, Langer,

Muskogee, Standard
Pink
Mirto de cera
Nandina: Compacta,
enana
Adelta: Hardy Red,
Petite Pink, Sister
Agnes
Flor de papel:
Barbara Karst
Fotinia Red Tip
Pieris
Pino: Mugho
Pino Swiss Mt.
Feljoa
Pitosporo japonés
Cincoenrama:
Abbotswood
Aligustre: Golden
Vicary, Regal,
Texanum, Wax,
Yellow Tipped
Aligustre arbóreo
Piracanta:
Gnome, Lalandei,
Victory
Rododendro: Album,
Cunningham White,

Fashion, Hardy, PJM,
Purple Gem, Silvery
Pink
Rododendro Carolina
Rododendro Catawba
Laurel grande (rosa de
la bahía)
Rosa: Luta
Andrómeda: enana
Espirea: Anthony
Waterer red, Dolchica,
Fanail, Froebelii Pink,
Goldenflame Red,
Snowmound White,
Van Houtte White
Espirea Garland
Arbusto de verbena
Viburno: Americano,
Cranberry Bush,
Arrowood, Common
snowball, European,
Linden, Mohican, Wright
Espina corona
Yaupon: Enano
Tejo: Denisiformis

ÁRBOLES

Almendra en
floración
Fresno: Green,
Mountain, Purple
Abedul de río
Ciprés calvo
Ciprés Italiano: Azul
Falso ciprés japonés:
Gracilis
Ciprés de Leyland

Cornejo
Cornejo americano:
Flaviramiaea
Abeto Douglas
Olmo Drake
Palmito europeo
Palmera mexicana
Ficus
Abeto Frasier
Goma
Espino: Cockspur

White, Crimson Cloud,
Enchantress, Jack
Evans, Washington
White
Falso abeto del
Canadá
Palma King
Arce japonés
Arce de Noruega
Arce rojo
Arce plateado

Arce azucarero
Roble laurel
Roble de los
pantanos
Roble rojo
Roble del sur L
Roble sauce
Palma Bangalow
Pino australiano
Pino negro japonés
Pino de incienso

Pino de hoja larga
Pino escocés
Pino Slash
Pino de Virginia
Pino blanco
Palma de la reina
Oxydendrum
arboresum
Picea Black Hills
Picea Colorado Blue
Picea de Noruega

Picea blanca
Liquidámbar
americano
Sycamore
Helecho (Helecho
Tiki)
Palmito elevado

ÁRBOLES Y PLANTAS QUE NO PRODUCEN FRUTOS O FRUTOS SECOS:

Manzano
Arándano

Bluecrop, Blue
Jay, Jersey, North

Blue, Northland
Celinda:

Golden, Snowflake
Double White

Melocotonero
Quince, japonés

†Solo especies ornamentales: No use en árboles productores de frutos ni ornamentales.

Almacenaje y eliminación
No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o eliminar el producto.
Almacenaje del pesticida: Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco, seco, seguro y fuera del alcance de los niños y animales.
Eliminación del pesticida y manipulación del envase: El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni llenar este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura o, si está disponible, otrézcalo para reciclaje. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca coloque productos que no utiliza debajo de un drenaje externo o interno.

Garantía
NOTA: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

INGREDIENTE ACTIVO:
Diflucipir 0.27%
OTROS INGREDIENTES .. 99.73%
TOTAL 100.00%

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Consulte el panel posterior para obtener información sobre primeros auxilios y otras declaraciones de precaución adicionales. Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas tratadas.

DETIENE LAS MALEZAS* antes de que aparezcan
Bloquea la maleza* durante 4 meses, garantizado.
Incluye PALA DE APLICACIÓN

Peso Neto: 4,8 kg (10,625 lbs.)
Cubre 232,3 m²

No apto para uso en jardines de hortalizas o céspedes

(L) (D)
CAS No. 97886-45-8 EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
EPA Reg. No.961-410 El superíndice usado es la primera letra del número de lote.



Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation.

Manufactured by | Fabricado por:
Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042