



5,000 SQ FT / 464.51 M<sup>2</sup>

FEEDS



# CRABGRASS PREVENTER & LAWN FERTILIZER I



## ASSURANCE PARTICLE TECHNOLOGY®

- greens in 72 hours
- even feeding, even greening with no burn guaranteed



prevents crabgrass for up to four months



builds thick, green lawns



contains time-release nitrogen for extended feeding

### 29-0-3

APPLY EARLY SPRING OR FALL

ACTIVE INGREDIENT:  
 Pendimethalin\* ..... 1.22%  
 OTHER INGREDIENTS ..... 98.78%  
 TOTAL ..... 100.00%  
 \*CAS # 40487-42-1

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
**CAUTION** See back for additional Precautionary Statements.



WORKS THE FIRST TIME OR YOUR MONEY BACK

FEEDS

5,000 SQ FT / 464.51 M<sup>2</sup>

NET WT 14.06 lb / 6.37 kg

CRABGRASS PREVENTER & LAWN FERTILIZER I



CRABGRASS PREVENTER & LAWN FERTILIZER I



FEEDS 5,000 SQ FT / 464.51 M<sup>2</sup>

CRABGRASS PREVENTER & LAWN FERTILIZER I



WORKS THE FIRST TIME OR YOUR MONEY BACK

**WHY FERTILIZE THE LAWN?**

While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...

- 1 Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawns stay greener longer and bounces back faster.
- 2 Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning.
- 3 Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds.



VS. REGULARLY FED LAWN Césped con fertilización regular

**¿POR QUÉ FERTILIZAR EL CÉSPED?**

Si bien es fácil ver ese satisfactorio verde intenso cuando se fertiliza, las fertilizaciones regulares pueden hacer mucho más...

- 1 Fomenta un sistema de raíces profundo y denso que soporta mejores condiciones para llegar al agua y encontrar los nutrientes durante el calor fuerte y la sequía, por lo que el césped se mantiene más verde durante más tiempo y se recupera más rápidamente.
- 2 Tapa el césped con hojas adicionales de grama, haciéndolo más resistente contra áreas vacías y raras.
- 3 Ayuda a prevenir las malezas al hacer más difícil que las semillas de las malezas en el aire encuentren tierra para arraigarse, así como a desplazar las malezas existentes.

**NEXT FEEDING/SIGUIENTE FERTILIZACIÓN**

Feed every 8 weeks for optimal results.

Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos.



Apply anytime when weeds are actively growing.<sup>1</sup> Maximum of 2 applications per year.

Apliquelo en cualquier momento en que las malezas están creciendo activamente.<sup>1</sup> Máximo de 2 aplicaciones por año.

OR

Apply anytime during the growing season.

Apliquelo en cualquier momento durante la temporada de crecimiento.

**DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

**APPLICATION**

Apply to dry foliage. It is not necessary to water in after application. However, for best results the lawn should receive 1/4 to 1/2 inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application. Apply this product in early Spring before the 4th mowing or before temperatures are regularly in the 80's. Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product. Do not seed or sod for four months following application. This product can prevent seeds from germinating. On newly seeded or sodded areas, wait until grass has been mowed at least 4 times. On newly sprigged areas, wait 5 months before using. Do not use on Dichondra, St. Augustinegrass or bentgrass lawns. Do not apply to shrubs, flower or garden seed beds or plants.

Allow at least 4-6 weeks between applications of any other product in this Program.

Do not apply material to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing, or shoes. If contact occurs brush off particles to prevent staining and unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water. This product applies 1.5 lbs. of pendimethalin per acre. Do not apply more than twice a year.

**RAKING**

You may rake your lawn lightly to remove grass clippings or debris. But avoid raking to the soil surface in your lawn for 4 months after application. Heavy raking will disturb the layer of soil where the product was applied and reduce the effectiveness. Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

**DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED**

DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA QUE SERÁ TRADADA



**SPREADER SETTINGS POSICIONES DEL ESPARCIDOR**

A 14.06 lb bag covers 5000 sq. ft. Use the settings below to apply at a rate of 2.81 lbs of product per 1000 sq. ft. Una bolsa de 14.06 libes cubre 5000 pies cuadrados. Usa las posiciones a continuación para aplicar a razón de 2.81 lb por 5000 pies cuadrados.

VIGORO BROADCAST/ROTARY SPREADERS	
VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000	4
VIGORO SPREAD CONTROL™	4 1/2
SCOTT'S® BROADCAST/ROTARY SPREADERS	
SCOTT'S® STANDARD, SCOTT'S® TURF BUILDER® EDGEGUARD® DLX or MINI	4 1/4
SCOTT'S® DROP SPREADERS	
SCOTT'S® ACCUGREEN™ SCOTT'S® TURF BUILDER® CLASSIC DROP	9/4



**INSTRUCCIONES DE USO**

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta vulnera la legislación federal.

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Aplique al follaje seco. No es necesario regar después de la aplicación. No obstante, para obtener los mejores resultados, el césped debe recibir entre 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada de agua de lluvia o de riego 2 a 3 días después de la aplicación.

Aplique este producto al comienzo de la primavera, antes del cuarto corte de césped o antes de que las temperaturas alcancen normalmente los 80º Fahrenheit. La lluvia, la nieve o las heladas después de la aplicación no afectarán el rendimiento de este producto. No siembre ni cubra con césped durante cuatro meses después de la aplicación. Este producto puede impedir que las semillas germinen. En áreas recién sembradas o cubiertas con césped, espere por lo menos hasta el cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de usarlo. No lo use en céspedes de las variedades dichondra, San Agustín o agrostis.

No lo aplique a arbustos, flores ni semilleros o plantas de jardín. Deje que pasen por lo menos 4 a 6 semanas entre cada aplicación de cualquier otro producto en este programa.

No aplique el producto a superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar manchas y rastros no deseados hacia la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

Con este producto se aplica 1.5 libras de pendimethalin por acre. No aplique más de dos veces al año.

**RASTRILLADO**

Puede rastrear ligeramente el césped para limpiar desechos y restos de hierba, pero evite penetrar la superficie de la tierra de su prado por 4 meses después de la aplicación. Un rastrellado intenso puede trastocar la superficie de la tierra donde el producto fue aplicado y reducir su eficacia. No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de una manera que no entre en contacto con personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área durante la aplicación.

**WEEDS CONTROLLED**

Barnyardgrass, Chickweed, Crabgrass, Fall panicum, Foxtail, Knotweed, Moss, Oxalis (common yellow woodsorrel), Poa annua, Spurge\*\*

\*\*For heavy infestation a repeat treatment may be used after 6-8 weeks.

**MALEZAS CONTROLADAS**

El capin arroz, el zacate cola de zorra, la oca o vinagrillo (oxalis común amarilla), la estalaria, el poligono, la espiguilla o poa anual, la digitaria, el ruibarbo, el tartarugo y el coqueño.

\*\*Para infestaciones intensas, el tratamiento puede repetirse a las 6 u 8 semanas.

**STORAGE AND DISPOSAL**

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry place. Remove opened bag by folding top down and securing. **PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or other recycling facility. Available. If filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**PRECAUTION STATEMENTS**

Hazards to Humans & Domestic Animals

**CAUTION:**

Irritant. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

**User Safety Recommendations**

User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Immediately wash thoroughly and get on clean clothing.

**First Aid**

**IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This pesticide is toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into any streams, rivers, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

**NOTICE:** To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safe use and not in accordance with terms of this label and directions for use.

**Vigoro® Cobgrass Preventer & Lawn Fertilizer, 29-0-3**

**GUARANTEED ANALYSIS:**

Total Nitrogen (N) 29%  
 21.2% Nitrogen  
 7.8% Other Water Soluble Nitrogen  
 0.6% Water Insoluble Nitrogen  
 Soluble Potash (K<sub>2</sub>O) 3%  
 Derived From: Methylene Urea, Urea, Polymer Coated Sulfur Coated Urea and Potassium Chloride.  
 Contains 7.3% slowly available Nitrogen from Methylene Urea and Polymer Coated Sulfur Coated Urea.  
 \*F1905

**VIGORO® GUARANTEE:**

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a check promptly. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <https://www.vigoro.com/metaldata.html>  
 EPA Reg. No. 538-07-2327  
 EPA Est. No. 538-09-15; 538-09-29; 86523-09-19; 9198-09-10; 9198-09-20; 9198-09-11; 984575-18-19; 82737-18-11; 82737-09-19; 82737-06-03; 68878-09-17  
 Supplement used is first letter of an azo code on end of container.  
 Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.  
 2903 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754  
 ©2023. World rights reserved.

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guardarlo en un lugar fresco y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y respaldando. **ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Envase no reutilizable. No vuelva a usar o rellenar este envase. **Envase vacío:** Descartarlo en la basura o recíclalo si es posible. Si sobra contenedor después del uso: Llame a la agencia local de manejo de desechos sólidos para conocer las instrucciones de desecho. Nunca botar el producto sobrante por ningún drenaje en interiores o exteriores.

**RIESGOS DE PRECAUCIÓN**

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

**PRECAUCIÓN:**

Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Es nocivo si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

**Recomendaciones de seguridad para el usuario**

Evite el contacto con los ojos, la piel, el cabello, el bigote, el mustache, consumir tabaco o usar el baño. El usuario debe quitarse la ropa de inmediato si le cae dentro pesticide, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

**Primeros auxilios**

**SI CAEN EN LA PIEL O EN LA ROPA:** Cultive la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un Centro de Control de Envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.

**SI ENTRA EN LOS OJOS:** Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto (si hubieran) después de los primeros 5 minutos, luego seguir enjuagando los ojos. Llame a un Centro de Control de Envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.

Llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Control de Envenenamientos o al médico, o cuando busque tratamiento.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Este pesticide es tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticide penetre o se escurre en drenajes pluviales, zanjas de desague, corrientes o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticide fuera del área de aplicación. Este producto que circula entre entradas de automóviles, áreas o la calle de regreso al área de césped tratada evitará que se escurre a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recíclalo el producto para uso o deséchelo como se describe.

**NOTA:** Hasta donde se compare con la ley que aplica, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con los términos de este etiqueta las instrucciones.

**GARANTÍA VIGORO®:** Si por alguna razón usted, el cliente, no está satisfecho con el producto, hacer un pedido de reembolso. Envíe derecho a que se le devuelva su dinero. Simplemente envíenos su prueba de compra y nosotros le enviaremos rápidamente por correo un cheque de reembolso.

Visit Us On The Internet or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visitenos En Internet o llámanos a nuestra línea directa de satisfacción al cliente

vigoro.com or 1-800-394-1870




## WHY FERTILIZE THE LAWN?

- While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...
- Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener longer and bounces back faster.
  - Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning.
  - Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds.



UNFED LAWN  
Césped sin  
fertilización



REGULARLY FED LAWN  
Césped con  
fertilización regular

VS.

## NEXT FEEDING/SIGUIENTE FERTILIZACIÓN

Feed every 8 weeks for optimal results.

Fertilize cada 8 semanas para obtener resultados óptimos.



Apply anytime when weeds are actively growing.<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Maximum of 2 applications per year.

Aplíquelo en cualquier momento en que las malezas están creciendo activamente.<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Máximo de 2 aplicaciones por año.

OR



Apply anytime during the growing season.

Aplíquelo en cualquier momento durante la temporada de crecimiento.

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

### APPLICATION

Apply to dry foliage. It is not necessary to water in after application. However, for best results the lawn should receive 1/4 to 1/2 inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application. Apply this product in early Spring before the 4th mowing or before temperatures are regular in the 80's. Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product. Do not seed or sod for four months following application. This product can prevent seeds from germinating. On newly seeded or sodded areas, wait until grass has been mowed at least 4 times. On newly sprigged areas, wait 5 months before using. Do not use on Dichondra, St. Augustinegrass or bentgrass lawns. Do not apply to shrubs, flower or garden seed beds or plants.

Allow at least 4-6 weeks between applications of any other product in this Program.

Do not apply material to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing, or shoes. If contact occurs brush off particles to prevent staining and unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water.


This product applies 1.5 lbs of pendimethalin per acre. Do not apply more than twice a year.

### RAKING

You may rake your lawn lightly to remove grass clippings or debris. But avoid breaking the soil surface in your lawn for 4 months after application. Heavy raking will disturb the layer of soil where the product was applied and reduce the effectiveness. Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

## DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED

DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA QUE SERÁ TRABADA



## SPREADER SETTINGS POSICIONES DEL ESPARCIDOR

A 14.06 lb bag covers 5000 sq ft. Use the settings below to apply at a rate of 2.81 lbs of product per 1000 sq ft.

Una bolsa de 14.06 lb cubre 5000 pies cuadrados. Usa las posiciones a continuación para aplicar a razón de 2.81 lb por 5000 pies cuadrados.

VIGORO BROADCAST/ ROTARY SPREADERS	
VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000	4
VIGORO SPREAD CONTROL™	4 1/2
SCOTT'S® BROADCAST/ ROTARY SPREADERS	
SCOTT'S® STANDARD, SCOTT'S® TURF BUILDER® EDGEGUARD® DLX or MINI	4 1/4
SCOTT'S® DROP SPREADERS	
SCOTT'S® ACCUGREEN™ SCOTT'S® TURF BUILDER® CLASSIC DROP	9/4



## INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta vulnera la legislación federal.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique al follaje en seco. No es necesario regar después de la aplicación. No obstante, para obtener los mejores resultados, el césped debe recibir entre 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada de agua de lluvia o de riego 2 a 3 días después de la aplicación.

Aplique este producto al comienzo de la primavera, antes del cuarto corte de césped o antes de que las temperaturas alcancen normalmente los 80° Fahrenheit. La lluvia, la nieve o las heladas después de la aplicación no afectarán el rendimiento de este producto. No siembre ni cubra con césped durante cuatro meses después de la aplicación. Este producto puede impedir que las semillas germinen. En áreas recién sembradas o cubiertas con césped, espere por lo menos hasta el cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de usarlo. No lo use en céspedes de las variedades dicondra, San Agustín o agrostis.

No lo aplique a arbustos, flores ni semilleros o plantas de jardín. Deje que pasen por lo menos 4 a 6 semanas entre cada aplicación de cualquier otro producto en este programa.

No aplique el producto a superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar manchas y rastros no deseados hacia la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

Con este producto se aplican 1.5 libras de pendimethalin por acre. No aplique más de dos veces al año.

### RASTRILLADO

Puede rastrellar ligeramente el césped para limpiar desechos y restos de hierba, pero evite penetrar la superficie de la tierra de su prado por 4 meses después de la aplicación. Un rastrellado intenso puede trastocar la superficie de la tierra donde el producto fue aplicado y reducir su eficacia. No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de una manera que entere en contacto con personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área durante la aplicación.

# WEEDS CONTROLLED

Barnyardgrass, Chickweed, Crabgrass, Fall panicum, Foxtail, Knotweed, Moss, Oxalis (common yellow woodsorrel), Poa annua, Spurge\*\*.

\*\*For heavy infestation a repeat treatment may be used after 6-8 weeks.

# MALEZAS CONTROLADAS

El capin arroz, el zacate cola de zorra, la oca o vinagrillo (oxalis común amarilla), la estalaria, el polígono, la espiguilla o pa anual, la digitaria, el muga, el tártago\*\* y el pasto colchón.

\*\*Para infestaciones intensas, el tratamiento puede repetirse a las 6 u 8 semanas.

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.

**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

**If empty:** Place in trash or offer for recycling if available.

**If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans & Domestic Animals

### CAUTION:

Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

### User Safety Recommendations

User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

### First Aid

**IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This pesticide is toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

**NOTICE:** To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with terms of this label and directions for use.

**Vigoro® Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer, 29-0-3**

### GUARANTEED ANALYSIS:

Total Nitrogen (N)\*.....29%

21.2% Urea Nitrogen

7.2% Other Water Soluble Nitrogen

0.6% Water Insoluble Nitrogen

Soluble Potash (K<sub>2</sub>O).....3%

**Derived from:** Methylene Ureas, Urea, Polymer Coated Sulfur Coated Urea and Potassium Chloride.

\*Contains 7.3% slowly available Nitrogen from Methylene Ureas and Polymer Coated Sulfur Coated Urea.

F1305

### VIGORO® GUARANTEE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund check promptly.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <https://www.aapfco.org/metals.html>

EPA Reg. No. 538-202-73327

EPA Est. No. 538-OH-15, 538-OH-2V, 85653-OH-1R, 9198-OH-1M, 9198-OH-2O,

9198-AL-11, 084175-TX-1R, 82757-FL-11, 82757-OH-1K, 82757-MA-2F,

86676-OR-1J

Superscript used is first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754

©2023. World rights reserved.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guárdalo en un lugar fresco y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola. **ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Envase no rellenable. No vuelvas a usar o rellenar este envase.

**Envase vacío:** Deséchalo en la basura o recíclalo si es posible. **Si sobra contenido después del uso:** Llame a la agencia local de manejo de desechos sólidos para conocer las instrucciones de desecho. Nunca botes el producto sobrante por ningún drenaje en interiores o exteriores.

## RIESGOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

### PRECAUCIÓN:

Es nocivo si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### Recomendaciones de seguridad para el usuario

El usuario debe lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. El usuario debe quitarse la ropa de inmediato si le cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

### Primeros auxilios

**SI CAE EN LA PIEL O EN LA ROPA:** Quitese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llamar a un Centro de Control de Envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.

**SI ENTRA EN LOS OJOS:** Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto (si hubieran) después de los primeros 5 minutos, luego seguir enjuagando los ojos. Llamar a un Centro de Control de Envenenamientos o a un médico para recomendaciones de tratamiento.

Llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Control de Envenenamientos o al médico, o cuando busque tratamiento.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Este pesticida es tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o

se escurre en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer el producto que caiga sobre entradas de automóviles, aceras o la calle de regreso al área de césped tratado evitará que se escurre a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recoja el producto para usarlo o deséchelo como es debido.

**NOTA:** Tenga donde sea congruente con la ley que aplica, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con los términos de esta etiqueta las instrucciones.

**GARANTÍA VIGORO®:** Si por alguna razón usted, el cliente, no estuviera satisfecho después de haber usado este producto, tiene derecho a que se le devuelva su dinero. Simplemente envíenos su prueba de compra y nosotros le enviaremos rápidamente por correo un cheque de reembolso.



Visit Us On The Internet  
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visitenos en Internet  
o llame a nuestra línea directa  
de satisfacción al cliente

[vigoro.com](http://vigoro.com) or 1-800-394-1870

52212A4 BGI0087  
Proof of Purchase



0 7 1645 52212 7  
Vigoro® Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer, 5M

VID-AM