

10.5" WIDTH

007-175\_Vigoro Weed & Feed 250932\_20100104\_01\_981\_.pdf  
© 2010 GARDEN CLUB

1000 024 580


Beautiful Yards since 1924  
**Vigoro**

**Weed & Feed**

Kills Over 250 Weed Types as Listed



**Kills Down to the Root**  
**Greens Lawns in 72 Hours & Promotes Thick, Green Growth**  
**Contains Time-released Nitrogen for Extended Feeding**



Net Wt.  
7.0 lb (3.17 x 10)  
Treats  
2,509 SQ FT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION**

See back panel for full text and additional Precaution Statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIÓN**

Ver el panel posterior para el texto completo y declaraciones adicionales de precaución.

**ACTIVE INGREDIENTS**

2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) 1.00%  
Mecoprop (2-methyl-4-propyl-2-pyridinyl propionic acid) 0.75%  
FERTILIZER (Nitrogen) 10.00%  
FERTILIZER (Phosphorus) 10.00%

**THE PRODUCT CONTAINS:**

2,4-D and Mecoprop are herbicides which inhibit the growth of broadleaf weeds. Fertilizer provides essential nutrients for lawn growth. See back panel for full text and additional Precaution Statements.

See back panel for full text and additional Precaution Statements.

CHEVRON SEAL

CHEVRON SEAL



Beautiful Yards since 1924  
**Vigoro**

**Weed & Feed**

2-CLOSURE

CHEVRON SEAL

CHEVRON SEAL

1000 024 580



# Weed & Feed

## Herbicida y fertilizante

### STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS CAUTION

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

#### FIRST AID

- If in eyes: • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes.  
• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.  
• Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For Emergency Medical Treatment Information call (888)208-1368.

#### ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

#### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet either directly or through drift.
- This product is for residential use.
- Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during treatment. Do not enter treatment area until dust has settled.

#### INSTRUCTIONS

Vigoro Weed & Feed contains Trimec® Herbicide. Trimec® controls a wide range of lawn weeds, including dandelion, chickweed, plantain, henbit, spurge and many other listed weeds commonly found in home lawns. In addition, a 28-0-3 fertilizer provides a supply of lawn food. Possible retreatment may be necessary if (a) the lawn is heavily overrun by weeds or, (b) if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made after 30 days. Treated areas may be seeded 3 weeks after application.

#### USE PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS

- Do not use on dichondra, carpetgrass, 'Floratum' St. Augustinegrass, creeping bentgrass, or turfgrass where desirable clovers are present.
- Do not apply this product to newly seeded grasses until well-established or after the second or third mowing.
- Do not use this product on flowers, vegetables, groundcovers, gardens or landscape plantings including shrubs and trees. Do not exceed specified dosage for any area and do not apply this product within the dripline of or over surface roots of trees, shrubs, and other ornamentals.
- Reseeding or overseeding areas may occur three (3) weeks after the application of this product.
- Do not use this product on or near desirable plants and avoid spreading granules onto exposed root systems or adventitious shoots (rhizomes) within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

#### HOW MUCH TO APPLY

For use on: Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, common bermudagrass, bahiagrass, zoysiagrass, St. Augustinegrass, centipedegrass, hybrid bermudagrass, and colonial bentgrass: Apply 2.8 pounds of product per 1,000 square feet of turfgrass. A second application may be made after 30 days. The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

#### MAXIMUM USE RATE STATEMENT

Do not apply more than 2.8 pounds of product per 1000 square feet of turfgrass per application. If necessary, a second application may be made no sooner than 30 days after the first. Do not apply more than 5.6 pounds of product per 1000 square feet per year.

The maximum broadcast application rate per acre is 1.28 lb 2,4-D ae, 0.29 lb MCPP-p ae and 0.12 dicamba ae per acre per application. The maximum seasonal rate is 2.56 lb 2,4-D ae, 0.58 lb MCPP-p ae and 0.25 lb dicamba ae per acre.

#### WHEN TO APPLY

- Apply when listed broadleaf weeds are actively growing in spring or early fall.
- Apply when the air is calm to ensure uniform coverage and avoid spreading granules onto flowers, vegetables, and ornamental shrubbery.

#### APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Mow lawn to normal height, 1 to 2 days before application.
2. For best results lawn must be MOIST and the air calm, when product is applied. When the lawn is moist, the product granules stick better to the leafy parts of the weeds, ensuring that the weed-killing ingredients are absorbed by the weed plant.  
TIP: Apply after a heavy dew or rain, or on a thoroughly watered lawn.  
TIP: DO NOT apply to a moist lawn if rain is expected within 24 hours of application.  
TIP: DO NOT water in immediately after application as the granules need to stick to the weed plant leaf for 1-2 days to be most effective.
3. Apply when weeds are young and actively growing.
4. Avoid applying when temperatures are consistently above 90°F.
5. After a 1-2 day period after application, if it has not rained - the lawn should be thoroughly watered.

#### VIGORO WEED & FEED KILLS MORE THAN 250 WEEDS!

Amaranth: purple, slender; Aster: heath, white heath, purple, white prairie; Artichoke; Austrian fieldcress; Bedstraw; Catchweed, smooth, Northern, pinewoods; Beggarticks, hairy; Betony, Florida; Bindweed; Field, Hedge; Bitter Wintercress; Bittercress, hairy; Bitterweed; Black-eyed Susan; Black Medic; Blood flower milkweed; Blue lettuce; Brassbuttons; Bristly oxtongue; Broomweed; Buckhorn; Bullnettle; Burdock; Burdock; Burweed, lawn (spurweed); Buttercup; bulbous, creeping; Buttonweed; common (poorjoe), Virginia; Carolina geranium (wild); Carpetweed; Catnip; Catsear, spotted (false dandelion); Chamber bitter; Chickweed; common, mouseear, sticky; Chicory; Cinquefoil; Clover: crimson, alyce, hop, rabbit foot, red, strawberry, yellow sweet, white sweet, white; Cocklebur: oriental, spiny; Common mullein; Corn Spurry; Creeping Beggarweed; Creeping Jenny (creeping charlie); Cupid shaving Brush; Cudweed; Daisy; English, oxeve; Dandelion: common, false; Day flower; Deadnettle; Dichondra; Dock; broadleaf, curly; Dogbane; Dogfennel; Dollarweed (Pennywort); Dove weed; Elderberry; Falseflax; False sunflower; Fiddleneck; Filaree: redstem, whitestem; Fleabane: daisy (annual), rough; Galinsoga: hairy, smallflower; Goldenrod; Ground ivy; Groundsel; Gumweed; Hairy fleabane; Hawkweed: meadow, mouseear, orange, yellow; Healall; Heartleaf drymary; Hemp; Henbit; Hoary cress; Horsenettle; Horseweed; Jimsonweed; Johnny-Jumpup violet; Knawel; Knotweed, prostrate; Kochia; Lambsquarters; Lespedeza; Mallow: alkali, bristly, common, dwarf, venice; Marcella; Matchweed; Mexicanweed; Moneywort; Morningglory: bigroot, ivyleaf,

mexican, red, tall, wolly; Mugwort; Mustard: ball, black, blue, hedge, Indian, tansy, tumble, white, wormseed; Nettle: stinging (burning), tall, wood; Parsley-piert; Parsnip; Pearlwort; Pennycress (frenchweed); Pepperweed; perennial, Virginia (Peppergrass); Pigweed: prostate, redroot, russian, smooth, tumble; Pineapple weed; Plains coreopsis (tickseed); Plantain: blackseed, bracted, broadleaf, buckhorn, hoary, narrowleaf, slender, woolly; Poison ivy; Poison oak; Pokeweed; Prairie Sunflower; Prickly lettuce (compass plant); Prickly sida; Prostrate knotweed; Puncturevine; Purslane, common; Pusley: brazil, florida, large flower; Ragweed: bur, common, lanceleaf, western; Redstem filaree; Rough cinquefoil; Scarlet pimpernel; Shepardspurse; Smartweed: ladythumb, pale, Pennsylvania; Smooth chaff-flower; Smoothdock; Sorrel, red (sheep); Sowthistle: annual, spiny, Spanish needles; Speedwell: bi-lobed, common, corn, ivyleaf, persian, purslane, slender, snow, thymeleaf; Spiny amaranth; Spurge: spotted, prostrate; Spurweed; Star of Bethlehem; Strawberry, India mock; Tansy ragwort; Tanweed; Thistle: blessed, bull, canada, floodman (prairie), musk, plate, plumeless, russian, scotch, wavyleaf, yellow (horrible); Trailing crownvetch; Velvetleaf; Vervain: blue, hoary, prostrate, tall; Vetch: bird, hairy, milk, narrowleaf, wild; Virginia creeper; Western clematis; Western salsify; Wild aster; Wild buckwheat; Wild carrot; Wild four-o'clock; Wild garlic; Wild lettuce; Wild marigold; Wild mustard (yellow rocket); Wild onion; Wild parsnip; Wild radish; Wild rape; Wild strawberry; Wild sweet potato; Wild violet; Woodsorrel: creeping, violet, yellow (Oxalis); Woolly croton; Wormseed; Yarrow: common, western, yellow.

# 28-0-3

## GUARANTEED ANALYSIS

<b>Total Nitrogen (N)</b> .....	28%
1.5% Ammoniacal Nitrogen	
2.1% Water Insoluble Nitrogen*	
20.6% Urea Nitrogen	
3.8% Other Water Soluble Nitrogen*	
<b>Soluble Potash (K<sub>2</sub>O)</b> .....	3%
<b>Sulfur (S)</b> .....	2.6%
2.6% Combined Sulfur (S)	
Derived From: Ammonium Sulfate, Methylene Ureas, Urea, Sulfate of Potash.	
<b>Chlorine (Cl) not more than</b> .....	2%
* 5.9% Slowly Available Nitrogen from Methylene Ureas.	
	<b>F699</b>

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at:  
<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

#### WARRANTY

**NOTE:** To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

#### MONEY BACK GUARANTEE

The Home Depot guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed. If you are not satisfied, return to a Home Depot store with proof of purchase for a replacement product or full refund of the purchase price. Or you can mail proof of purchase to the address listed below for a full refund:  
Lebanon Seaboard Corporation, 1600 E. Cumberland Street, Lebanon, PA 17042.

#### STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

**Pesticide Storage:** Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals.

**Pesticide Disposal and Container Handling:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

**If empty:** Place in trash or offer for recycling if available.

**If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

#### SPREADER SETTINGS:

Setting 2.8 Lbs / 1,000 Sq. Ft.

VIGORO® BROADCAST/ROTARY SPREADERS	
VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000	3
SCOTT'S® BROADCAST/ROTARY SPREADERS	
SCOTT'S BASIC™, STANDARD™, DELUXE™ EDGE GUARD®, LAWN PRO, SPEEDYGREEN™	
SCOTT'S TURF BUILDER® EDGE GUARD® DLX OR MINI	4
VIGORO WEED & FEED READY2GO SPREADER	
SEE ORIGINAL SPREADER LABEL FOR INSTRUCTIONS	

## SPANISH BOOKLET

#### MANUFACTURED BY:

Lebanon Seaboard Corporation  
1600 East Cumberland Street,  
Lebanon, PA 17042  
Made in the U.S.A.  
[www.homedepotgardenclub.com](http://www.homedepotgardenclub.com)  
Questions or Comments?  
Call 1-800-233-1067

EPA Reg. No. 961-415

(L) (D)

EPA Est. No. 961-PA-01, 961-IL-01

Superscript used is first letter of lot number.



**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN (cont.)**

**CONSEJO:** NO REGAR inmediatamente después de su aplicación ya que es necesario que los gránulos se adhieran a la hoja de la maleza durante 1 a 2 días para mayor efectividad.

- Aplicalo cuando las malezas son jóvenes y están en crecimiento activo.
- Evita su aplicación cuando las temperaturas están consistentemente por encima de los 90°F.
- Si no ha llovido en un período de 1 a 2 días después de la aplicación, debe regarse el césped por completo.

**EL HERBICIDA Y FERTILIZANTE VIGORO MATA MÁS DE 250 MALEZAS!**

Amaranto: púrpura, delgado; áster: brezo, brezo blanco, púrpura, white prairie; alcaucil: roripga austriaca; Galium: amor de hortelano, suave, del Norte, bledo; hierba amarga, peluda; estáquida de Florida; correhuela: veza de pájaro, setos; hierba amarga peluda; hierba amarga, peluda; Rudbeckia; mostaza negra; Júpulina; bendito flor de sangre; lechuga azul; cotula; Bristly oxtongue; llantén escobilla; cholla espinosa; solano de carolina; trébol de carretilla; bardana; cadillo, césped (rabizón); botón de oro; bulbosa, progresivo; hierba de botón: común (poorjoe), virginia; geranio de carolina (silvestre); culantrillo; hierba galera; hierba del halcón, manchada (diente de león falso); flor de hoja; pamplina: común, cerastio, pegajosa; achicoria; zincoenrama; trébol; carmesí, de una sola hoja, dorado, pata de conejo, rojo, fresca, amarillo, blanco; cizaña; cardo ajonjivero: oriental, espinoso; hierba de la moneda; esparcilla; trébol español de Kaimi; siempreviva; pincel del amor; romaza; margarita: inglesa, ojo de buey; diente de león: común, falso; flor de día asiática; lamio púrpura; dichondra; acedera: de hoja ancha, enrulada; apocino; manzanilla loca; acaricoba; yerba del pescador; saúco; camelina; girasol falso; ortiguilla; allierillos: de cabo rojo, de cabo blanco; asterácea: margarita (anual), silvestre; albahaca silvestre: peluda, gloria de la mañana; vara de oro; hierba rastrea; sereno común; grindelia; rama negra; hierba del carpintero: meadow, oreja de ratón, naranja, amarilla;

consuelida; Heartleaf drymary; cañamo; ortiga muerta; mastruerzo oriental; solano americano; guisazo de caballo; higuera loca; pensamiento salvaje; esderanto; lengua de pájaro, postrada; pinillo; cenizo; trébol de los prados; malva: alkali, punttaguda, común, enana, de Venecia; marcela; lippia; caperonia; Moneywort; Dondiego de dia; raíz grande, hoja de hiedra, mexicana, roja, alta, wolly; artemisa pegajosa; mostaza: redonda, negra, azul, seto, India, tansy, volteada, blanca, wormseed; ortiga: pinchuda (ardiente), alta, wood; Chirivía; cavelito antártico; Mostacilla; Bledo; gallo del bosque: perenne, de Virginia (Peppergrass); amaranto: postrada, de raíz roja, ruso, suave, volteado; amagarza; bella Diana; Llantén: de semilla negra, grande, de hoja ancha, siete venas, mediano, de hoja angosta, delgada, peludo; hiedra venenosa; árbol de las pulgas; hierba carmín; girasol silvestre; escarola; afata hembra; sanguinaria postrada; rosela francesa; ambrosia; común; verdolaga: de Brasil, de la Florida, de flor grande; ambrosia: bur, común, de espiga, occidental; aguja de pastor; de concho hojas, pimpinela escarlata; bolsa de pastor; hierba de Santa María: cresta de gallo, pálida, de Pennsylvania; Smooth chaff-flower; romaza suave; sorrel, rojo; cerraja: anual, espinosa; verónica: bidente, común, borroncillo, hoja de hiedra, persa, americana, delgada, nieve, ontineta; bledo espinoso; hierba de las golondrinas: manchada, postrada; hierba de pollo; estrella de Belén; fresca de la India; hierba de Santiago; polígono anfibio; cardo: bendito, cardillo, triquero, silvestre, púrpura, crema, plumless, ruso, escocés, ondulado, amarillo horrible; coronilla rosa; malva amarilla; verben: azul, hoary, postrada, alta; vezo: arveja silvestre, peluda, milk, de hoja angosta, silvestre; enredadera de Virginia; demáside; demalis occidental; áster silvestre; Enredadera silvestre; zanahoria silvestre; Dondiego silvestre; ajo del oso; lechuga silvestre; chinchilla; cosaza silvestre (yellow rocket); cebolla silvestre; chirivía silvestre; rabaniza; fresca silvestre; camote silvestre; violeta silvestre; acedera menor: trepadora, violeta, amarilla; hierba de cabra; wormseed; milenrama: corriente, occidental, amarilla.

**GARANTÍA**

NOTA: Hasta el grado que sea posible de acuerdo con la ley correspondiente. El comprador asume toda la responsabilidad en cuanto a la seguridad y rendimiento si este producto no se usa según las indicaciones.

**GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO**

The Home Depot garantiza que estará satisfecho con el funcionamiento de este producto cuando se utilice según las instrucciones. Si no está satisfecho, devuélvalo a una tienda de The Home Depot con el comprobante de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso completo del precio de compra. O puedes enviar por correo el comprobante de compra a la dirección que aparece a continuación para obtener un reembolso completo: Lebanon Seaboard Corporation, 1600 E. Cumberland Street, Lebanon, PA 17042.

**ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN**

No contamines el agua, la comida o los alimentos para animales al almacenar o desechar. **Almacenaje de pesticidas:** Almacena el producto en su envase original en un lugar fresco, seguro y fuera del alcance de los niños y animales. **Eliminación del pesticida y manejo del envase:** Envase no rellenable. No vuelvas a usar o rellenar este envase. **Envase vacío:** Deséchalo en la basura o reciclado si es posible. **Si sobra contenido después del uso:** Llame a la agencia local de manejo de desechos sólidos para conocer las instrucciones de desecho. Nunca botes el producto sobrante por ningún drenaje en interiores o exteriores.

**CONFIGURACIÓN DEL ESPARCIDOR:** Configuración 1.27 kg / 92.9 m<sup>2</sup>

ESPARCIDORES DE SIEMBRA A VOLEO/GIRATORIOS VIGORO®	
VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000	3
ESPARCIDORES DE SIEMBRA A VOLEO/GIRATORIOS SCOTTS®	
SCOTTS BASIC™, STANDARD™, DELUXE™ EDGEGUARD™, LAWN PRO, SPEEDYGREEN™	
SCOTTS TURF BUILDER™ EDGEGUARD™ DLX OR MINI	4
ESPARCIDOR READY2GO PARA HERBICIDA Y FERTILIZANTE VIGORO	
CONSULTA LA ETIQUETA DEL ESPARCIDOR ORIGINAL PARA INSTRUCCIONES	

**¡ALTO! PRIMERO LEE LA ETIQUETA POR COMPLETO. SIGUE TODAS LAS PRECAUCIONES Y CUMPLE LAS INDICACIONES CUIDADOSAMENTE.**

**PRECAUCIONES ADICIONALES**

**RIESGO PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

**PRECAUCIÓN**

Causa irritación moderada en los ojos. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávate bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño.

**FABRICADO POR:** Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042

Hecho en EE.UU. [www.homedepotgardencub.com](http://www.homedepotgardencub.com)

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-233-1067.

Vigoro® es una marca registrada de The Home Depot.

<b>Nitrógeno total (N)</b> .....	28%
1.5% nitrógeno amoniacal	
2.1% nitrógeno no soluble en agua*	
20.6% nitrógeno ureico	
3.8% otro nitrógeno soluble en agua*	
<b>Potasa soluble (K<sub>2</sub>O)</b> .....	3%
<b>Sulfuro (S)</b> .....	2.6%
2.6% sulfuro combinado (S)	
Derivados de: Sulfato de amonio, urea metileno, urea, sulfato de potasa.	
<b>Cloro (Cl) no más de</b> .....	2%
* 5.9% nitrógeno de disposición lenta de urea metileno.	
<b>F699</b>	

La información relacionada con los contenidos y niveles de metales de este producto está disponible en Internet en <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

EPA Reg. No. 961-415 (L) (D) EPA Est. No. 961-PA-01, 961-IL-01 El superíndice usado es la primera letra del número de lote

REVISA EL FOLLETO INTERNO PARA LAS INSTRUCCIONES DE USO

LEVANTALO AQUÍ PARA ABRIRLO PRESIONALO PARA VOLVER A CERRARLO

**8 PAGE BOOK**

**PRIMEROS AUXILIOS**

Si cayera en los ojos:

- Mantén los ojos abiertos y enjuaga con agua lentamente y con cuidado de 15 a 20 minutos.
- Quítate los lentes de contacto, si los usas, después de los primeros 5 minutos, luego continúa enjuagando los ojos.
- Llama al centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Ten en la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llames al centro de control de envenenamiento, médico o cuando vayas a buscar tratamiento. Para obtener información de tratamiento médico de emergencia, llame al (888) 208-1368.

**RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE**

Este producto es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede afectar de manera adversa a las plantas que no sean el objetivo. Para proteger el medio ambiente, no permitas que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, desagües o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento ni pronóstico de lluvias para las siguientes 24 horas. Esto asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o quiten el pesticida del área de tratamiento. Barrer el exceso de producto de la entrada de autos, acera o la calle posterior a la zona tratada del césped ya que ayudará a evitar que se filtre a los cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

Este producto químico tiene propiedades y características relacionadas con sustancias químicas detectadas en aguas subterráneas. El uso de este producto químico en áreas de suelos permeables, particularmente donde la capa freática es poco profunda, puede ocasionar la contaminación de las aguas subterráneas. La aplicación alrededor de una cisterna o pozo puede ocasionar la contaminación del agua potable o subterránea.

**INSTRUCCIONES DE USO**

El uso de este producto para propósitos diferentes a los descritos en la etiqueta, constituye una violación las leyes federales.

- No aplique este producto de modo que entre en contacto con alguna persona o mascota, ya sea directamente o llevado por el viento.
- Este producto es para uso residencial.
- No dejes que las personas (sólo la que lo aplica) o mascotas se encuentren en la zona de tratamiento durante la aplicación. No ingreses en la zona de tratamiento hasta que se hayan asentado las partículas de polvo.

**INSTRUCCIONES**

El herbicida y fertilizante Vigoro contiene herbicida Trimec®. Trimec® controla una amplia variedad de malezas, incluyendo el diente de león, pamplina, llantén, ortiga mansa, euforbio y muchas otras malezas reconocidas que se encuentran comúnmente en el césped de su hogar. Además, un fertilizante 28-0-3 proporciona un suministro de nutrientes para el césped. Es posible que sea necesario repetir el tratamiento si (a) el césped está superpoblado de malezas o, (b) si prevalecen las condiciones adversas de poca humedad y las malezas se encuentran en un estado de crecimiento pobre. Puede realizarse una segunda aplicación después de 30 días. Se pueden sembrar las áreas tratadas 3 semanas después de la aplicación.

**PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO**

- No lo uses en dichondra, pasto alfombra, en la variedad Floratam del césped de San Agustín de la Florida, agrostide progresivo, o en céspedes donde haya tréboles deseables.

- No lo apliques en el césped recién sembrado hasta que esté bien establecido o hasta después de que se haya cortado por segunda o tercera vez.
- No apliques este producto en flores, vegetales, cubresuelos, jardines o en plantas para jardín incluyendo arbustos y árboles. No excedas las dosis especificadas para cada área y no apliques este producto en las franjas de goteo de o sobre las raíces superficiales de árboles, arbustos y otras plantas ornamentales.
- Se puede volver a sembrar o sembrar sobre césped existente después de las tres (3) semanas de la aplicación de este producto.
- No apliques este producto en o cerca de plantas ornamentales y evita esparcir los gránulos en los sistemas de raíces expuestas o brotes adventicios (rizomas) dentro de la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos ornamentales, ya que puede causarles daño.
- No lo apliques directamente en o cerca de agua, drenajes pluviales, alcantarillas, desagües o zanjas de drenaje. No lo apliques a una distancia menor de 7.6 m de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo apliques cuando haya viento. Aplica este producto directamente en el césped, y barre cualquier exceso que haya caído en la entrada para autos, acera, drenajes pluviales o en la calle posterior a la zona tratada. Para evitar que el producto quede inactivo, no eches demasiada agua en la(s) zona(s) tratada(s) hasta el punto de provocar que sea eliminado, ni lo apliques cuando llueva o si se espera lluvia.

**QUÉ CANTIDAD APLICAR**

Para usar en: Pasto azul de Kentucky, festuca, raigrás perenne, pasto de bermuda común, pasto de bahía, zoysia, césped de San Agustín, cienpiés, pasto de bermuda híbrido, y agrostide colonial: Aplica 1.27 kg de producto por 92.90 m<sup>2</sup> de césped. Puede realizarse una segunda aplicación después de 30 días. La cantidad máxima de aplicaciones al voleo por lugar de tratamiento es dos por año.

**DECLARACIÓN DE ÍNDICE DE USO MÁXIMO**

No apliques más de 1.27 kg de producto por 92.9 m<sup>2</sup> de césped por aplicación. Si fuera necesario, puede realizarse una segunda aplicación luego de 30 días de realizada la primera. No apliques más de 2.54 kg de producto por 92.9 m<sup>2</sup> por año.

La tasa de aplicación máxima por dispersión al césped por acre es 1.28 lb 2,4-D de ácido equivalente, 0.29 lb MCPP-p de ácido equivalente y 0.12 3,6-dicloro-0-anísico de ácido equivalente por acre por aplicación. La tasa de aplicación máxima por temporada es 2.56 lb 2,4-D de ácido equivalente, 0.58 lb MCPP-p de ácido equivalente y 0.25 3,6-dicloro-0-anísico de ácido equivalente por acre.

**CUÁNDO DEBE APLICARSE**

- Aplica cuando las malezas de hoja ancha están en crecimiento activo en primavera o principios del otoño.
- Aplica cuando no hay viento para asegurar una cobertura uniforme y evitar que los gránulos se esparzan sobre flores, vegetales y arbustos ornamentales.

**INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

- Corta el césped a una altura normal, 1 o 2 días antes de la aplicación.
- Para obtener mejores resultados el césped debe estar HÚMEDO y no debe haber viento durante la aplicación del producto. Cuando el césped está húmedo, los gránulos del producto se adhieren mejor a las hojas de las malezas, lo que asegura que los ingredientes mata malezas son absorbidos por ellas.

**CONSEJO:** Aplica después de un rocío o lluvia fuerte, o en un césped que ha sido completamente regado.

**CONSEJO:** NO APLICAR en césped húmedo SI se espera lluvia dentro de las 24 horas de la aplicación.