

1000 023 411

**Ready2Go**  
SPREADER

Beautiful Lawns Since 1924  
**Vigoro**  
**Weed & Feed**

Herbicida y fertilizante

**Kills Over 250 Weed Types as Listed**  
Mata más de 250 variedades de malezas según se detalla

**Includes 4 AA Batteries**  
Incluye 4 baterías AA  
[www.vigoro.com](http://www.vigoro.com)



TE GARANTIZAMOS QUE CRECE  
O TE DEVOLVEMOS EL DINERO

**Kills down to the root**  
Mata desde la raíz

**Greens lawns in 72 hours & promotes thick, green growth**  
Deja el césped verde en 72 horas y promueve el crecimiento vivo y abundante

**Contains time-released nitrogen for extended feeding**  
Contiene nitrógeno de liberación gradual para nutrir por tiempo prolongado



**GARDEN CLUB**

**MEMBERSHIP IS FREE! LA MEMBRÍA ES GRATIS!**  
[www.homedepotgardenclub.com](http://www.homedepotgardenclub.com)

Net Wt / Peso Neto  
7 lbs (3.17 kg)

ACTIVE INGREDIENTS:	
2,4-D, 2-ethylhexyl ester	1.108%
Mesopropyl acid	0.182%
Dicamba acid	0.371%
OTHER INGREDIENTS:	98.34%
TOTAL	100.000%

THIS PRODUCT CONTAINS:	
14.70 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton or 0.735%	CAS 1928-43-4
3.34 lb (+)-[1S]-2-[2-methyl-4-chlorophenoxy] propionic acid equivalent per ton or 0.167%	CAS 16494-77-8
1.42 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton or 0.071%	CAS 1918-50-9
Insectar Specific by AOPAC Methods	
TRIMEZ is a registered trademark of P&H Gordon Corporation.	

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**CAUTION**

See container label for First Aid and additional Precautionary Statements.

**MANTENER FUERJA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**PRECAUCIÓN**

Lee la etiqueta del envase para indicaciones de primeros auxilios y precauciones adicionales.

**28-0-3**

1000 023 411

Ready2Go  
SPREADER

Beautiful Lawns Since 1934  
**Vigoro**  
Weed & Feed  
Herbicida y Fertilizante

SEE INSIDE BOOKLET FOR COMPLETE DIRECTIONS FOR USE REVERSA EL FOLLETO INTERNO PARA LAS INSTRUCCIONES DE USO

STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

PRECAUTIONARY STATEMENTS  
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS  
CAUTION

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

FIRST AID

- If in eyes:
- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes.
  - Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
  - Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For Emergency Medical Treatment Information call (888) 208-1368.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

GUARANTEED ANALYSIS  
**28-0-3**

Total Nitrogen (N) .....	28%
1.5% Ammoniacal Nitrogen	
2.1% Water Insoluble Nitrogen*	
20.6% Urea Nitrogen	
3.8% Other Water Soluble Nitrogen*	
Soluble Potash (K <sub>2</sub> O) .....	3%
Sulfur (S) .....	2.6%
2.6% Combined Sulfur (S)	
Derived From: Ammonium Sulfate, Methylene Ureas, Urea, Sulfate of Potash.	
Chlorine (Cl) not more than .....	2%
* 5.9% Slowly Available Nitrogen from Methylene Ureas.	F699

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at: <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

MANUFACTURED BY:  
LEBANON SEABOARD CORPORATION  
1600 EAST CUMBERLAND STREET  
LEBANON, PA 17042

41-45942

Questions or Comments? Call 1-800-233-1067.


EPA Reg. No. 961-415

MADE IN THE U.S.A. OF U.S.  
AND IMPORTED PARTS

Vigoro® is a registered trademark of Home Depot.

Ready2Go SPREADER and design  
is a trademark of Lebanon  
Seaboard Corporation.

(L) (D)  
EPA Est. No. 961-PA-01, 961 -L-01  
Superscript used is first letter of lot number.



LIFT HERE TO OPEN LEVANTALO AQUÍ PARA ABRIRLO PRESS TO RESEAL PRESIONADO PARA VOLVER A CERRARLO

41-45942



**STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

**PRECAUTIONARY STATEMENTS  
HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

**CAUTION**

Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

**DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet either directly or through drift.
- This product is for residential use.
- Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during treatment. Do not enter treatment area until dust has settled.

**REFILL INSTRUCTIONS**

- This container with Ready2Go Spreader™ is reusable with this product.
- Refill the container with desired amount of this product and use as directed.
- When done, store or dispose of this container as listed on the label.

**STORAGE AND DISPOSAL**

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

**Pesticide Storage:** Store product in its original container in a cool dry, locked place out of the reach of children and animals.

**Pesticide Disposal and Container Handling:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described in the DIRECTIONS FOR USE (see Refill Instructions).

**If Empty:** Place in trash or offer for recycling if available.

**If Partly Filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**GUARANTEED ANALYSIS**  
**28-0-3**

<b>Total Nitrogen (N)</b> .....	<b>28%</b>
1.5% Ammoniacal Nitrogen	
2.1% Water Insoluble Nitrogen*	
20.6% Urea Nitrogen	
3.8% Other Water Soluble Nitrogen*	
<b>Soluble Potash (K<sub>2</sub>O)</b> .....	<b>3%</b>
<b>Sulfur (S)</b> .....	<b>2.6%</b>
2.6% Combined Sulfur (S)	
Derived From: Ammonium Sulfate, Methylene Ureas, Urea, Sulfate of Potash.	
<b>Chlorine (Cl) not more than</b> .....	<b>2%</b>
* 5.9% Slowly Available Nitrogen from Methylene Ureas.	
	<b>F699</b>

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at: <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

**MANUFACTURED BY:**  
LEBANON SEABOARD CORPORATION  
1600 EAST CUMBERLAND STREET  
LEBANON, PA 17042

**41-45942**

Questions or Comments? Call 1-800-233-1067.

EPA Reg. No. 961-415

**MADE IN THE U.S.A. OF U.S.  
AND IMPORTED PARTS**

[WWW.HOMEDEPOTGARDENCLUB.COM](http://WWW.HOMEDEPOTGARDENCLUB.COM)

(L) (D)

EPA Est. No. 961-PA-01, 961-IL-01

Vigoro® is a registered trademark of Home Depot.

Superscript used is first letter of lot number.



## VIGORO® WEED & FEED

### KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

See Container label for First Aid and additional Precautionary Statements

ACTIVE INGREDIENTS:	
2,4-D, 2-ethylhexyl ester	1.108%
Mecoprop-p acid	0.167%
Dicamba acid	0.071%
OTHER INGREDIENTS:	98.654%
<b>TOTAL</b>	<b>100.000%</b>

### USE PRECAUTIONS

- Do not use on dichondra, carpetgrass, "Floratan" St. Augustinegrass, creeping bentgrass, or turfgrass where desirable clovers are present.
- Do not apply this product to newly seeded grasses until well-established or after the second or third mowing.
- Do not use this product on flowers, vegetables, groundcovers, gardens or landscape plantings including shrubs and trees. Do not exceed specified dosage for any area and do not apply this product within the dripline of or over surface roots of trees, shrubs, and other ornamentals.
- Reseeding or overseeding areas may occur three (3) weeks after the application of this product.
- Do not use this product on or near desirable plants and avoid spreading granules onto exposed root systems or adventitious shoots (rhizomes) within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

### HOW MUCH TO APPLY

For use on: Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, common bermudagrass, bahiagrass, zoysiagrass, St. Augustinegrass, centipedegrass, hybrid bermudagrass, and colonial bentgrass: Apply 2.8 pounds of product per 1,000 square feet of turfgrass. A second application may be made after 30 days. The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

### MAXIMUM USE RATE STATEMENT

Do not apply more than 2.8 pounds of product per 1000 square feet of turfgrass per application. If necessary, a second application may be made no sooner than 30 days after the first. Do not apply more than 5.6 pounds of product per 1000 square feet per year.

### WHEN TO APPLY

- Apply when listed broadleaf weeds are actively growing in spring or early fall.
- Apply when the air is calm to ensure uniform coverage and avoid spreading granules onto flowers, vegetables, and ornamental shrubbery.

### APPLICATION INSTRUCTIONS


- Mow lawn to normal height, 1 to 2 days before application.
- For best results lawn must be MOIST and the air calm, when product is applied. When the lawn is moist, the product granules stick better to the leafy parts of the weeds, ensuring that the weed-killing ingredients are absorbed by the weed plant. TIP: Apply after a heavy dew or rain, or on a thoroughly watered lawn. TIP: DO NOT apply to a moist lawn if rain is expected within 24 hours of application. TIP: DO NOT water in immediately after application as the granules need to stick to the weed plant leaf for 1-2 days to be most effective.
- Apply when weeds are young and actively growing.
- Avoid applying when temperatures are consistently above 90°F.
- After a 1-2 day period after application, if it has not rained – the lawn should be thoroughly watered.

Use protective eyewear when using battery powered spreader.


## READY2GO SPREADER™ DIRECTIONS: FIRST TIME USE




PLACE the Ready2Go Spreader™ UPSIDE DOWN on a flat surface (the GREEN BASE facing up).



HOLD the container steady and TURN the base COUNTER-CLOCKWISE to left, approximately quarter turn, until it STOPS and LIFT to remove.



REMOVE the protective seal from the round opening, and PULL the tab from the battery compartment.




REALIGN the protruding tabs on the base with the slots on the container and TURN CLOCKWISE to right until the base LOCKS back in its original position.



FLIP the Ready2Go Spreader™ back to the UPRIGHT position. The Ready2Go Spreader™ is now ready to use.


## TO REFILL YOUR READY2GO SPREADER™ CONTAINER




- PLACE the Ready2Go Spreader™ UPSIDE DOWN on a flat surface the GREEN BASE facing up.
- HOLD the container steady while TURNING the base COUNTER-CLOCKWISE until it STOPS and LIFT to remove.
- CUT a corner opening on the Vigoro Weed & Feed refill bag, and pour into the Ready2Go Spreader™ until the container is FULL.
- Replace the spreader unit base. Align tabs and slots and twist clockwise into place.
- FLIP the Ready2Go Spreader™ to the UPRIGHT position. The Ready2Go Spreader™ is now ready to operate. Follow application instructions.




## DIRECTIONS FOR APPLYING THE PRODUCT TO YOUR LAWN



Move to the lawn area to be treated. POSITION the Ready2Go Spreader™ comfortably at your side (arm fully extended), over the target area, and TURN ON by pulling back the on/off slide switch.



When product begins spreading, WALK over the application area at a NORMAL WALKING PACE. (6 seconds for a 25' strip, or 12 seconds for a 50' strip). CONTINUE to within 2' of the end of the application area, and begin a new row by taking 2 STEPS TO THE RIGHT OR LEFT, and walk back parallel to your first row. There should be a SLIGHT OVERLAP to the spread radius. CONTINUE in this manner until you have finished applying the product.



TURN OFF the Ready2Go Spreader™ by PUSHING IN the slide switch.

If product remains, store in a cool, dry place. If empty and lawn application is finished, simply refill the container.

## INSTRUCTIONS

Vigoro Weed & Feed contains Trimec® Herbicide. Trimec® controls a wide range of lawn weeds, including dandelion, chickweed, plantain, henbit, spurge and many other listed weeds commonly found in home lawns. In addition, a 28-0-3 fertilizer provides a supply of lawn food. Possible retreatment may be necessary if (a) the lawn is heavily overrun by weeds or, (b) if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made after 30 days. Treated areas may be seeded 3 weeks after application.

## VIGORO WEED & FEED KILLS MORE THAN 250 WEEDS!

Amaranth; purple, slender; Aster; heath, white heath, purple, white prairie; Artichoke; Austrian fieldcress; Bedstraw; Catchweed, smooth, Northern, pinewoods; Beggar-ticks, hairy; Betony, Florida; Bindweed; Field Hedge; Bitter Wintercress; Bittercress, hairy; Bitterweed; Black-eyed Susan; Black Medic; Blood flower milkweed; Blue lettuce; Brassbuttons; Bristly oxlongue; Broomweed; Buckhorn; Bullnettle; Burdock; Burdock; Burweed, lawn (spurweed); Buttercup; bulbous, creeping; Buttonweed; common (poorjoe), Virginia; Carolina geranium (wild); Carpetweed; Catnip; Catsear, spotted (false dandelion); Chamber bitter; Chickweed; common, mouseear, sticky; Chicory; Cinquefoil; Clover; crimson, alyce, hop, rabbit foot, red, strawberry, yellow sweet, white sweet, white; Cockle; Cocklebur; oriental, spiny; Common mullain; Corn Spurry; Creeping Beggarweed; Creeping Jenny (creeping charlie); Cupid shaving Brush; Cudweed; Daisy; English, oxeye; Dandelion; common, false; Day flower; Deadnettle; Dichondra; Dock; broadleaf, curly; Dogbane; Dogfennel; Dollarweed (Pennywort); Dove weed; Elderberry; Falsetax; False sunflower; Fiddleneck; Filaree; redstem, whitestem; Fleabane; daisy (annual), rough; Galinsoga; hairy, smallflower; Goldenrod; Ground Ivy; Groundsel; Gumweed; Hairy fleabane; Hawkweed; meadow, mouseear, orange, yellow; Healall; Heartleaf drymary; Hemp; Henbit; Hoary cress; Horsesnail; Horseweed; Jimsonweed; Johnny-Jumpup violet; Knawel; Knotweed, prostrate; Kochia; Lambsquarters; Lespedeza; Mallow; alkali, bristly, common, dwarf, Venice; Marock; Matchweed; Mexicanweed; Moneywort; Morningglory; bigroot, ivyleaf, mexican, red, tall, woolly; Mugwort; Mustard; ball, black, blue, hedge, Indian, tansy, tumble, white, wormseed; Nettle; stinging (burning), tall, wood; Parsley-piert; Parsnip; Pearlwort; Pennycress (frenchweed); Pepperweed; perennial, Virginia (Peppergrass); Pigweed; prostrate, redroot, russian, smooth, tumble; Pineapple weed; Plains coreopsis (tickseed); Plantain; blackseed, bracted, broadleaf,

buckhorn, hoary, narrowleaf, slender, woolly; Poison ivy; Poison oak; Pokeweed; Prairie Sunflower; Prickly lettuce (compass plant); Prickly sida; Prostrate knotweed; Puncturevine; Purslane, common; Pusley; brazil, florida, large flower; Ragweed; bur, common, lanceleaf, western; Redstem filaree; Rough cinquefoil; Scarlet pimpernel; Shepards-purse; Smartweed; ladythumb, pale, Pennsylvania; Smooth chaff-flower; Smoothdock; Sorrel, red (sheep); Sowthistle; annual, spiny; Spanish needles; Speedwell; bi-lobed, common, corn, ivyleaf, perisian, purslane, slender, snow, thymeleaf; Spurge; spotted, prostrate; Spurweed; Star of Bethlehem; Strawberry, India mock; Tansy ragwort; Tamweed; Thistle; blessed, bull, canada, flodman (prairie), musk, platts, plumelless, russian, scotch, wartyleaf, yellow (horrible); Trailing crownvetch; Velvetleaf; Vervain; blue, hoary, prostrate, tall; Vetch; bird, hairy, milk, narrowleaf, wild; Virginia creeper; Western clematis; Western salicy; Wild aster; Wild buckwheat; Wild carrot; Wild four-o'clock; Wild garlic; Wild lettuce; Wild marigold; Wild mustard (yellow rocket); Wild onion; Wild parsnip; Wild radish; Wild rape; Wild strawberry; Wild sweet potato; Wild violet; Woodsorrel; creeping, violet, yellow (oxalis); Woolly croton; Wormseed; Yarrow; common, western, yellow.

## TO REPLACE BATTERIES

- Access the battery compartment on the inside of the spreader base.
- Battery compartment door opens by pinching tab and lifting to open.

Requires 4 AA batteries (included).

Batteries included, but disabled for shipment. Pull tab from battery compartment to activate.

## WARRANTY

NOTE: To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

## MONEY BACK GUARANTEE

The Home Depot guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed. If you are not satisfied, return to a Home Depot store with proof of purchase for a replacement product or full refund of the purchase price. Or you can mail proof of purchase to the address listed below for a full refund:

Lebanon Seashore Corporation, 1600 E. Cumberland Street, Lehanon, PA 17042.

**¡ALTO! PRIMERO LEE LA ETIQUETA POR COMPLETO. SIGUE TODAS LAS PRECAUCIONES Y CUMPLE LAS INDICACIONES CUIDADOSAMENTE.**

**PRECAUCIONES ADICIONALES: RIESGO PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

Causa irritación moderada en los ojos. Evitar el contacto con los ojos o la ropa. Lávate bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

**INSTRUCCIONES DE USO**

El uso de este producto para propósitos diferentes a los descritos en la etiqueta, constituye una violación las leyes federales.

- No aplique este producto de modo que entre en contacto con alguna persona o mascota, ya sea directamente o llevado por el viento.
- Este producto es para uso residencial.
- No dejes que las personas (sólo la que lo aplica) o mascotas se encuentren en la zona de tratamiento durante la aplicación. No ingreses en la zona de tratamiento hasta que se hayan asentado las partículas de polvo.

**INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL ENVASE**

- Este envase con Ready2Go Spreader™ es reutilizable con este producto.
- Rellena el envase con la cantidad deseada de este producto y úsalo como se indica.
- Una vez que hayas terminado, guárdalo o deséchalo según se indica en la etiqueta.

**ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN**

No contamines el agua, la comida o los alimentos para animales al almacenar o desechar.

**Almacenaje de pesticidas:** Almacena el producto en su envase original en un lugar fresco, seguro y fuera del alcance de los niños y animales.

**Eliminación del pesticida y manejo del envase:** Envase no rellenable. No vuelvas a usar o rellenas este envase excepto que lo hagas según las INDICACIONES DE USO (ver instrucciones para rellenar el envase).

**Envase vacío:** Deséchalo en la basura o recíclalo si es posible.

**Si sobra contenido después del uso:** Llama a la agencia local de manejo de desechos sólidos para conocer las instrucciones de desecho. Nunca botes el producto sobrante por ningún drenaje en interiores o exteriores.

**ANÁLISIS GARANTIZADO**  
**28-0-3**

Nitrógeno total (N).....	28%
1.5% nitrógeno amoniacal	
2.1% nitrógeno no soluble en agua*	
20.6% nitrógeno ureico	
3.8% otro nitrógeno soluble en agua*	
Potasa soluble (K2O).....	3%
Sulfuro (S).....	2.6%
2.6% sulfuro combinado (S)	
Derivados de: Sulfato de amonio, urea metileno, urea, sulfato de potasa.	
Cloro (Cl) no más de .....	2%
* 5.9% nitrógeno de disposición lenta de urea metileno.	
	<b>F699</b>

La información relacionada con los contenidos y niveles de metales de este producto está disponible en Internet en <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

FABRICADO POR:  
LEBANON SEABOARD CORPORATION  
1600 EAST CUMBERLAND STREET  
LEBANON, PA 17042

**41-45942**


¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-233-1067. EPA Reg. No. 961-415

HECHO EN LOS EE.UU. CON PIEZAS NACIONALES E IMPORTADAS

[WWW.HOMEDEPOTGARDENCLUB.COM](http://WWW.HOMEDEPOTGARDENCLUB.COM)

(L) (D)  
EPA Est. No. 961-PA-01, 961-IL-01

Vigoro® es una marca registrada de The Home Depot. El superíndice usado es la primera letra del número de lote



## HERBICIDA Y FERTILIZANTE VIGORO®

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Lee la etiqueta del envase para indicaciones de primeros auxilios y precauciones adicionales.

<b>INGREDIENTES ACTIVOS:</b>	
2,4-D, éster 2-etilhexílico .....	1.108%
Ácido Mecoprop-p. ....	0.167%
Ácido 3,6-dicloro-O-anisico .....	0.071%
<b>OTROS INGREDIENTES:</b> .....	<b>98.654%</b>
<b>TOTAL</b> .....	<b>100.000%</b>

### PRECAUCIONES DE USO

- No lo uses en dichondra, pasto alfombra, en la variedad Floratam del césped de San Agustín de la Florida, agrostide progresivo, o en céspedes donde haya tréboles deseados.
- No lo apliques en el césped recién sembrado hasta que esté bien establecido o hasta después de que se haya cortado por segunda o tercera vez.
- No apliques este producto en flores, vegetales, cubresuelos, jardines o en plantas para jardín incluyendo arbustos y arboles. No excedas las dosis especificadas para cada área y no apliques este producto en las franjas de goteo o de sobre las raíces superficiales de árboles, arbustos y otras plantas ornamentales.
- Se puede volver a sembrar o sembrar sobre césped existente después de las tres (3) semanas de la aplicación de este producto.
- No apliques este producto en o cerca de plantas ornamentales y evita esparcir los gránulos en los sistemas de raíces expuestas o brotes adventicios (rizomas) dentro de la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos ornamentales, ya que puede causarles daño.
- No lo apliques directamente en o cerca de agua, drenajes pluviales, alcantarillas, desagües o zanjas de drenaje. No lo apliques a una distancia menor de 7.6 m de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo apliques cuando haya viento. Aplica este producto directamente en el césped, y barre cualquier exceso que haya caído en la entrada para autos, acera, drenajes pluviales o en la calle posterior a la zona tratada. Para evitar que el producto quede inactivo, no eches demasiada agua en la(s) zona(s) tratada(s) hasta el punto de provocar que sea eliminado, ni lo apliques cuando llueva o si se espera lluvia.

### QUÉ CANTIDAD APLICAR

Para usar en: Pasto azul de Kentucky, festuca, raigrás perenne, pasto de bermuda común, pasto de bahía, zoysia, césped de San Agustín, ciempiés, pasto de bermuda híbrido, y agrostide colonial: Aplica 1.27 kg de producto por 92.90 m<sup>2</sup> de césped. Puede realizarse una segunda aplicación después de 30 días. La cantidad máxima de aplicaciones al mismo lugar de tratamiento es dos por año.

### DECLARACION DE INDICE DE USO MAXIMO

No apliques más de 1.27 kg de producto por 92.90 m<sup>2</sup> de césped por aplicación. Si fuera necesario, puede realizarse una segunda aplicación luego de 30 días de realizarla la primera. No apliques más de 2.54 kg de producto por 92.90 m<sup>2</sup> por año.

### CUÁNDO DEBE APLICARSE

- Aplica cuando las malezas de hoja ancha están en crecimiento activo en primavera o principios del otoño.
- Aplica cuando no hay viento para asegurar una cobertura uniforme y evitar que los gránulos se esparzan sobre flores, vegetales y arbustos ornamentales.


### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Corta el césped a una altura normal, 1 o 2 días antes de la aplicación.
- Para obtener mejores resultados el césped debe estar húmedo y no debe haber viento durante la aplicación del producto. Cuando el césped está húmedo, los gránulos del producto se adhieren mejor a las hojas de las malezas, lo que asegura que los ingredientes mata malezas son absorbidos por ellas.  
CONSEJO: Aplica después de un rocío o lluvia fuerte, o en un césped que ha sido completamente regado.  
CONSEJO: NO APLICAR en césped húmedo si se espera lluvia dentro de las 24 horas de la aplicación.
- CONSEJO: NO REGAR inmediatamente después de su aplicación ya que es necesario que los gránulos se adhieran a la hoja de la maleza durante 1 a 2 días para mayor efectividad.
- Evita su aplicación cuando las malezas son jóvenes y están en crecimiento activo.
- Evita su aplicación cuando las temperaturas están consistentemente por encima de los 90°F.
- Si no ha llovido en un período de 1 a 2 días después de la aplicación, debe regarse el césped por completo.


## INSTRUCCIONES DEL READY2GO SPREADER™: LA PRIMERA VEZ QUE LO USES




COLOCA el Ready2Go Spreader™ BOCA ABAJO en una superficie plana (la BASE VERDE hacia arriba).



SOSTÉN firmemente el envase y GIRA la base EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ hacia la izquierda, aproximadamente un cuarto de giro, hasta que SE DETENGA y LEVANTALO para retirar.



QUITA el sello protector de la abertura redonda y HALA de la pestaña del compartimiento de la batería.




VUELVE A ALINEAR las pestañas salientes en la base con las ranuras del envase y GIRA EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ a la derecha hasta que la base SE TRADE nuevamente en su posición original.



COLOCA nuevamente el Ready2Go Spreader™ en posición VERTICAL. El Ready2Go Spreader™ ya está listo para usar.


## PARA RELLENAR EL ENVASE DEL READY2GO SPREADER™




- COLOCA el Ready2Go Spreader™ BOCA ABAJO en una superficie plana (la BASE VERDE hacia arriba).
- SOSTÉN firmemente el envase y GIRA la base en SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ hasta que SE DETENGA y LEVANTALO para retirar.
- CORTA una abertura en una esquina de la bolsa del repuesto del Herbicida y Fertilizante Vigoro y viértelo en el Ready2Go Spreader™ hasta que se LLENE el envase.
- Reemplaza la base del esparcidor. Alinea las pestañas y ranuras y colócalo en posición girando en el sentido de las manecillas del reloj.
- COLOCA el Ready2Go Spreader™ en posición VERTICAL. El Ready2Go Spreader™ ya está listo para usar. Sigue las Instrucciones de aplicación.




## INDICACIONES PARA APLICAR EL PRODUCTO EN EL CÉSPED



Dirígete a la zona del césped que deseas tratar. **COLOCA** el Ready2Go Spreader™ cómodamente (con el brazo totalmente extendido), sobre la zona a tratar, y **ÁBRELO** halando hacia atrás el interruptor deslizante on/off.



Cuando comiences a esparcir el producto, **CAMINA** por la zona de aplicación a **PASO NORMAL**. (6 segundos para una franja de 7.6 m, o 12 segundos para una franja de 15.2 m). **CONTINÚA** hasta llegar a los 61 cm del final de la zona de aplicación, y comienza una nueva hilera dando **2 PASOS A LA DERECHA O IZQUIERDA**, y retrocede en forma paralela a tu primera fila. Debería haber una **LEVE SUPERPOSICIÓN** en el radio de cobertura. **CONTINÚA** así hasta que hayas concluido la aplicación del producto.



**CIERRA** el Ready2Go Spreader™ **PRESIONANDO** el interruptor deslizante. Si quedara producto, guárdalo en un lugar fresco y seco. Si estuviera vacío y ya has terminado con la aplicación, simplemente vuelve a llenar el envase.

## INSTRUCCIONES

El herbicida y fertilizante Vigoro contiene herbicida Trimec®, Trimec® controla una amplia variedad de malezas, incluyendo el diente de león, pampalona, barbilón, ortiga mansa, adelfino y muchas otras malezas reconocidas que se encuentran comúnmente en el césped de su hogar. Además, un fertilizante 26-0-3 proporciona un suministro de nutrientes para el césped. Es posible que sea necesario repetir el tratamiento si el césped está superpoblado de malezas o, (b) si prevalecen las condiciones adversas de poca humedad y las malezas se encuentran en un estado de crecimiento pobre. Puede realizarse una segunda aplicación después de 30 días. Se pueden sembrar las áreas tratadas 3 semanas después de la aplicación.

## EL HERBICIDA Y FERTILIZANTE VIGORO MATA MÁS DE 250 MALEZAS!

Amaranto; púrpura, delgado; áster; brezo, brezo blanco, púrpura, white prairie; alcaucil; roripia austriaca; Galium; amor de hortelano, suave, del Norte, lecho; hierba amarga, peluda; estragalo de Florida; correhuela; veza de pájaro; setos; hierba amarga peluda; hierba amarga, peluda; Rubus; mostaza negra; lupulina; bandito flor de sangre; lechuga azul; colita; Bristly oxeye; hiantón escotado; cholla espinosa; sésamo de carolina; trébol de carrelita; bardana; cardo; césped (patibón); bolón de oro; bulbosa, progresivo; hierba de bolón común (poopee); virginia; pernilo de carolina (silvestre); olandrillo; hierba galera; hierba del halcón; manchada (diente de león falso); flor de hoja; pampalona común; cereales; pepajosa; achicoria; cincosana; trébol carmesí, de una sola hoja, tirado, pala de conejo, rojo, fresa, amarillo, blanco, citrino; cardo ajonjolivo oriental; espinoso; hierba de la moneda; esparrago; trébol español de Kalm; siempre viva; pinjol del amor; romosa; margarita inglesa; ojo de buey; diente de león; común, falso; flor de día asática; lomo púrpura; dichondra; acedera; de hoja ancha, errudada; apocino; manzanilla loca; acarioba; yerba del pescador; sésamo; carolina; girasol falso; origanillo; alfilerillo; de cabo rojo; de cabo blanco; asterias; margarita (verdú); silvestre; albahaca silvestre; peluda; gloria de la mañana; vara de oro; hierba radiana; senecio común; grindele; rama negra; hierba del carpintero; meadow; oreja de ratón; marañón; amarilla; conchale; Heartleaf dymal; caféano; oruga muerta; mustarzo oriental; solano americano; guisano de caballo; higuera loca; pensamiento salvaje; escorriante; lengua de pájaro; postada; pinillo; cenizo; trébol de los prados; malva; alisk; purisugada; comuña; enana, de Venecia; marrota; topia; caperona; Moneywort; Dondego de día; raíz grande; hoja de hiedra, mexicana, roja, alta, willy; artemisa pepajosa; mostaza redonda, negra, azul, eslo, India, feno; yelizada, blanca, wormseed; origan pinchudo (ardiente); alta, wood; Chirive; clavillo antártico; Mostacilla; Blodo; gallo del bosque; perejil; de Virginia (Peppercress); amaranto; postada, de raíz roja, ruso, suave, vellado; mimagora; bella Diana; Llantón; de semilla negra, grande, de hoja ancha, siete veras, mediano, de hoja angosta, delgada, peludo; hiedra venenosa; árbol de las pulgas; hierba carnívora; girasol silvestre; escarola; alata Henlira; sanguiaria; postada; roseta francesa; amirrosa; común; verdolaga; de Brasil, de

la Florida, de flor grande; amirrosa; bar, común, de espiga, occidental; aguja de pastor; de concho hojas; gimpinela escarlata; bolsa de pastor; hierba de Santa María; cresta de gallo, palista, de Pennsylvania; Smooth chaff-flower; romaza suave; sonrel, rojo; centrea; anual; espinoso; verónica; bidente, común, boroncillo; hoja de hiedra, persa, americana, delgada, nieve, ortiga, bleco espinoso; hierba de las golondrinas; manchada, postada; hierba de pollo; estrella de Baker; fresa de la India; hierba de Sanlago; poligono arifolico; cardo; bencllo, carlito, triguero, silvestre, púrpura, crema, plumbago, ruso, escocés, ondrilato, amarillo brillante; coronilla rosa; malva amarilla; verbera; azul, hoary, postada, alta, vezo; arveja silvestre, peluda, milk, de hoja angosta, silvestre; envueladera de Virginia; diomida; clematis occidental; áster silvestre; Envueladera silvestre; zarzaxosa silvestre; Dondego silvestre; ojo del cono; lechuga silvestre; chinchilla; costaza silvestre yellow rocket; cabolla silvestre; chirivía silvestre; rabiator; rabiator; fresa silvestre; camote silvestre; violeta silvestre; acedera menor; Inpadora; violeta, amarilla; hierba de cabra; wormseed; niterama corriente, occidental, amarilla.

## PARA REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

- Busca el compartimento de la batería en el interior de la base del esparcidor.
- La puerta del compartimento de la batería se abre apretando la pestaña y halando para abrirla.

Requiere 4 baterías AA (incluidas).

Se incluyen las baterías, pero están desactivadas debido al envío. Retira la pestaña del compartimento de la batería para activar.

## GARANTÍA

Nota: Hasta el grado que sea posible de acuerdo con la ley correspondiente. El comprador asume toda la responsabilidad en cuanto a la seguridad y rendimiento si este producto no se usa según las indicaciones.

## GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO

The Home Depot garantiza que estará satisfecho con el funcionamiento de este producto cuando se utilice según las instrucciones. Si no está satisfecho, devuélvalo a una tienda de The Home Depot con el comprobante de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso completo del precio de compra. O puedes enviar por correo el comprobante de compra a la dirección que aparece a continuación para obtener un reembolso completo: Lebanon Seaboard Corporation, 1600 E. Cumberland Street, Lebanon, PA 17042.