





Bayer - 24 oz. RTU ASB 5" (H) x 4-3/32" (W)

Base Label



Bayer - 24 oz. RTU ASB
5" (H) x 3-19/32" (W)
BOOK OUTSIDE



Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"		3-5/32"	
DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, read and follow all label directions. BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using. • Apply the product to flowering plants during early morning or late evening, when bees are not present. • Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes. • Do not use in small, enclosed areas where spray can be inhaled. • Do not water the treated area to the point of run-off. • Do not make application during rain. • All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses: (1) Treatment to soil or vegetation around structures; (2) Applications to lawns, turf, and other vegetation; (3) Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are to spot and crack-and crevice applications, only. • Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.		FLOWERS, SHRUBS, GROUND COVERS HOW TO APPLY • Spray foliage, tender new shoots and the underside of leaves thoroughly. • To kill insects that hide, spray the underside of the leaves. Apply until leaves are evenly coated with spray droplets, but not dripping. PESTS Aphids, Bagworms, Boxelder bugs, Clover mites, Elm leaf beetles, Grasshoppers, Gypsy moth larvae, Japanese beetle (adults), Lace bugs, Leaf-feeding caterpillars, Leaf-feeding beetles, Leafhoppers (Including Glassy-winged Sharpshooter), Mealybugs, Pillbugs, Scale (crawler stages), Spittlebugs, Thrips, Whiteflies HOUSEHOLD NUISANCE PESTS OUTDOORS HOW TO APPLY • Spray around doors, window frames and other places where insects may enter house. • Spray around foundations and porches. • Spray on ant hills and ant trails. PESTS Ants, Boxelder bugs, Brown marmorated stink bug, Clover mites, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Flies, Midges, Mosquitoes, Pillbugs, Sowbugs, Spiders, Wasps LAWN PESTS HOW TO APPLY • For localized infestations, spray to penetrate the lawn and reach the soil. • Do not mow for one day after application. • For large areas, use Bayer Advanced Vegetable & Garden Insect Spray Concentrate. PESTS Ants, Armyworms, Chinch bugs, Crickets, Cutworms, Earwigs, Grasshoppers, Japanese Beetles (adults), Sod webworms (lawn moths) FRUITING VEGETABLES Eggplant, Groundcherry, Pepino, Pepper (includes: bell pepper, chili pepper, cooking pepper, pimento, sweet pepper), Tomatillo, and Tomato PESTS Beet armyworm (1st and 2nd instar), Brown marmorated stink bug, Cabbage looper, Celery leafminer, Colorado potato beetle, European corn borer, Flea beetles, Garden webworm, Leafminers, Pepper weevil, Potato aphid, Potato leafhopper, Southern armyworm (1st and 2nd instar), (continued)	
3-19/32"		3-19/32"	
INSIDE PAGES (Even)		INSIDE PAGES (Odd)	

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

FRUITING VEGETABLES (cont'd)

PESTS (cont'd)

Stink bugs, Thrips (except Thrips palmi), Tomato fruitworm (corn earworm), Tomato hornworm, Tomato pinworm, Variegated cutworm, Whitefly (adult), Western yellowstriped armyworm (1st and 2nd instar)

- No waiting to harvest for tomato. After spraying, wait 7 days before harvesting for all other crops.
- Do not spray more than 6 times per season.

BRASSICA (COLE) LEAFY VEGETABLES:

Broccoli, Broccoli raab (rapini), Chinese (gai lan) broccoli, Brussels sprouts, Cabbage, Chinese (bok choy) cabbage, Chinese (napa) cabbage, Chinese mustard (gai choy) cabbage, Cauliflower, Cavalo broccolo, Collards, Kale, Kohlrabi, Mizuna, Mustard greens, Mustard spinach, Rape greens, and Turnip greens.

PESTS

Alfalfa looper, Armyworm (1st and 2nd instar), Beet armyworm (1st and 2nd instar), Cabbage flea beetle, Cabbage looper, Cabbage webworm, Corn earworm, Cutworms, Diamondback moth (larvae), Fall armyworm (1st and 2nd instar), Grasshoppers, Imported cabbageworm, Japanese beetle (adult), Lygus bug, Meadow spittlebug, Potato leafhopper, Southern armyworm (1st and 2nd instar), Stink bugs, Southern cabbageworm, Tarnished plant bug, Thrips, Vegetable weevil (adult), Whitefly (adult), Yellowstriped armyworm (1st and 2nd instar)

- No waiting to harvest. • Do not spray more than 4 times per season.

LEAFY VEGETABLES

Amaranth (Chinese spinach), Arugula (rouquette), Cardoon, Celery, Chinese celery, Celtuce, Chervil, Chrysanthemum (edible-leaved and garland), Corn salad, Cress (garden and upland), Dandelion, Dock (sorrel), Endive (escarole), Florence fennel, Lettuce (head and leaf), New Zealand spinach, Orach, Parsley, Purslane (garden and winter), Radicchio (red chicory), Rhubarb, Spinach, Swiss chard, Vine spinach

PESTS

Alfalfa looper, Beet armyworm (1st and 2nd instar), Brown marmorated stink bug, Cabbage looper, Corn earworm, Cutworms, Colorado potato beetle, Diamondback moth (larvae), European corn borer, Fall armyworm (1st and 2nd instar), Flea beetles, Grasshoppers, Green cloverworm, Imported cabbageworm, Japanese beetle (adult), Leafhoppers, Lygus bug, Meadow spittlebug, Saltmarsh caterpillar, Southern armyworm (1st and 2nd instar), Stink bugs, Tarnished plant bug, Thrips, Vegetable weevil (adult), Whitefly (adult), Yellowstriped armyworm (1st and 2nd instar)

- No waiting to harvest. • Do not spray more than 4 times per season.

CUCURBITS (EXCEPT CROPS GROWN FOR SEED):

Balsam apple, Balsam pear, Bitter melon, Chayote, Chinese cucumber, Chinese waxgourd (Chinese preserving melon), Citron melon, Cucumber, Gherkin, Edible gourd (includes: hyotan, cucurza, henchmia and Chinese okra), Muskmelon (includes: cantaloupe, true cantaloupe, casaba, crenshaw melon, golden pershaw melon, honeydew melon, honey balls, mango melon, Persian melon, pineapple melon, Santa Claus melon, and snake melon), Pumpkin, Summer squash (includes: crookneck squash, scallop squash, straightneck squash, vegetable marrow, and zucchini), Watermelon, Winter squash (includes: butternut squash, calabaza, hubbard squash, acorn squash and spaghetti squash)

PESTS

Armyworm (1st and 2nd instar), Brown marmorated stink bug, Cabbage looper, Colorado potato beetle, Corn earworm, Cutworms, Cucumber beetle, Grasshoppers, Lygus bug, Melonworm, Pickleworm, Potato leafhopper, Rindworm, Stink bugs, Stripped cucumber beetle, Tarnished plant bug, Tobacco budworm, Whitefly (adult)

- No waiting to harvest. • Do not spray more than 4 times per season.

POTATO AND OTHER TUBEROUS AND CORM VEGETABLES:

Arracacha, Arrowroot, Artichoke (Chinese and Jerusalem), Edible canna, Cassava (bitter and sweet), Chayote root, Chufa, Dasheen (taro), Ginger, Leren, Potato, Sweet potato, Tanier, True yam, Turmeric, Yam bean

PESTS

Aphids, Cabbage looper, Colorado potato beetle, Cutworms, European corn borer, Flea beetles, Potato psyllid, Potato leafhopper, Potato tuberworm, Sweetpotato weevil (adults), Tarnished plant bug

- No waiting to harvest. • Do not spray more than 6 times per season.

ROOT VEGETABLES (EXCEPT SUGARBEET):

Garden beet, Edible burdock, Carrot, Celeriac, Turnip-rooted chervil, Chicory, Ginseng, Horseradish, Turnip-rooted parsley, Parsnip, Radish, Oriental radish, Rutabaga, Salsify (black, Spanish, and oyster plant), Skirret, Turnip

PESTS

Aster leafhopper, Carrot weevil, Cutworms, Flea beetles, Potato leafhopper

- No waiting to harvest. • Do not spray more than 5 times per season.

3-19/32"

3-19/32"


INSIDE
PAGES
(Even)

INSIDE
PAGES
(Odd)

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE



**INSIDE
PAGES
(Even)**

**INSIDE
PAGES
(Odd)**

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Elimina más de 100 insectos de la lista por contacto
- Actúa hasta 14 días
- Elimina la chinche hedionda
- Elimina plagas domésticas de exteriores

MATA	Áfidos, Escarabajo japonés (adulto), Minador foliar Escama (etapas de arrastre), Trips, Moscas blancas
DÓNDE USAR	Rosas, flores, jardines de vegetales y flores, arbustos, cubiertas vegetales, céspedes y alrededor de viviendas
CUÁNDO USAR	Cuando aparecen insectos o los primeros daños. Para infestaciones graves, repetir cada 7-14 días como se especifica.
CUÁNDO COSECHAR	Ver las restricciones específicas de la planta para conocer el intervalo previo a la cosecha. Si no se indica el intervalo previo a la cosecha, el producto puede aplicarse hasta el día de la cosecha incluido.
 	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito (877) 229-3724 www.BayerAdvanced.com

SOLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INGREDIENTE ACTIVO:
Ciflutrina 0,003%
OTROS INGREDIENTES 99,997%
TOTAL 100,000%
La ciflutrina es el nombre químico de Tempo®

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.
Para obtener mejores resultados, lea y siga todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR Leer y seguir las indicaciones al usar.	• Aplicar el producto a las plantas en florecimiento durante las primeras horas de la mañana o al atardecer cuando no hay abejas. • No rociar el producto en estanques de peces, estanques de agua, arroyos o lagos. • No usar en áreas reducidas o cerradas donde pueda inhalarse el rocío. • No regar el área tratada al punto de escurrimiento. • No hacer aplicaciones durante la lluvia. • Todas las aplicaciones exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o en grietas o rajaduras únicamente, excepto por los siguientes usos permitidos: (1) tratamiento del suelo o la vegetación alrededor de estructuras; (2) aplicaciones en céspedes, grama y otra vegetación; (3) aplicaciones a cimientos de construcciones, hasta una altura máxima de 3 pies. Sin considerar las aplicaciones a los cimientos de construcciones, todas las demás aplicaciones a las superficies impermeables, como aceras, caminos, patios, entradas y superficies estructurales (como ventanas, puertas y cobertizos) se limitan a las aplicaciones localizadas y en grietas o rajaduras únicamente. • Está prohibida la aplicación directa en alcantarillas o drenajes, o en cualquier área como una cuneta donde pueda drenar el producto a las alcantarillas, bocas de tormenta, cursos de agua o hábitats acuáticos. No permitir que el producto entre en ningún drenaje durante ni después de la aplicación.
CUÁNDO USAR	Cuando aparecen insectos o los primeros daños.
CÓMO USAR	• Agitar bien antes de usar. • Ajustar la boquilla al patrón de rocío deseado. • Sostener el rociador a 12 pulgadas del follaje. • Rociar las hojas, los tallos y los brotes nuevos. • Para matar insectos que pueden ocultarse, rociar la parte inferior de las hojas. Aplicar hasta que las hojas estén rociadas de manera uniforme pero que no goteen. 
CUÁNDO USAR	Mata insectos por contacto y actúa varias semanas. Para infestaciones graves, repetir cada 7 a 14 días según sea necesario.

3-19/32"

3-19/32"

**INSIDE
PAGES
(Even)**

**INSIDE
PAGES
(Odd)**

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"		3-5/32"		
FLORES, ARBUSTOS, RECUBRIMIENTOS DE TIERRA CÓMO APLICAR • Rociar bien el follaje, los brotes nuevos y la parte inferior de las hojas. • Para matar insectos que se ocultan, rociar la parte inferior de las hojas. Aplicar hasta que las hojas estén cubiertas de manera uniforme con gotas de rocío pero que no goteen. PLAGAS Áfidos, gusanos del saco, chinchas del arce, ácaros del trébol, escarabajos de la hoja del olmo, saltamontes, larvas de la polilla gitana, escarabajo japonés (adulto), chinchas de encaje, orugas desfoliadoras, escarabajos desfoliadores, cigarrillas (incluso la cigarrilla de las alas cristalinas), cocos, cochinillas, escama (etapas de arrastre), babosas, trips, moscas blancas PLAGAS DAÑINAS DOMÉSTICAS EN EL EXTERIOR CÓMO APLICAR • Rociar alrededor de puertas, marcos de ventanas y otros lugares que puedan servir de ingreso a la casa para los insectos. • Rociar alrededor de cimientos y entradas. • Rociar sobre hormigueros y caminos de hormigas. PLAGAS Hormigas, chinchas del arce, ácaros del trébol, cucarachas, grillos, tijeretas, moscas, chinche hedionda marrón marmolada, mosquitos, mosquitos, cochinillas, lepisma, arañas, avispas PLAGAS DE CÉSPEDES CÓMO APLICAR • Para tratar infestaciones localizadas, rociar para penetrar el césped y alcanzar el suelo. • No segar durante un día después de la aplicación. • Para tratar áreas grandes, usar el rocío insecticida para vegetales y jardines Bayer Advanced Vegetable & Garden Insect Spray Concentrate. PLAGAS Hormigas, orugas soldado, chinchas del maíz, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, saltamontes, escarabajo japonés (adulto), gusanos de seda (polillas de tierra) HORTALIZAS FRUTALES Berenjena, alquequenje, pepino, pimiento (incluye ají, chile, pimiento, pimiento cherry, pimiento dulce), tomatillo, y tomate PLAGAS Gardama (1er y 2do estadio), chinche hedionda marrón, gusano gris de la col, udea rubigalis, escarabajo de la patata, ostrinia nubilalis, escarabajos pulga, oruga de jardín, minador foliar, gorgojo del chile, pulgón de la papa, chicharra de la papa, lagarta de las vainas (1er y 2do estadio), (continúa)				HORTALIZAS FRUTALES (continuación) PLAGAS (continuación) chinchas hediondas, trips (salvo Thrips palmi), gusano del tomate (gusano elotero), gusano picudo del tomate, gusano alfiler, gusano cortador jaspeado, mosca blanca (adulto), gusano soldado occidental de rayas amarillas (1er y 2do estadio) • No hay tiempo de espera para la cosecha del tomate. Después de rociar, esperar 7 días antes de cosechar los demás cultivos. • No rociar más de 6 veces por temporada. VEGETALES DE HOJA, COLES Brócoli, brócoli raab (rapini), brócoli chino (gai lon), repollitos de Bruselas, col, col china (bok choy), col china (napa), col mostaza china (gai choy), coliflor, brócoli cavalo, repollo, col rizada, colibano, mizuna, hojas de mostaza, espinaca de mostaza, hojas de colza y hojas de nabo PLAGAS Gusano gris de la alfalfa, gusano soldado (1er y 2do estadio), gardama (1er y 2do estadio), escarabajo pulga de la col, gusano gris de la col, orugas de la col, gusano elotero, gusanos cortadores, polilla de la col (larva), gusano cogollero (1er y 2do estadio), saltamontes, blanquita de la col, escarabajo japonés (adulto), chinche lygus, chicharra espumadora, chicharra de la papa, lagarta de las vainas (1er y 2do estadio), chinchas hediondas, mariposa blanca de la col, chinche lygus, trips, gorgojo de las hortalizas (adulto), mosca blanca (adulto), gusano soldado occidental de rayas amarillas (1er y 2do estadio) • No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 4 veces por temporada. VEGETALES DE HOJA Amaranto (espinaca china), rúgula, cardón, apio, apio chino, lechuga china, perifollo, crisantemo (corona y hojas comestibles), canónigo, cardamina (huerta y altiplano), diente de león, acedera, endivia (escarola), hinojo de Florencia, lechuga (tallo y hoja), espinaca de Nueva Zelanda, armuelle, perejil, verdolaga (huerta e invierno), achicoria roja, ruibarbo, espinaca, acelga, espinaca blanca. PLAGAS Gusano gris de la alfalfa, gardama (1er y 2do estadio), chinche hedionda marrón, gusano gris de la col, gusano elotero, gusanos cortadores, escarabajo de la patata, polilla de la col (larva), ostrinia nubilalis, gusano cogollero (1er y 2do estadio), escarabajos pulga, saltamontes, gusano verde, blanquita de la col, escarabajo japonés (adulto), cigarrillas, chinche lygus, chicharra espumadora, gusano peludo, lagarta de las vainas (1er y 2do estadio), chinchas hediondas, chinche lygus, trips, gorgojo de las hortalizas (adulto), mosca blanca (adulto), gusano soldado occidental de rayas amarillas (1er y 2do estadio) • No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 4 veces por temporada.
3-19/32"		3-19/32"		
INSIDE PAGES (Even)		INSIDE PAGES (Odd)		

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

CUCÚRBITAS (EXCEPTO CULTIVOS PARA SEMILLA):

Manzana de bálamo, pera de bálamo, melón amargo, cayote, pepino chino, melón de invierno, sandía silvestre, pepino, pepino Gherkin, calabaza comestible (incluye: hyotan, cucuzza, henchmia y okra), melones (incluye: cantalupo, melón de Castilla, melón verde, crenshaw, golden pershaw, melón rocío de miel, melón dulce, melón mango, melón persa, melón piña, melón Santa Claus y melón serpiente), zapallo, zapallo de verano (incluye: calabaza cuello de ganso, zapallo escalope, calabaza de cuello recto, calabacín y zucchini), sandía, zapallo de invierno (incluye: zapallo anco, calabaza, calabaza tipo hubbard, calabaza bellota y calabaza espagueti)

PLAGAS

Gusano soldado (1er y 2do estadio), chinche hedionda marrón, gusano gris de la col, escarabajo de la patata, gusano elotero, gusanos cortadores, escarabajo del pepino, saltamontes, chinche lygus, barrenador del melón, barrenador del fruto, chicharrita de la papa, barrenador de la piel del fruto, chinches hediondas, escarabajo rayado del pepino, chinche lygus, gusano del brote del tabaco, mosca blanca (adulto)

• No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 4 veces por temporada.

PAPA Y OTROS TUBÉRCULOS Y VEGETALES CULTIVADOS:

Arracacha, arrurruz, alcachofa (china y de Jerusalén), caña comestible, mandioca (amarga y dulce), raíz de chayote, chufa, malanga, jengibre, lerén, papa, camote, yautía, ñame, cúrcuma, jicama

PLAGAS

Áfidos, gusano gris de la col, gusanos cortadores, ostrinia nubilalis, escarabajos pulga, escarabajo de la papa del Colorado, psílido de la papa, polilla de la papa, chicharrita de la papa, gorgojo del camote (adulto), chinche lygus

• No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 6 veces por temporada.

VEGETALES DE RAÍZ (EXCEPTO REMOLACHA AZUCARERA):

Remolacha de mesa, bardana comestible, zanahoria, apio-nabo, perifollo, achicoria, ginseng, rábano picante, raíz de perejil, chiviría, rábano, rábano oriental, colinabo, salsifi (negro, español y ostra vegetal), escaravá, nabo

PLAGAS

Macrosteles quadrilineatus, gorgojo de la zanahoria, gusanos cortadores, escarabajos pulga, chicharrita de la papa

• No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 5 veces por temporada.

MAÍZ DULCE

PLAGAS

Gusano soldado (1er y 2do estadio), escarabajo de la hoja del frijol, gusanos de seda negros, escarabajo de la hoja del cereal, chinche del maíz, escarabajo del resorte (adulto), gusano elotero, crisomélido (adulto), mosca de los estigmas del maíz, ostrinia nubilalis, gusano cogollero (1er y 2do estadio), escarabajo pulga, gusano trozador, colapsis de la uva (adulto), saltamontes, escarabajo japonés (adulto), melotonta (adulto), cigarrillas, escarabajo enmascarado de arrastre (adulto), gusano cortador Euxoa detersa, lagarta de las vainas (1er y 2do estadio), escarabajo de la hoja del maíz del sur, barrenador del maíz del sudoeste, barrenador del tallo, chinches hediondas, oruga, gusano cortador del maíz occidental, gusano soldado occidental de rayas amarillas (1er y 2do estadio)

• No hay tiempo de espera para la cosecha. • No rociar más de 10 veces por temporada.

CACAHUETE

PLAGAS

Gusano soldado (1er y 2do estadio), escarabajo de la hoja del frijol, gardama (1er y 2do estadio), gusanos cortadores, gusano elotero, crisomélido (adulto), gusano cogollero (1er y 2do estadio), gusano verde, colapsis de la uva (adulto), saltamontes, escarabajo japonés (adulto), melotonta (adulto), chicharrita de la papa, gusano cogollero del maní, chinches hediondas, periquito tricornudo de la alfalfa, lagarta de las vainas (1er y 2do estadio), falso medidor, trips, gorgojo de las hortalizas, oruga de las leguminosas, burrito del frejol (adulto), mosca blanca (adulto)

• Después de rociar, esperar 14 días antes de cosechar. • No rociar más de 3 veces por temporada.

GIRASOLES

PLAGAS

Polilla de bandas del girasol, gusanos cortadores, saltamontes, escarabajo pulga rayado pálido, escarabajo del girasol, chinches hediondas, polilla de la yema del girasol, picudo podador del girasol, mosquita del girasol, polilla del girasol, picudo de la semilla del girasol, gorgojo de la raíz del girasol (adulto)

• Después de rociar, esperar 30 días antes de cosechar. • No rociar más de 3 veces por temporada.

UVAS

Incluye: Uva de mesa, uva pasa, uva para vino y muscadina

PLAGAS

Gusano trepador, polilla de la uva, escarabajo de la uva, picudo de la caña de la uva (adulto), escarabajo pulga de la uva, polilla de la uva, chicharrita de la uva, pulgón de la uva, cocos de la uva (arrastre), cigarrilla de las alas cristalinas, descarnador de la hoja de la vid, rosquilla omnívora, (continúa)

3-19/32"

3-19/32"

INSIDE
PAGES
(Even)

INSIDE
PAGES
(Odd)

Bayer - 24 oz. RTU ASB

5" (H) x 3-19/32" (W)

BOOK INSIDE

3-5/32"

3-5/32"

UVAS (continuación)

PLAGAS (continuación)

tortricido naranja, trips, chicharrita de la vid, descarnador de la hoja de la vid occidental

- Después de rociar, esperar 3 días antes de cosechar. • No rociar más de 4 veces por temporada.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

No regar el follaje dentro de la primera hora después de la aplicación. Para evitar que se produzcan daños graves a las plantas, eliminar las plagas a comienzos de la temporada, antes de que se multipliquen.



No permitir el ingreso al área tratada hasta que el rocío se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete bajo llave. Proteger del congelamiento.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA



- Envase no rellenable. No rellenar ni volver a utilizar el envase de rocío vacío.
- Si está vacío: Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.
- Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia local de residuos sólidos para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

IMPORTANTE: Lo mejor es utilizar todo el producto según las indicaciones de la etiqueta. Si fuera necesario eliminar el producto no utilizado, siga las normas estatales o locales correspondientes.

RIESGOS AMBIENTALES

- Este pesticida es tóxico para los peces. No aplicar directamente al agua.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en bocas de tormenta, acequias, cunetas o aguas superficiales. La aplicación del producto con viento calmado o cuando no se pronostica lluvias para las próximas 24 horas ayudará a garantizar que ni el viento ni la lluvia eliminen el pesticida del área de tratamiento.
- Este pesticida es altamente tóxico para las abejas. No aplicar el producto cuando las abejas estén presentes.
- Aplicar este producto solo como se especifica en esta etiqueta.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere o se inhala. • Causa irritación en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. • Evitar respirar el vapor del rocío.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Ayudar a la persona a beber de un vaso con agua si ésta puede tragar.
- No inducir el vómito salvo que así lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener abiertos los ojos y enjuagar de forma lenta y suave con agua durante entre 15 y 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN

- Trasladar a la persona a una zona ventilada.
- Si una persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia, luego, suministrar respiración artificial, en lo posible boca a boca.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener la etiqueta del producto a mano al llamar a un centro de control de envenenamiento. Si busca tratamiento en una sala de emergencias o en el consultorio de un médico, lleve esta etiqueta del producto para mostrársela al personal médico.

Para solicitar información de emergencias médicas, usted puede llamar al número gratuito 1-800-229-3763.

Ingredientes activos: 0,003% ciflutrina (CAS N° 68359-37-5).

Nota para el médico: No hay un antídoto específico. Tratar los síntomas del paciente.

NOTA: Las pruebas y las investigaciones han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador, en la medida que sea acorde con la ley pertinente, asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

3-19/32"

3-19/32"

INSIDE
PAGES
(Even)

INSIDE
PAGES
(Odd)