Zipper Area - Background color between dashed lines only (no copy

TREATS UP TO 1,700 SQUARE FEET

0,45 kg rinden hasta 157,94 m<sup>2</sup>



## SLUG & SNAIL KILLER

Mata babosas y caracoles

Stops Slugs & Snails from Feeding

Evita que caracoles y babosas se alimenten de sus plantas



Can be Used Around Pets & Wildlife
Se puede utilizar cerca de mascotas y vida Silvestre

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GAUTION/PRECAUCIÓN: (SEE SIDE PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS & FIRST AID)
(CONSULTE EL PANEL LATERAL PARA OTRAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS)

**GUSSET** 

NET CONTENTS/CONTENIDO NETO: 1 lb. (0.45 kg)

ACTIVE INGREDIENTS

POR PESO

SOCIUM FETTIC EDTA/EDTA TÉTTICO SÓCICO...

OTHER INGREDIENTS/OTROS INGREDIENTES:

. \$4.00% 100.00%

SEAL AREA

EAL ARE



## **SLUG & SNAIL KILLER**

## Mata babosas y caracoles

GENERAL INFORMATION: This product has a non-toxic mode of action and can be used in areas where pet and wildlife protection is a concern. When snails & sugs ingest the bait, they stop feeding and crawl back to their shelter where they eventually die. It remains effective under varying weather and environmental extremes.

DIRECTIONS FOR USE:

WILENTON FOR USE:

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

WHENTO APPLY: Early morning or evening is the best time to apply this bait since slugs and snails travel and feed in the nightor early morning. Reapply as the bait is consumed or at 14 day intervals. In areas of severe infestation, apply bait more heavily. WHERE TO APPLY: On Lawns, Perimeter of Home, Around Ornamental Plants (flowers, shrubs & trees) and in Home Gardens. All likely areas of infestation should be treated, especially around the perimeter of garden plots because slugs and snails travel into plant areas from daytime hidring places. Apply bait around the base of plantings that show visible damage. Slugs and snails favor damp places around vegetable plants such as beans, tomatoes, lettuce, cabbage, celery and squash. Slugs and snails often seek shelter inside large leafy plantings like hostas & dahlias. Other favorite areas are flower gardens, nock gardens, hedges, dichondra lawns, citrus groves, by patches, and other ground cover where they obtain shelter by day. HOW TO APPLY: On one use kitchen utensits for measuring! Safer® Brand Slug & Snail Killer should be applied evenly to the soil around or near plants and areas to be protected. Apply while the ground is moist, in early morning, late evening, or after rainfall. If the ground is done to the product of product around base of plant by hand. Avoid placing product on plants. Apply product by hand or by dispensing directly from container to smaller areas as spot treatment. Avoid creating piles of the bait. Keep measuring utensits with pest control products out of reach of children. Immediately clean up any spilled bait. APPLICATION RATES: Vegetables including (but not imited to): asparagus, artichokes, beans, beats, black-eyed peas, broccol, Brussels sprouts, cabbage, carbidope, carrobs, cauliflower, corn, cucumbes, eggplants, garlic, lettuce, onions, peas, peppers, potatoes, radishes, rubagags, spinach, squash, Swiss chard, tomatoes treatment or 1 tsp product per square yard. Scatter the bait around the perimeter of the benry plot to provide a protective barrier from slugs and snaits entering the plot. If slugs or snaits are inside the plot, scatter the bait between the furnows near the base of the plants. Do not broadcast treat entire area. For small plots, treat around the base of the plants to be protected. For heavier infestations, apply at higher rate. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Grape Vines Usea rate of 0.5-1. Ib product per 1,700 square feet or 1 tsp product per square yard. Scatter bait evenly at the base of vines and between rows. Use higher rates for heavy infestations. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Fruit Trees including (but not limited to): apples, avocados, apricots, chemies, grapes, melons, peaches, plums, nectarines, citrus, and pears. Use a rate of 0.5-1. Ib product per 1,700 square feet or 1 tsp product per square yard. Scatter bait evenly around the base of the trees. Use higher rates for heavy infestations. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Outdoor Omamentals Use a rate of 1 lb. per 1,700 square feet. Use a teaspoon to evenly scatter bait in a 6-inch wide circular band around the base of the plants to be protected. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Outdoor Omamentals Use a rate of 1 lb. per 1,700 square feet. Use a teaspoon to evenly scatter bait in a 6-inch wide circular band around the base of the plants to be protected. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Lawns Use a rate of 1 lb. per 1,700 square feet. Scatter bait evenly around the base of the plants to be protected. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Lawns Use a rate of 1 lb. per 1,700 square feet. Scatter bait evenly around the base of the plants to be protected. Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Straface.

\*\*Reapply every 14 days while slugs or snaits persist. Lawns Use a rate of 1 lb. per 1,700 square feet. Scatter bait even unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling this product and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

FIRST AID
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. Contact the nearest poison control center or 1-800-858-7378 for emergency medical treatment advice.

BNIRONMENTAL HAZARDS: For terrestrial uses: Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate. Note: Seller warrants that this product complies with the specifications expressed in this label. To the extent consistent with applicable law, Seller makes no other warranties, and disclaims all other warranties, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and filmes for the intended purpose. To the extent consistent with applicable law, Seller's liability or default, breach or failure under this label shall be limited to the amount of the purchase price. To the extent consistent with applicable law, Seller's liability for consequential damages.

INFORMACIÓN GENERAL: Este producto posee un método de acción no tóxico y puede utilizarse en áreas en donde exista preocupación por la protección de mascotas y la vida silvestre. Cuando las babosas y caracoles ingieren el cebo, no siguen alimentándose y se retraen a sus guaridas en donde finalmente mueren. Sigue siendo efectivo bajo variadas condiciones climáticas y ambientales extremas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Es infracción a la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

CUÁNDO APLICAR: La mejor hora para aplicar este cebo es temprano por la mañana o en la tarde, ya que los caracoles y babosas salen a alimentarse por la noche o en las primeras horas de la mañana. Vuelva a aplicar el cebo a medida que es consumido en intervalos de 1.4 días. En fareas de mayor infestación, aplique una mayor cantidad de cebo. DÚNDE APLICAR: En céspedes, en el perímetro de la casa, alrededor de plantas ornamentales (flores, arbustos y árboles) y en jardines interiores. Se debe tratar todas las posibles áreas de infestación, especialmente altrededor del perímetro de jardines, pues las babosas y caracoles se trastalan la als zonas de plantas desde sus esconditles diumos. Aplique el cebo en la base de las plantas que muestren daño evidente. Las babosas y caracoles preferen las zonas humedas alrededor de hortalizas como frijoles, tomales, lechugas, repollos, aplos y calabazas. Las babosas y caracoles a menudo buscan refugio en plantas frondosas grandes como hostas y dalias. Otras de sus áreas favoritas son jardines de flores, jardines de rocas, setos, el césped Oreja de ratón, huertas de citricos, parches de hiedra y otras cubiertas de suelo en donde se guarecen durante el día. DÚMO APLICAR: No utilice utensilios de cocina para medif. Mata babosas y caracoles de marca Safer<sup>6</sup> Brand debe aplicarse de forma pareja sobre el suelo alrededor o cerca de las plantas o áreas que desea proteger. Aplique mientras el suelo esté húmedo, temprano por la mañana, al atardecer o después de una luvia. Si el suelo está seco, mójelo antes de aplicar el cebo. El suelo debe estar húmedo pero con muy pocos o sin charcos de agua. Para aplicaciones en hileras, coloque la cartidad de producto prescrita alrededor de la base de la planta manualmente. Evite colocar el producto en las plantas mansimsa. Aplique el producto manualmente o vertiéndolo directamente del contenedor en áreas pequeñas como en el tratamiento por CUÁNDO APLICAR: La mejor hora para aplicar este cebo es temprano por la mañana o en la tarde, ya que los manualmente o vertiéndolo directamente del contenedor en áreas pequeñas como en el tratamiento por puntos. Evite crear montículos de cebo. Mantenga los utensilios de medición con los productos de control de puntos. Evite crear montículos de cebo. Mantenga los utensilios de medición con los productos de control de pestes fuera del alcance de los niños. Limpie inmediatamente si el producto se vierte. TARIFAS DE LA APLICACIÓN. Cultivo/Uso Hortalizas, incluidas (entre otras): espárragos, alcachofas, fitiples, remolacha, alubias, brócoli, coles de Bruselas, repollo, melán Cantaloupe, zanahorias, colíficir, maíz, pepinos, berenjenas, ajo, lechugas, cebollas, anvejas, pimientos, papas, rábanos, colínabos, espinaca, calabazas, acelga, bomates, nabos. 0,2 kg a 0,45 kg de producto por cada 157,94 m² para el tratamiento por áreas ó 1 cdta. de producto por cada 0,84 m². Esparza el cebo alrededor del perímetro de la huerta de hortalizas para crear una barrera protectora que impida el ingreso de babosas y caracoles. Si las babosas o caracoles están al interior de la huerta, esparza el cebo en el suelo alrededor de la base de las plantas o entre las hileras. No aplique el producto en el área completa. Aplique en menor dosis si la intelsatación es baja y se puede a pilicar pellas o ecra de donde se encuentra localizada la infestación. Aplique una dosis mayor si la infestación es más grave. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Bayas, incluidas (entre otras): fresas, moras, arándanos, moras de Califomia, frambuesas de Logan y frambuesas. 0,2 kg a 0,45 kg de producto por cada 157,94 m² para el tratamiento por áreas ó 1 cdta. de producto por cada 0,84 m². Esparza el cebo alrededor del perímetro de la huerta de bayas para crear una barrera protectora que impida el ingreso de babosas y caracoles si las habrosas o caracoles caracoles están al indexión de la huerta de la nigreso de babosas y caracoles si las habrosas o caracoles caracoles carán al indexión de la huerta de bayas para crear una barrera protectora que impida el ingreso de babosas y caracoles si las habrosas o caracoles caracoles carán al indexión de la huerta de bayas para crear una barrera protectora que impida el ingreso de babosas 157,94 m² para el tratamiento por áreas ó 1 cdta. de producto por cada 0,84 m². Esparza el cebo alrededor del perímetro de la huerta de bayas para crear una barrera protectora que impidia de lingreso de babosas y caracoles. Si las babosas o caracoles están al interior de la huerta, esparza el cebo entre los surcos cerca de la base de las plantas. No aplique el producto en el área completa. Para huertas pequeñas, aplique alrededor de la base de las plantas que desea proteger. Aplique una dosis mayor si la infestación es más grave. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Paras 0,2 kg a 0,45 kg de producto por cada 157,94 m² ó 1 cdta. de producto por cada 0,84 m². Esparza el cebo de forma pareja en la base de las parras y entre las hileras. Utilice dosis más altas para infestaciones graves. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Árboles frutales, incluidos (entre ctros): manzanos, aguacateros, albaricoqueros, cerzos, parras, melones, melocotoneros, ciruelos, nectarinas, árboles citricos y perales. O,2 kg a 0,45 kg de producto por cada 157,94 m² ó 1 cdta. de producto por cada 0,94 m². Esparza el cebo de forma pareja alrededor de la base de los árboles. Utilice dosis más altas para infestaciones graves. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Plantas ornamentales de exterior 0,45 kg por cada 157,94 m². Utilice una cuchara para esparcir el cebo de forma pareja en una franja circular de 15,24 cm de ancho alrededor de la base de las plantas que desea proteger. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Plantas de maceta de exterior 1 CDTA, por maceta. Esparza el cebo de forma pareja en la superficie del suelo de las macetas o alrededor de suelo cerca de las macetas Esparza el cebo de forma pareja en la superficie del suelo de las macetas o alrededor del suelo cerca de las macetas. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. Céspedes 0,45 kg por macetas Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles, Céspedes O,45 kg or cada 157,94 m². Esparza e o ebo de forma pareja en áreas donde observa la presencia de babosas o caracoles. Vuelva a aplicar cada 14 días mientras sigan apareciendo babosas y caracoles. ALMACENAIE Y ELIMINACION: Almacenaje: Almacene en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Almacene solo en el envase original. Birninación: Si está vador. el envase no se puede volver a rellenar. No reutilice ni rellene este envase. Bótelo a la basura u ofrézcalo para reciclaje si es posible. Si está parcialmente lleno: llame al organismo local de eliminación de desechos sólidos para recibir instrucciones para la eliminación. Nunca vierta el producto sin usar en un desaggo de interiores o exteriores.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Peligrason para las personas y los animales domésticos.

Peligroso para las personas y los animales domésticos.

PRECAUCIÓN: Causa irritación leve en los gios. Evite el contacto con los gios o la ropa. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese bien con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, comer goma de mascar o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS 0JOS; Mantenga los ojos abiertos y enjluague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene puestos, después de los primeros cinco minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llarne a un centro de control de tóxicos o a un médico para solicitar tratamiento.

Tenga a mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de tóxicos o al médico o si acude para tratamiento. Póngase en contacto con el centro de control de tóxicos más cercano o llame al 1-800-858-7378 para obtener información de tratamiento médico de emergencia.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Para uso terrestre: no aplique directamente al agua, en áreas donde exista agua superficial o en áreas intermareales por debajo de la pleamar media. No contamine el agua al desechar las aguas con la que limpió o enjuagó el producto. Nota: el vendedor garantiza que este producto cumple con las específicaciones expresadas en esta etiqueta. En la medida en que lo permita la lej vigente, el vendedor no dorga otras garantías y rechaza cualquier otra garantía, expresa o implicita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad y de adecuación para el propósito previsto. En la medida en que lo permita la ley vigente, el responsabilidad u obligación por parte del vendedor, así como la falla o insuficiencia de lo contemplado en la etiqueta estará limitada al monto del precio de compra. En la medida en que lo permita la ley vigente, el vendedor no tendrá responsabilidad por daños resultantes.

Distributed By: Safer, Inc. (A wholly owned subsidiary of Woodstream Corporation) 69 N. Logust St Lititz, PA 17543 • (800) 800-1819

© Copyright 2009 Woodstream Corp. Made in USA www.saferbrand.com EPA Reg.No 42397-61 Patent No.6,093,416 Model / Modelo # SB125

EPA Est. No. 69208-MO-001 (C. EPA Est. No. 89287-KS-002 (E) EPA Est. No. 89287-PA-001 (M) EPA Est. No. 69208-MO-003 ( EPA Est. No. 046270-NY-001 B Circled letter is first letter of lot number

