

APPLY  
— IN —  
SPRING

961-419\_Preen One Lawn Care 24-0-6\_20170928\_70\_961\_.pdf



# Preen<sup>®</sup> One

## L A W N C A R E

### EASY ONE-STEP APPLICATION FOR SPRING LAWN CARE!



**STOPS**  
Crabgrass All Season.

Can be applied  
up to 4 weeks after  
crabgrass emerges.



**KILLS**  
Dandelions And  
Most Lawn Weeds\*.

Kills 250 weeds\*  
to the root.



**FEEDS**  
Your Lawn.

Feeds the lawn  
for 8 weeks.

**COVERS 5,000 SQ.FT. CUBRE 1393.5 m<sup>2</sup> (15,000 pies<sup>2</sup>)**

\*SEE USE DIRECTIONS FOR COMPLETE LIST OF TREATED WEEDS.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION**

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN**

Consulte la parte posterior para obtener información adicional sobre las precauciones.

ACTIVE INGREDIENTS:  
2,4-D, 2-ethylhexyl ester.....1.108%  
Mecoprop-p ..... 0.167%  
Dicamba ..... 0.071%  
Dithiopyr ..... 0.160%  
OTHER INGREDIENTS..... 98.494%  
TOTAL 100.000%

THIS PRODUCT CONTAINS:  
14.70 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton or 0.735% (CAS 1928-43-4)  
3.34 lb (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid equivalent per ton or 0.167% (CAS 16484-77-8)  
1.42 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton or 0.071% (CAS 1918-00-9)  
3.20 lb dithiopyr per ton or 0.160% (CAS 97886-45-8)  
Isomer Specific By AOAC Methods.

New York State: Do not exceed one application at the maximum rate of 3.6 pounds of product per 1,000 sq.ft. per year (0.25 lb. of dithiopyr per acre per year).

# 24-0-6

**NET WT. 18 LBS  
(8.16 KG)**

# EASY ONE-STEP APPLICATION FOR SPRING LAWN CARE!



## STOPS Crabgrass All Season.

Can be applied  
up to 4 weeks after  
crabgrass emerges.



## KILLS Dandelions And Most Lawn Weeds\*.

Kills 250 weeds\*  
to the root.



## FEEDS Your Lawn.

Feeds the lawn  
for 8 weeks.

**COVERS 5,000 SQ.FT.** CUBRE 1393.5 m<sup>2</sup> (15,000 pies<sup>2</sup>)

\*SEE USE DIRECTIONS FOR COMPLETE LIST OF TREATED WEEDS.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION**

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN**

Consulte la parte posterior para obtener información adicional sobre las precauciones.

#### ACTIVE INGREDIENTS:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 2,4-D, 2-ethylhexyl ester..... | 1.108%   |
| Mecoprop-p .....               | 0.167%   |
| Dicamba .....                  | 0.071%   |
| Dithiopyr .....                | 0.160%   |
| OTHER INGREDIENTS.....         | 98.494%  |
| TOTAL .....                    | 100.000% |

#### THIS PRODUCT CONTAINS:

14.70 lb 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton or 0.735% (CAS 1928-43-4)  
3.34 lb (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid equivalent per ton or 0.167% (CAS 16484-77-8)  
1.42 lb 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton or 0.071% (CAS 1918-00-9)  
3.20 lb dithiopyr per ton or 0.160% (CAS 97886-45-8)  
Isomer Specific By ADAC Methods.

# 24-0-6

**NET WT. 18 LBS  
(8.16 KG)**

New York State: Do not exceed one application at the maximum rate of 3.6 pounds of product per 1,000 sq.ft. per year (0.25 lb. of dithiopyr per acre per year).

STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wear protective eyewear. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

| First Aid                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If in eyes:                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes.</li><li>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li><li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li></ul>                                                   |
| If swallowed:                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li><li>• Have person sip a glass of water if able to swallow.</li><li>• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.</li><li>• Do not give anything by mouth to an unconscious person.</li></ul> |
| If on skin or clothing:                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Take off contaminated clothing.</li><li>• Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes.</li><li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li></ul>                                                                                                                     |
| Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information in case of emergency, call toll free 1-877-800-5556. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled.

USE INSTRUCTIONS

This product is formulated to provide control of most annual grasses and certain broadleaf weeds\* commonly found in home lawns. This product contains three components: a preemergent herbicide, a lawn fertilizer, and a post emergent broadleaf weed\* killer.

- The preemergent herbicide can be applied to established turfgrass to control crabgrass goosegrass, foxtails, and other undesirable annual grasses.
- The fertilizer contains nutrients for turfgrass uptake.
- The post emergent broadleaf herbicide will control over 250 lawn weeds\* including dandelion, chickweed, thistle and clover.

A list of broadleaf weeds is presented on this label.

\*See use directions for complete list of treated weeds.

Controls 253 weeds! List of weeds may include the following:

|                                    |                          |                                 |                              |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Amaranth, purple                   | charlie)                 | Mugwort                         | Speedwell, bi-lobed          |
| Amaranth, slender                  | Cupid shaving Brush      | Mustard, ball                   | Speedwell, common            |
| Aster, heath                       | Cudweed                  | Mustard, black                  | Speedwell, corn              |
| Aster, white heath                 | Daisy, English           | Mustard, blue                   | Speedwell, ivyleaf           |
| Aster, purple                      | Daisy, oxeye             | Mustard, hedge                  | Speedwell, persian           |
| Aster, white prairie               | Dandelion, common        | Mustard, indian,                | Speedwell, purslane          |
| Artichoke                          | Dandelion, false         | Mustard, tansy                  | Speedwell, slender           |
| Austrian fieldcress                | Day flower               | Mustard, tumble                 | Speedwell, snow              |
| Bedstraw, Catchweed                | Deadnettle               | Mustard, white                  | Speedwell, thymeleaf         |
| Bedstraw, smooth                   | Dichondra                | Mustard, wormseed               | Spiny amaranth               |
| Bedstraw, Northern                 | Dock, broadleaf          | Nettle, stinging (burning)      | Spurge, spotted              |
| Bedstraw, pineywoods               | Dock, curly              | Nettle, tall                    | Spurge, prostrate            |
| Beggarticks, hairy                 | Dogbane                  | Nettle, wood                    | Spurweed                     |
| Betony, Florida                    | Dogfennel                | Parsley-piert                   | Star of Bethlehem            |
| Bindweed, Field                    | Dollarweed (Pennywort)   | Parsnip                         | Strawberry, India mock       |
| Bindweed, Hedge                    | Dove weed                | Pearlwort                       | Tansy ragwort                |
| Bitter Wintercress                 | Elderberry               | Pennycress (frenchweed)         | Tanweed                      |
| Bittercress, hairy                 | Falseflax                | Pepperweed, perennial           | Thistle, blessed             |
| Bitterweed                         | False sunflower          | Pepperweed, virginia            | Thistle, bull                |
| Black-eyed Susan                   | Fiddleneck               | (Peppergrass)                   | Thistle, canada              |
| Black Medic                        | Filaree, redstem         | Pigweed, prostate               | Thistle, flodman (prairie)   |
| Blood flower milkweed              | Filaree, whitestem       | Pigweed, redroot                | Thistle, musk                |
| Blue lettuce                       | Fleabane, daisy (annual) | Pigweed, russian                | Thistle, plate               |
| Brassbuttons                       | Fleabane, rough          | Pigweed, smooth                 | Thistle, plumeless           |
| Bristly oxtongue                   | Galinsoga, hairy         | Pigweed, tumble                 | Thistle, russian             |
| Broomweed                          | Galinsoga, smallflower   | Pineapple weed                  | Thistle, scotch              |
| Buckhorn                           | Goldenrod                | Plains coreopsis (tickseed)     | Thistle, wavyleaf            |
| Bullnettle                         | Ground ivy               | Plantain, blackseed             | Thistle, yellow (horrible)   |
| Burclover                          | Groundsel                | Plantain, bracted               | Trailing crownvetch          |
| Burdock                            | Gumweed                  | Plantain, broadleaf             | Velvetleaf                   |
| Burweed, lawn (spurweed)           | Hairy fleabane           | Plantain, buckhorn              | Vervain, blue                |
| Buttercup, bulbous                 | Hawkweed, meadow         | Plantain, hoary                 | Vervain, hoary               |
| Buttercup, creeping                | Hawkweed, mouseear       | Plantain, narrowleaf            | Vervain, prostrate           |
| Buttonweed, common                 | Hawkweed, orange         | Plantain, slender               | Vervain, tall                |
| (poorjoe)                          | Hawkweed, yellow         | Plantain, woolly                | Vetch, bird                  |
| Buttonweed, virginia               | Healall                  | Poison ivy                      | Vetch, hairy                 |
| Carolina geranium (wild)           | Heartleaf drymary        | Poison oak                      | Vetch, milk                  |
| Carpetweed                         | Hemp                     | Pokeweed                        | Vetch, narrowleaf            |
| Catnip                             | Henbit                   | Prairie Sunflower               | Vetch, wild                  |
| Catsear, spotted (false dandelion) | Hoary cress              | Prickly lettuce (compass plant) | Virginia creeper             |
| Chamber bitter                     | Horsenettle              | Prickly sida                    | Western clematis             |
| Chickweed, common                  | Horseweed                | Prostrate knotweed              | Western salsify              |
| Chickweed, mouseear                | Jimsonweed               | Puncturevine                    | Wild aster                   |
| Chickweed, sticky                  | Johnny-Jumpup violet     | Purslane, common                | Wild buckweat                |
| Chicory                            | Knawel                   | Pusley, brazil                  | Wild carrot                  |
| Cinquefoil                         | Knotweed, prostrate      | Pusley, florida                 | Wild four-o-clock            |
| Clover, crimson                    | Kochia                   | Pusley, large flower            | Wild garlic                  |
| Clover, alyce                      | Lambsquarters            | Ragweed, bur                    | Wild lettuce                 |
| Clover, hop                        | Lespedeza                | Ragweed, common                 | Wild marigold                |
| Clover, rabbit foot                | Mallow, alkali           | Ragweed, lancleaf               | Wild mustard (yellow rocket) |
| Clover, red                        | Mallow, bristly          | Ragweed, western                | Wild onion                   |
| Clover, strawberry                 | Mallow, common           | Redstem filaree                 | Wild parsnip                 |
| Clover, yellow sweet               | Mallow, dwarf            | Rough cinquefoil                | Wild radish                  |
| Clover, white sweet                | Mallow, venice           | Scarlet pimpernel               | Wild rape                    |
| Clover, white                      | Marcela                  | Shepardspurse                   | Wild strawberry              |
| Cockle                             | Matchweed                | Smartweed, ladysthumb           | Wild sweet potato            |
| Cocklebur                          | Mexicanweed              | Smartweed, pale                 | Wild violet                  |
| Cocklebur, oriental                | Moneywort                | Smartweed, pennsylvania         | Woodsorrel, creeping         |
| Cocklebur, spiny                   | Morningglory, bigroot    | Smooth chaff-flower             | Woodsorrel, violet           |
| Common mullein                     | Morningglory, ivyleaf    | Smoothdock                      | Woodsorrel, yellow (Oxalis)  |
| Corn Spurry                        | Morningglory, mexican    | Sorrel, red (sheep)             | Woolly croton                |
| Creeping Beggarweed                | Morningglory, red        | Sowthistle, annual              | Wormseed                     |
| Creeping Jenny (creeping           | Morningglory, tall       | Sowthistle, spiny               | Yarrow, common               |
|                                    | Morningglory, wolly      | Spanish needles                 | Yarrow, western              |
|                                    |                          |                                 | Yarrow, yellow               |

## WHERE TO USE

**Preen One Lawn care may be used on the following established turf species:**

**Established Cool Season Turfgrass:** Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, fine fescues, tall fescue

**Established Warm Season Turfgrass:** bahiagrass, bermudagrass, buffalograss, zoysiagrass

Do not use this product on dichondra, carpetgrass or colonial bentgrass.

Do not use this product on St. Augustinegrass in Florida.

Do not use this product on turfgrass where desirable clovers are present.

If the lawn has been seeded recently, wait until after the third mowing before using this product. Do not seed, overseed or sprig the treated area for 10 weeks after application.

## USE RESTRICTIONS

The use of Preen One Lawn care on lawns and ornamental turfgrasses that are not well established, or have been weakened by stress due to mechanical operations, chemical injury, disease, insects, pests, excessive temperatures, or lack of moisture may increase the chances for turfgrass injury. Allow turfgrass weakened by these stresses to recover before application of this product. Do not use this product on or near desirable plants, including within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result.

Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches.

Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans.

Do not apply when windy.

Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

Do not exceed specified dosage for any area.

Do not use clippings from treated areas for composting or for mulching vegetables or fruit trees.

## WHEN TO APPLY

This product may be applied to established lawns as a single application or as split applications in the spring, early summer, or fall.

For the best results in the spring, apply this product one to two (1 to 2) weeks before the expected germination of crabgrass. When the period of germination for crabgrass and other weeds listed on this label extends into early summer, then a second application can be made at 6 to 10 weeks after the initial application.

**For control of crabgrass and other listed grasses:** This product is a preemergent herbicide to control crabgrass (smooth, southern and large) and other susceptible annual grasses. This product may also provide early post emergent control of crabgrass. However, post emergent crabgrass control will be obtained only when this product is applied before the first tiller stage of crabgrass.

**For broadleaf weed control:** Best results are obtained during the spring and fall when broadleaf weeds are present, young and actively growing under adequate soil moisture and favorable temperatures (50° to 80°F).

## HOW TO APPLY

This product needs to stick to the leaves of broadleaf weeds and should be applied when the grass is wet from dew or rain; poor results will occur if it is applied to dry lawns. The lawn should not be watered or disturbed for 24 hours after application. Delay mowing for 3 days after application.

Apply this product when the wind is calm. Avoid spreading granules onto flowers, vegetables, and ornamental shrubbery or desirable plants.

## HOW MUCH TO APPLY


**Kentucky bluegrass, fescue spp., perennial ryegrass, common bermudagrass, and zoysiagrass.** Apply 3.6 pounds of product per 1,000 square feet of established turfgrass.

**Hybrid bermudagrass, bahiagrass and buffalograss.** Apply 3 pounds of product per 1,000 square feet of established turfgrass.

**New York State:** Do not exceed one application at the maximum rate of 3.6 pounds of product per 1,000 sq. ft. per year (0.25 lb. active ingredient of dithiopyr per acre per year).

**Other States:** The maximum broadcast application rate is 3.6 pounds of product per 1,000 sq. ft. per application. The maximum number of broadcast applications is limited to 2 per year with a minimum of 30 days between applications. The maximum seasonal rate is 7.2 pounds of product per 1,000 sq.ft.


**These settings were calibrated and field tested. However, age and condition of spreader, speed of operation, and evenness of terrain may require slightly different settings for desired coverage.**



**Broadcast Spreader:** Apply in a single pass by starting on the outside border and apply in a circular path working toward the center.

### Broadcast Spreader Delivers 3.6 lbs./1,000 sq. ft.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Agri-Fab® Rotary                       | 4     |
| Cyclone® Rotary                        | 3 1/2 |
| Earthway® Rotary                       | 14    |
| Greenview® Jet-Spred® SS1              | 14    |
| Lesco® Rotary (dial A-S)/(number dial) | H /14 |
| Red Devil® Rotary (1-20)               | 5     |
| Republic® Rotary                       | 4     |
| Scotts® EasyGreen®                     | 23    |
| Scotts® EdgeGuard®                     | 4 1/2 |
| Scotts® SpeedyGreen® 2000, 3000        | 4 1/2 |
| Sears® Craftsman Rotary                | 4     |
| Sta-Green® Rotary (1-10)               | 2 1/2 |
| True Temper® Rotary                    | 3 1/2 |
| Vigoro® Rotary (1-10)                  | 2 1/2 |



**Drop Spreader:** First make two passes along the top of the area you'll be covering. Then make two passes along the bottom area. Then move back and forth along the long part of the lawn. On each pass, as you reach the strips at the top and bottom of the area to be covered, shut off the spreader. It's also important to shut off the spreader when you are stopped.

### Drop Spreader Delivers 3.6 lbs./1,000 sq. ft.

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Agri-Fab® Drop                 | 4     |
| Greenview® Drop-Spred® XP1     | 16    |
| Red Devil® Drop (1-5)          | 3 1/2 |
| Republic® Drop                 | 5     |
| Scotts® Drop AccuGreen® (2-18) | 6     |
| Scotts® Drop PF1 (2-18)        | 6     |
| Sta-Green® Drop (1-5)          | 3 1/2 |



**Note: if spreader model does not appear above please call toll free (800)233-1067, 8 am – 5 pm ET, Monday – Friday for additional model settings.**

# STORAGE AND DISPOSAL

**Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.**

**PESTICIDE STORAGE:** Keep in original container in a cool, dry area, away from extreme heat and direct sunlight.

Do not store near food feed, seeds or other pesticides.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

**If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## WARRANTY

**NOTE** To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

**NOTE:** Supplemental applications of lawn fertilizer are needed to achieve a minimum 1 lb. Nitrogen per 1,000 sq. ft.

### Guaranteed Analysis:

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Total Nitrogen (N)                                                        | 24%  |
| 2.8% Ammoniacal Nitrogen                                                  |      |
| 1.8% Water Insoluble Nitrogen*                                            |      |
| 16.4% Urea Nitrogen                                                       |      |
| 3.0% Other Water Soluble Nitrogen*                                        |      |
| Soluble Potash (K <sub>2</sub> O)                                         | 6%   |
| Sulfur (S)                                                                | 3.3% |
| 3.3% Combined Sulfur (S)                                                  |      |
| Derived from: Ammonium Sulfate, Methylene Ureas, Urea, Muriate of Potash. |      |
| Chlorine (Cl) not more than                                               | 5.0% |
| * 4.8% Slowly Available Nitrogen from Methylene Ureas.                    | F699 |

### PREEN GUARANTEE

To the extent consistent with applicable law, Lebanon Seaboard Corporation guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed, or your money back. If not satisfied, describe the nature of your problem, and send with proof of purchase to:

**LEBANON SEABOARD CORPORATION**

1600 EAST CUMBERLAND STREET, LEBANON, PA 17042



**1-800-233-1067**

**www.preen.com**



EPA Reg. No. 961-419

(L) (D)

EPA Est. 961-PA-01:961-IL-01

Superscript used is first letter of lot number.

Preen® is a registered trademark  
of Lebanon Seaboard Corporation.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at:  
<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

**Manufactured by Lebanon Seaboard Corporation**  
**1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042**



**PROOF OF PURCHASE**  
**COMPROBANTE DE COMPRA**

APLIQUE  
— EN —  
PRIMAVERA

# Preen<sup>®</sup> One

L A W N C A R E

CUIDADO DEL CÉSPED

**APLICACIÓN FÁCIL EN UN SOLO PASO  
PARA EL CUIDADO DEL CÉSPED DURANTE LA PRIMAVERA**



## DETIENE

el crecimiento de digitarias  
durante todas las estaciones

Se puede aplicar hasta 4  
semanas luego de la  
germinación de digitaria.



## MATA

los dientes de león  
y la mayoría de  
malezas del césped\*

Elimina 250 malezas\*  
desde la raíz.



## ALIMENTA su césped.

Alimenta el césped  
Durante 8 semanas.

\*CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO PARA VER UNA LISTA COMPLETA DE LAS MALEZAS TRATADAS.

| <h2 style="text-align: center;">Primeros auxilios</h2>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Si entra en contacto con los ojos:</b></p>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.</li> <li>• Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.</li> <li>• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li> </ul>                                                                        |
| <p><b>Si se ingiere:</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li> <li>• Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua</li> <li>• No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.</li> <li>• Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li> </ul> |
| <p><b>Si entra en contacto con la piel o la ropa:</b></p>                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quítese la ropa contaminada.</li> <li>• Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua durante 15 a 20 minutos.</li> <li>• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <p>Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.</p> <p>Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame gratis al (888) 208-1368.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Este pesticida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede tener efectos adversos en plantas que no son el objetivo del tratamiento. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida ingrese o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, canaletas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las siguientes 24 horas, ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del césped para evitar que se escurra hacia masas de agua o sistemas de desagüe.

Este producto químico tiene propiedades y características asociadas con agentes químicos detectados en agua del subsuelo. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, especialmente donde las napas de agua son de poca profundidad, puede ocasionar contaminación del agua del subsuelo. La aplicación alrededor de una cisterna o pozo puede ocasionar contaminación del agua potable o del agua del subsuelo.

Es una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

- No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación. No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado.

Este producto está formulado para controlar la mayoría de céspedes anuales y ciertas malezas de hojas anchas\* que se encuentran comúnmente en céspedes en el hogar.

Este producto contiene tres componentes: un herbicida de uso previo a la germinación, un fertilizante para césped y un herbicida para malezas de hojas anchas\*.

- El herbicida de uso previo a la germinación se puede aplicar al césped establecido para controlar pasto silvestre, cuajaleche, colas de zorro y otros pastos anuales indeseables.
- El fertilizante contiene nutrientes para la ingesta del césped.
- El herbicida para hojas anchas posterior a la germinación controla más de 250 tipos de maleza de césped\* incluido el diente de león, la ortiga mansa, el cardo y el trébol.

En esta etiqueta puede encontrar una lista de malezas de hoja ancha.

\*Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas tratadas.

|                           |                                 |                       |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Amaranto púrpura          | Raspasayos                      | Trébol campestre      |
| Amaranto delgado          | Escobilla                       | Trébol pata de conejo |
| Áster ericoides           | Cholla espinosa                 | Trébol rojo           |
| Áster ericoides blanco    | Solano de Carolina              | Trébol fresa          |
| Áster púrpura             | Trébol de caretilla             | Trébol dulce amarillo |
| Áster White Prairie       | Bardana                         | Trébol dulce blanco   |
| Alcachofa                 | Cadillo (hierba de pollo)       | Trébol blanco         |
| Radicula austríaca        | Ranúnculo bulboso               | Cizaña                |
| Amor del hortelano        | Ranúnculo rastrero              | Cardo ajonjoneiro     |
| Gallo blanco              | Hierba de botón común           | Guisaso de caballo    |
| Gallo boreal              | (poorjoe)                       | Cepa caballo          |
| Gallo del bosque          | Hierba de botón de Virginia     | Verbasco              |
| Amor seco peludo          | Geranio de Carolina (silvestre) | Espérgula             |
| Estáquida de Florida      | Culantrillo                     | Mazote rastrero       |
| Correhuela                | Hierba gatera                   | Lysimachia nummularia |
| Correhuela mayor          | Hierba del chanco (falso        | (hierba de la moneda) |
| Mastuerzo amargo de Santa | diente de león)                 | Botón rosado          |
| Bárbara                   | Flor escondida                  | Siempreviva           |
| Mastuerzo amargo peludo   | Pamplina común                  | Margarita inglesa     |
| Hierba amarga             | Álsine oreja de ratón           | Margarita mayor       |
| Rudbeckia                 | Álsine pegajosa                 | Diente de león común  |
| Lupulina                  | Achicoria                       | Falso diente de león  |
| Flor de sangre            | Cincoenrama                     | Comelina              |
| Lechuga azul              | Trébol encarnado                | Ortiga blanca         |
| Botón de oro              | Trébol de Sabana                | Oreja de ratón        |

|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Oreja de ratón            | Lippia                    | Hierba carmín                 |
| Lengua de vaca            | Caperonia                 | Girasol silvestre             |
| Romaza                    | Hierba de la moneda       | Escarola (Cansisila)          |
| Flamenquilla              | Ipomoea de raíz grande    | Atata hembra                  |
| Manzanilla loca           | Ipomoea hoja de hiedra    | Sanguinaria postrada          |
| Acaricoba (Pennywort)     | Ipomoea mexicana          | Abrojo                        |
| Croton                    | Ipomoea roja              | Verdolaga común               |
| Sauco rojo                | Ipomoea alta              | Yerba del sapo                |
| Alegria falsa             | Ipomoea lanuda            | Ipecacuana de Florida         |
| Girasol falso             | Artemisa pegajosa         | Ipecacuana de flores grandes  |
| Ortigailla                | Artemisa                  | Estafiate                     |
| Afilierillo               | Mostaza negra             | Ambrosia común                |
| Hierba almizclera         | Mostaza azul              | Ambrosia bidentata            |
| Erigeron annuus, (anual)  | Erisimo                   | Ambrosia americana            |
| Erigeron strigosus        | Mostaza india             | Afilierillo                   |
| Estrellita venenosa       | Pamita                    | Potentilla norvegica          |
| Albahaca silvestre        | Nabón                     | Pimpinela escarlata           |
| Vara de oro               | Mostaza blanca            | Bolsa de pastor               |
| Hierba rastrera           | Erysimum cheiranthoides   | Persicaria                    |
| Senecio                   | Ortiga espinosa (picante) | Persicaria pálida             |
| Grindelia                 | Ortiga verde              | Persicaria de Pennsylvania    |
| Rama negra                | Laportea canadensis       | Tapón                         |
| Vellosilla de prado       | Alquimilla arvense        | Romaza suave                  |
| Vellosilla oreja de ratón | Chirivía                  | Amargosa                      |
| Vellosilla anaranjada     | Clavelito antártico       | Cerraja anual                 |
| Vellosilla amarilla       | Mostacilla (carraspaque)  | Cerraja espinosa              |
| Hierba del carpintero     | Lepidio perenne           | Bidente                       |
| Golondrina                | Lentejilla de campo       | Verónica de dos lóbulos       |
| Cañamo                    | (Peppergrass)             | Verónica común                |
| Ortiga mansa              | Bledo postrado            | Verónica arvensis             |
| Mastuerzo oriental        | Yuyo colorado             | Verónica hoja de yedra        |
| Solano americano          | Amaranto                  | Verónica persa                |
| Coniza                    | Cenizo suave              | Verónica peregrina            |
| Higuera loca              | Bledo blanco              | Verónica delgada              |
| Violeta Johnny-Jumpup     | Hierba de la piña         | Verónica de nieve             |
| Escleranto (Flor de Bach) | Bella Diana (Coreopsis)   | Verónica oltensis             |
| Sanguinaria postrada      | Plantago rugelii          | Bledo espinoso                |
| Pinillo                   | Plantago patagónico       | Hierba de golondrina          |
| Cenizo                    | Llantén                   | Hierba de golondrina postrada |
| Trébol de los prados      | Llantén peludo            | Hierba de pollo               |
| Malvella leprosa          | Llantén medio             | Estrella de Belén             |
| Pila-pila                 | Llantén de hoja estrecha  | Fresa de la India             |
| Malva común               | Llantén delgado           | Hierba de Santiago            |
| Malva enana               | Ispágula                  | Pólígono anfibio              |
| Aurora                    | Hiedra venenosa           | Cardo bendito                 |
| Marcela                   | Árbol de las pulgas       | Cardo común                   |

Cardo negro  
Cardo Flodman (de pradera)  
Cardo pendiente  
Cardo (Cirsium canescens)  
Cardo chileno  
Cardo ruso  
Cardo escocés  
Cardo de hoja ondulada  
Cardo amarillo (horrible)  
Coronilla varía rastrera  
Abutilon  
Verbena azul  
Verbena stricta  
Verbena postrada  
Verbena alta  
Veza de pájaro

Veza vellosa  
Astrágalo  
Algarroba  
Vicia  
Enredadera de Virginia  
Clemátide occidental  
Salsifi occidental  
Áster silvestre  
Enredadera anual  
Zanahoria silvestre  
Dondiego silvestre  
Ajo del oso  
Lechuga silvestre  
Chinchilla  
Mostaza silvestre (berro  
silvestre)

Cebolla silvestre  
Chirivía silvestre  
Rabizón  
Rabaniza  
Fresa silvestre  
Camote silvestre  
Violeta silvestre  
Acedera menor rastrera  
Acedera menor violeta  
Acedera menor amarilla  
(Oxalis)  
Hierba de cabra  
Santónico  
Milenrama común  
Milenrama occidental  
Milenrama amarilla

## CUÁNDO APLICAR

Este producto puede aplicarse a los céspedes establecidos como una aplicación única o como aplicaciones en secuencia en la primavera, a principios del verano o en el otoño  
Para obtener los mejores resultados en la primavera, aplique este producto una a dos (1 a 2) semanas antes de la germinación esperada del pasto silvestre. Cuando el período de germinación del pasto silvestre y otras malezas mencionadas en esta etiqueta se extiende hasta el principio del verano, se puede realizar una segunda aplicación entre 6 a 10 semanas después de la aplicación inicial.

**Para el control del pasto silvestre y otros pastos que se mencionan:** este producto es un herbicida de uso previo a la germinación para controlar el pasto silvestre (suave, del sur y grande) y otros pastos anuales susceptibles. Este producto también puede proporcionar un control anticipado del pasto silvestre cuando ya ha germinado. Sin embargo, el control del pasto silvestre cuando ya ha germinado sólo se obtendrá cuando este producto se aplique antes de la primera etapa de arado del pasto silvestre.

**Para el control de maleza de hoja ancha:** los mejores resultados se obtienen durante la primavera y el otoño, cuando las malezas de hoja ancha están presentes, jóvenes y creciendo activamente gracias a la humedad adecuada del suelo y las temperaturas favorables (10° C a 26° C).

## CÓMO APLICAR

Este producto debe adherirse a las hojas de las malezas de hoja ancha y debe aplicarse cuando el césped esté mojado debido al rocío o la lluvia; se obtendrán resultados pobres si se aplica a céspedes secos. No se debe regar ni alterar el césped por 24 horas después de la aplicación.  
Evite podar durante 3 después de la aplicación.  
Aplique este producto cuando el viento esté calmó. Evite que se esparzan los gránulos sobre flores, hortalizas y arbustos ornamentales o plantas deseadas.

## CUÁNTO APLICAR

**Césped azul de Kentucky, festuca spp., festuca alta, césped bermuda común y césped zoysia:**  
Aplique 1,63 kg del producto por cada 92,9 m² de césped.

**Césped Bermuda híbrido, césped bahía y hierba búfalo.** Aplique 1,36 kg del producto por cada 92,9 m² de césped.

**Estado de Nueva York:** No exceda una aplicación a la relación máxima de 1,63 kg de producto por 92,9 m² por año (0,11 kg de ingrediente activo de ditiopir por acre al año).

**Otros estados:** La dosis máxima de aplicación es de 1,63 kg de producto por cada 92,9 m² por aplicación. La cantidad máxima de aplicaciones por dispersión se limita a 2 por año, con un mínimo de 30 días entre aplicaciones. La dosis máxima por temporada es de 3,26 kg de producto por cada 92,9 m²


**Preen One Lawn care se puede usar en las siguientes especies de césped establecido:**  
**Césped establecido de temporada templada:** azul de Kentucky rastrero, césped de centeno perenne, festuca fina, festuca alta  
**Césped establecido de temporada cálida:** Césped bahía, césped Bermuda, hierba búfalo, césped zoysia  
No aplique este producto sobre césped oreja de ratón, alfombra ni agrostis colonial.  
No utilice este producto en céspedes San Agustín en Florida.  
No use este producto en césped que presente tréboles deseados.

Si el césped se ha sembrado recientemente, espere hasta la tercera poda antes de usar este producto. No siembre, vuelva a sembrar ni siembre en ramitas en el área tratada durante las 10 semanas posteriores a la aplicación.

**RESTRICCIONES DE USO**  
El uso de fertilizante Preen One Lawn care en céspedes y céspedes ornamentales que no están bien establecidos o que han sido debilitados por el estrés debido a la operación mecánica, las lesiones químicas, las enfermedades, los insectos, las plagas, las temperaturas excesivas o la falta de humedad puede aumentar las posibilidades de daño del césped. Permita que el césped debilitado por estos problemas se recupere antes de aplicar este producto.  
No use este producto en plantas deseadas o cerca de ellas, incluida la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos deseados, ya que puede provocar daños.  
No lo aplique directamente en el agua, desagües de aguas pluviales, canaletas, cloacas o zanjas ni cerca de éstos.  
No lo aplique a menos de 7,62 metros de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos.  
No lo aplique bajo condiciones de viento.  
Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o la calle llevándolo de vuelta al césped. Para evitar que el producto oscuro, no riegue en exceso las áreas tratadas ni aplique cuando esté lloviendo o cuando se esperen lluvias durante del día.  
No exceda la dosis indicada para cualquier área.  
No use césped cortado de las áreas tratadas para convertir vegetales o árboles frutales en abono o compuestos orgánicos.


Estas graduaciones se calibraron y probaron en el terreno. Sin embargo, la antigüedad y el estado del esparcidor, la velocidad de operación y la uniformidad del terreno pueden hacer que se necesiten graduaciones diferentes para la cobertura deseada.

| El esparcidor por voleo                | proporciona 1,63 kg/92,9 m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Agri-Fab® Rotary                       | 4                                       |
| Cyclone® Rotary                        | 3 1/2                                   |
| Earthway® Rotary                       | 14                                      |
| Greenview® Jet-Spned® SS1              | 14                                      |
| Lesco® Rotary (dial A-S)/(number dial) | H /14                                   |
| Red Devil® Rotary (1-20)               | 5                                       |
| Republic® Rotary                       | 4                                       |
| Scotts® EasyGreen®                     | 23                                      |
| Scotts® EdgeGuard®                     | 4 1/2                                   |
| Scotts® SpeedyGreen® 2000, 3000        | 4 1/2                                   |
| Sears® Craftsman Rotary                | 4                                       |
| Sta-Green® Rotary (1-10)               | 2 1/2                                   |
| True Temper® Rotary                    | 3 1/2                                   |
| Vigoro® Rotary (1-10)                  | 2 1/2                                   |



**Esparcidor por dispersión:** Realice la aplicación en una sola pasada comenzando en el borde externo y avanzando hacia el centro de manera circular.

| El esparcidor por voleo        | proporciona 1,63 kg/92,9 m <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Agri-Fab® Drop                 | 4                                       |
| Greenview® Drop-Spned® XP1     | 16                                      |
| Red Devil® Drop (1-5)          | 3 1/2                                   |
| Republic® Drop                 | 5                                       |
| Scotts® Drop AccuGreen® (2-18) | 6                                       |
| Scotts® Drop PF1 (2-18)        | 6                                       |
| Sta-Green® Drop (1-5)          | 3 1/2                                   |



**Esparcidor por voleo:** Primero, realice dos pasadas por la parte superior del área que desea cubrir. Luego, realice dos pasadas por la parte inferior. A continuación, muévelo hacia delante y hacia atrás por la parte larga del césped. En cada pasada, al alcanzar los bordes en la parte superior e inferior del área que desea cubrir, apague el esparcidor. También es importante que lo apague al finalizar.

**Nota:** Si su modelo de esparcidor no se mencionó anteriormente, llame gratis al (800)233-1067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este, para obtener graduaciones para modelos adicionales.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenarlo o eliminarlo.

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Conserve en el recipiente original en un área fresca, seca y alejada del calor extremo y la luz solar directa. No almacene cerca de alimentos, semilla u otros pesticidas.

**ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:** El envase no se puede rellenar. No vuelva a utilizar ni llenar este envase.

**Si está vacío:** Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca coloque productos que no utiliza debajo de ningún drenaje externo o interno.

### GARANTÍA

**NOTA:** En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

**NOTA:** La aplicación suplementaria del fertilizante para césped debe alcanzar un mínimo de 0,45 kg (1 lb) de nitrógeno por cada 92,9 m<sup>2</sup> 1000 (pies cuadrados).

### Análisis garantizado:

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nitrógeno total (N) .....                                                         | 24%  |
| 2,8% de nitrógeno amoniacal .....                                                 |      |
| 1,8% de nitrógeno insoluble en agua* .....                                        |      |
| 16,4% de nitrógeno de urea .....                                                  |      |
| 3,0% de otro nitrógeno soluble en agua* .....                                     |      |
| Potasa soluble (K <sub>2</sub> O) .....                                           | 6%   |
| Azufre (S) 3,3% (S) .....                                                         | 3.3% |
| 3,3% de azufre (S) combinado .....                                                |      |
| Derivado de: Sulfato de amonio, ureas de metileno, urea y muriato de potasa ..... |      |
| Cloro (Cl) no más de 5,0% .....                                                   | 5.0% |
| * 4,8% de nitrógeno asequible lentamente de ureas de metileno .....               | F699 |

La información relacionada con el contenido y los niveles de metales en este producto se encuentra disponible en Internet en:

<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

### GARANTÍA PREEN

En la medida en que lo permita la ley vigente, Lebanon Seaboard Corporation le garantiza que, si usted no queda satisfecho con el producto luego de usarlo como se indica, se le reembolsará su dinero. Si no está satisfecho, describa la naturaleza de su problema y envíelo con el comprobante de compra a:

LEBANON SEABOARD CORPORATION  
1600 EAST CUMBERLAND STREET, LEBANON, PA 17042



1-800-233-1067

[www.preen.com](http://www.preen.com)



EPA Reg. No. 961-419

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation.

(L) (D)

EPA Est. 961-PA-01:961-IL-01

El superíndice usado es la primera letra del número

**Fabricado por Lebanon Seaboard Corporation**  
**1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042**

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 2,4-D, éster 2-etil hexil ..... | 1,108%   |
| Ácido Mecoprop-p .....          | 0,167%   |
| Ácido Dicamba .....             | 0,071%   |
| Ditiopir .....                  | 0,160%   |
| OTROS INGREDIENTES: .....       | 98,494%  |
| TOTAL .....                     | 100,000% |

#### ESTE PRODUCTO CONTIENE:

6.66 kg de ácido 2,4-diclorofenoxiacético equivalente por tonelada o 0,735%. (CAS 1928-43-4)  
1,51 kg de ácido propiónico (+)-(R)-2-(2 metil-4-clorofenoxi) equivalente por tonelada o 0,167% (CAS 16484-77-8)  
0,64 kg de ácido 3,6-dicloro-o-anísico equivalente por tonelada o 0,071%. (CAS 1918-00-9)  
1,45 kg de ditiopir por tonelada o 0,160% (CAS 97886-45-8)  
Isomer Specific By AOAC Methods.

**Estado de Nueva York: No exceda una aplicación a la tasa máxima de producto por 1.000 pies cuadrados. Por año (0,25 libras de ditiopir por acre por año).**