

3.75"

7.03"

7.28

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

SATISFACTION 100% GUARANTEED

Disease Control

for Roses, Flowers & Shrubs

CONCENTRATE

Systemic Formula Controls & Prevents Diseases[†]

Fórmula sistémica - controla y previene las enfermedades[†]

- **Black Spot**
- **Powdery Mildew**
- **Rust**

& other listed diseases

Makes 42 Gallons of spray

Rainproof Protection

Active Ingredients:
 Tebuconazole 2.9%
 Other Ingredients 97.1%
 Total 100.0%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel booklet for additional precautionary statements

†Listed diseases

Not for sale, distribution or use in New York State.

NET CONTENTS 32 FL. OZ. (946ml)

51432916 17121971

4.0"

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere, inhala o absorbe por la piel.
- Si se lava las manos con abundante agua y jabón luego de manejar el producto y antes de comer, beber, consumir goma de mascar o usar tabaco, reducirá la exposición.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la vestimenta.
- Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de un nuevo uso puede evitar la exposición.
- Evitar respirar el vapor o el rocío.
- Al usar este producto, usar camiseta de mangas largas, pantalones largos, calcetines, calzado y guantes de goma.

PRIMEROS AUXILIOS †

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito salvo que así lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN

- Si se ve afectada la respiración, llevar a la persona al aire libre.
- Si no respira, pedir una ambulancia y practicar respiración artificial.
- Contactar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para más consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener la etiqueta del producto a mano al llamar a un centro de control de envenenamiento. Si busca tratamiento en una sala de emergencias o en el consultorio de un médico, lleve esta etiqueta del producto para mostrársela al personal médico.

Puede llamar al número gratuito 877-229-3763 para solicitar información médica de emergencia.

Ingrediente activo: 2.9% de tebuconazol (CAS# 107534-96-3).

RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos.
- El agua del lavado o escurrimiento puede ser peligrosa para los organismos acuáticos presentes en las aguas adyacentes a las áreas tratadas.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en bocas de tormenta, acequias, cunetas o aguas superficiales. La aplicación del producto con viento calmo o cuando no se pronostica lluvia para las próximas 24 horas ayudará a garantizar que ni el viento ni la lluvia eliminen el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que el agua se escurra hacia cuerpos de agua o sistemas de desagüe.

NOTA: Mediante investigación y pruebas se ha determinado que las "Instrucciones de uso" son adecuadas para el uso correcto de este producto bajo condiciones esperadas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no se lo usa de acuerdo con las indicaciones.

***Garantía de devolución de dinero:** Si no está satisfecho con este producto, con gusto le devolveremos el precio de compra original.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS



OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions



- **Controls All Listed Fungal Diseases That Harm Roses, Flowers, Trees and Shrubs**
- **Rainproof Protection - Won't Wash Off Once it is Dry**
- **Controls Listed Diseases and Restores Beauty to Plants**

CONTROLS Anthracnose, Black Spot, Flower Blight, Leaf Spot, Petal Blight, Powdery Mildew, Rust, Scab, Southern Blight, Boxwood Blight

WHERE TO USE

- Roses and Flowers
- Azaleas, Camellias, and Rhododendrons
- Landscape Trees & Shrubs
- Ground Covers & Vines
- Houseplants

WHEN TO USE

- To treat an existing disease†
- To prevent and protect against future listed diseases

COVERAGE Makes up to 42 gallons of spray solution



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724, or visit us on-line at www.BioAdvanced.com

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT:	
Tebuconazole	2.90%
OTHER INGREDIENTS	97.10%
TOTAL	100.00%

EPA Reg. No. 92564-5

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 92564-TX-1 (39) = 58996-MO-1
(01) = 3125-MO-1 (57) = 071106-GA-003



51425682b 171213V1

†listed

6.375"

3.5"

3.5"

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE

- Do not apply near lakes, streams, rivers, or ponds.
- Do not apply to plants grown for food.
- Food utensils such as measuring spoons and measuring cups must not be used for food purposes after use with fungicides.
- Move indoor houseplants outside before treating.

HOW TO USE **Shake Well Before Use**

- Determine how much spray solution to make up – See “How Much to Use”.
- Make up spray solution by following directions specific to your sprayer – See “Sprayer Types”.
- Wet all plant surfaces until evenly coated with spray, but not dripping.

HOW MUCH TO USE

Add ¾ fl. oz. (1 ½ TBS) to 1 gallon of water

SPRAYER TYPES

PUMP STYLE SPRAYERS

1. Add the appropriate amounts of concentrate and water to the sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize.
3. Adjust nozzle to a coarse spray pattern and apply.
4. Occasionally re-pressurize the sprayer if needed to maintain a good spray pattern.



DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYERS

1. Fill sprayer jar with enough concentrate for the area to be treated. DO NOT ADD WATER.
2. Close sprayer and set dial as recommended below:
 - Ortho Dial 'N Spray Setting: 1 TBSP
 - Chameleon Hose-End Sprayer Setting: 1 TSP



TIP: The numbers on dial indicate amount of concentrate per gallon of spray.

3. Hook to garden hose and apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.
4. Pour any unused product back into this original container.

CONCENTRATE PLUS WATER HOSE-END SPRAYERS

1. Pour concentrate into sprayer jar to the required fluid ounce level.
2. Add the appropriate amount of water to the gallons level.
3. Replace sprayer top and shake well.
4. Attach sprayer to hose and apply.



DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

PLANTS	CONTROLS PLANT DISEASES	WHEN TO APPLY	
		To Prevent Diseases	To Treat Existing Disease
Roses	Black Spot Powdery Mildew Rust	Apply every 14 days during the growing season, starting when leaves first appear.	Apply every 14 days for a total of 3 applications beginning at the first sign of disease. Single application rate is 0.0014 lb a.i./gal.
Flowers	Leaf Spot Powdery Mildew Rust Southern Blight	Apply no more than 3 times per year, 14 days apart, beginning with Spring bud break. Single application rate is 0.0014 lb a.i./gal.	
Crabapples (Ornamental), Dogwoods and Other Landscape (Ornamental) Trees	Anthracnose Leaf Spot Powdery Mildew Rust Scab	Petal Blight - Apply 2-3 times per week into the flowers as they open and develop color.	
Azaleas, Camellias, Rhododendrons and Other Landscape (Ornamental) Shrubs	Anthracnose Black Spot Leaf Spot Powdery Mildew Rust		
Ground Covers and Vines	Southern Blight		
Houseplants	Leaf Spot Powdery Mildew	Apply no more than 3 times per year, 14 days apart.	
Boxwood	Boxwood Blight	Apply this product 3 times at 14 day intervals when conditions are conducive to disease development (64 – 80°F, high humidity/rain /overhead irrigation). Single application rate is 0.0014 lb a.i./gal.	Contact your local Extension Office for disease confirmation and if positive, destroy the infected plant(s) in a manner that will minimize exposure to other boxwoods.

6.375"

3.5"

3.5"

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

FOR BEST RESULTS

- Apply at the shorter interval specified under "Directions for Use" when disease or conditions favorable to disease (generally cloudy, wet and warm weather) are present.
- Prevent damage to your plants caused by disease by starting a spray schedule when diseases are likely in your area.
- For more information on what you can do to control plant diseases, contact your local County Extension Service (usually found in the White Pages of the phone book under the name of your county).

HOW IT WORKS

This product provides 3-way action: it kills existing fungi, forms a protective barrier on the outside of the plant and is absorbed into the plant to keep on protecting regardless of weather conditions (up to 2 weeks).

RESTRICTIONS

- Do not exceed 3 applications per year.



Do not allow people and pets to enter the treated area until sprays have dried.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

CONTAINER HANDLING

Nonrefillable Container. Do not reuse or refill this container.

If Empty:

- Place empty container in trash or offer for recycling, if available.

If Partly Filled:

- If it is necessary to dispose of unused product, please call your local solid waste agency or you may call toll-free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Important: Use all of the product in accordance with label directions. If it is necessary to dispose of unused product, please follow any applicable state or local guidelines.

¡LEA LA ETIQUETA PRIMERO!

DATOS RÁPIDOS

- **Controla las principales enfermedades de la lista que dañan a las rosas, flores y arbustos.**
- **Protección para lluvia: no se lava una vez secado**
- **Controla las enfermedades de la lista y devuelve la belleza a las plantas**

CONTROLES

Antracnosis, mancha negra, Ciborinia camilliae, mancha de la hoja, plaga del pétalo, mildiú polvoriento, roya, sarna, tizón del sur, tizón del boj.

DÓNDE USAR

- Rosas y flores
- Azaleas, camelias y rododendros
- Árboles y arbustos para paisajismo
- Cubresuelos y enredaderas
- Plantas de hogar

CUÁNDO USAR

- Para tratar una enfermedad[†] existente
- Para prevenir y evitar futuras enfermedades de la lista

COBERTURA

Puede preparar hasta 42 galones de solución para rociar



Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724 o visítenos en línea en www.BioAdvanced.com

INGREDIENTE ACTIVO:

Tebuconazol 2.90%

OTROS INGREDIENTES 97.10%

TOTAL 100.00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

El uso de este producto de una forma no consistente con la indicada en su etiqueta es una violación a la ley federal.

Para un mejor resultado, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR

- No aplicar cerca de lagos, arroyos, ríos o lagunas.
- No aplicar a plantas cultivadas de alimentos.
- Los utensilios de alimentación como cucharas y tazas para medir no deben ser usados para comer luego del uso con pesticidas.
- Sacar al exterior las plantas de hogar antes de tratarlas.

CÓMO USAR Agitar bien antes de usar

- Determinar cuánta solución de rociado se debe preparar - Ver "Cuánto usar".
- Prepare la solución de rociado siguiendo las instrucciones específicas para su rociador - Ver "Tipos de rociadores".
- Humedecer todas las superficies de las plantas hasta recubrir en forma pareja con rocío, sin gotear.

CUÁNTO USAR

Agregar 3/4 onzas líquidas (1 1/2 cuch) para 1 galón de agua.

[†]de la lista

(continuación)

6.375"

3.5"

3.5"

Book Placement

3.50"



Disease Control

for Roses, Flowers & Shrubs CONCENTRATE

This product controls, stops and prevents plant diseases†. This systemic formula provides rainproof protection against most common plant diseases such as black spot, powdery mildew, and rust. Now it is easier than ever to prevent diseases† and have beautiful plants.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin.
- Washing hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco will reduce exposure.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Removing and washing contaminated clothing before reuse may reduce exposure.
- Avoid breathing vapor or spray mist.
- When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.

FIRST AID †

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED

- If breathing is affected, move person to fresh air.
- If not breathing, call an ambulance and give artificial respiration.
- Contact doctor or poison control center for further treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

You may call toll-free 877-229-3763 for medical emergency information.

Active Ingredient: 2.9% Tebuconazole (CAS# 107534-96-3).

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to aquatic invertebrates.
- Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

***Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price. †listed

EPA Reg. No. 92564-5

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 92564-TX-1 (39) = 58996-MO-1 (01) = 3125-MO-1 (57) = 071106-GA-003


BioAdvanced is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

Book Placement
6.375"

8.125"

4.0"



INDICACIONES DE USO (continuación)

TIPOS DE ROCIADORES

ROCIADORES ESTILO BOMBA

1. Agregar la cantidad que corresponda de concentrado y agua al tanque del rociador.
2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar.
3. Ajustar la boquilla hasta lograr un rocío grueso y aplicar.
4. Ocasionalmente volver a presurizar el rociador si fuese necesario para mantener un buen patrón de rocío.



ROCIADORES DE EXTREMO DE MANGUERA ESTILO DIAL

1. Llenar la jarra con suficiente concentrado para el área a tratar. NO AGREGAR AGUA.
2. Cerrar el rociador y configurar el dial tal como se recomienda abajo:

- Configuración del rociador Ortho Dial[®] N: 1 cucharada
- Configuración del rociador de extremo de manguera Chameleon: 1 cucharada



CONSEJO: El número en el dial indica la cantidad de concentrado por galón de rocío.

3. Colocar la manguera del jardín y aplicar.

Para evitar contacto con el área tratada, comience por rociar el área más lejana del grifo y camine hacia atrás a medida que rocia

4. Verter todo producto no usado nuevamente en el contenedor original.

ROCIADORES DE CONCENTRADO Y AGUA CON EXTREMO DE MANGUERA

1. Vierta el concentrado en el frasco rociador al nivel requerido en el nivel de onzas de líquido.
2. Añada la cantidad adecuada de agua al nivel de galones.
3. Cambie la tapa del rociador y agite bien.
4. Ajuste el rociador a la manguera y aplique.



PLANTAS	ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS	CUÁNDO APLICAR	
		Para evitar enfermedades	Para tratar enfermedades existentes
Rosas	Mancha negra mildiu polvoriento roya	Aplicar cada 14 días durante la época de crecimiento, comenzando cuando aparecen las primeras hojas.	Aplicar cada 14 días hasta un máximo de 3 aplicaciones a partir de la primera señal de enfermedad. La tasa de aplicación única es de 0.0014 lb a.i./gal.
Flores	Manchas en las hojas mildiu polvoriento roya tizón del sur	No aplicar más de 3 veces por año, con 14 días de distancia, comenzando con la aparición de los brotes en primavera. La tasa de aplicación única es de 0.0014 lb a.i./gal.	
Manzano silvestre (ornamental), cornejo y otros árboles (ornamentales) para paisajismo	Antracnosis mancha negra mildiu polvoriento roya sarna	Plaga del pétalo: aplicar 2 a 3 veces por semana en las flores en cuanto se abren y desarrollan color.	
Azaleas, Camelias, Rododendros y otros arbustos (ornamentales) para paisajismo	Antracnosis mancha negra mancha de la hoja plaga del pétalo mildiu polvoriento roya tizón del sur		
Cubresuelos y enredaderas			
Plantas de hogar	Mancha de la hoja mildiu polvoriento	No aplicar más de 3 veces por año, con 14 días de distancia.	

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

PLANTAS	ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS	CUÁNDO APLICAR
Boj	Plaga del boj	Aplicar este producto 3 veces con intervalos de 14 días cuando las condiciones son propicias para el desarrollo de enfermedades (64 a 80 °F, alta humedad/luvia/irrigación superior). La tasa de aplicación única es de 0.0014 lb a.i./gal. Comuníquese con su Oficina de Extensión local para confirmar la presencia de una enfermedad, y, de haberla, destruya las plantas infectadas de forma que se minimice la exposición a otros bojés.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplicar en el intervalo más corto según lo especificado en "Instrucciones de uso" ante enfermedades o condiciones propicias para las enfermedades (generalmente, clima con nubes, húmedo y cálido).
- Evite el daño causado por las enfermedades iniciando un cronograma de rociado cuando puedan aparecer enfermedades en su zona.
- Para obtener más información sobre qué se puede hacer para controlar las enfermedades de las plantas, comuníquese con el Servicio de Extensión de su condado (normalmente figura en las páginas blancas del registro telefónico bajo el nombre de su condado).

CÓMO FUNCIONA

Este producto ofrece acción en 3 formas: mata los hongos existentes, forma una barrera protectora sobre el exterior de la planta, y es absorbido por la planta para seguir protegiéndola sin importar las condiciones del clima (hasta 2 semanas).

RESTRICCIONES

- No sobrepasar las 3 aplicaciones por año.



No deje que personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el rocío se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contaminar alimentos, agua o alimentaciones por almacenamiento o eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en su contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete de almacenamiento bajo llave. Proteger del congelamiento.

MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR



Contenedor no rellenable. No reusar o rellenar este contenedor.

Si está vacío:

- Colocar el contenedor vacío en la basura para su reciclado si fuese posible.

Si está parcialmente lleno:

- Si es necesario deshacerse del producto sin utilizar, llame a su agencia local de eliminación de desechos sólidos o llame sin cargo al 1-877-229-3724 para recibir indicaciones.
- Nunca apoye el producto sin usar sobre drenajes internos o externos.

Importante: Use todo el producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Si es necesario deshacerse del producto no usado, siga cualquier lineamiento estatal o local que corresponda.

6.375"

3.5"

3.5"