

For outdoor use around residential sites only
Solo para usar en espacios exteriores alrededor de sitios residenciales



Fire Ant

KILLER GRANULES

INSECTICIDA GRANULADO
PARA HORMIGAS BRAVAS

Works Fast

- Treats 272 Mounds
- Deep-Reaching Formula
- Funciona rápido
- Trata 272 hormigueros
- Fórmula de alcance profundo



Active Ingredient:
 *Bifenthrin0.115%
 Other Ingredients99.885%
 100.000%

*Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum.

Net Wt 7 lb (3.18 kg)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See additional precautionary statements on back of bag.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior de la bolsa para conocer las declaraciones preventivas adicionales.



Fire Ant KILLER GRANULES

INSECTICIDA GRANULADO PARA HORMIGAS BRAVAS

Net Wt 7 lb (3.18 kg)

For outdoor use around residential sites only
Solo para usar en espacios exteriores alrededor de sitios residenciales



Fire Ant

KILLER GRANULES

INSECTICIDA GRANULADO
PARA HORMIGAS BRAVAS

Works Fast

- Treats 272 Mounds
- Deep-Reaching Formula
- Funciona rápido
- Trata 272 hormigueros
- Fórmula de alcance profundo



Active Ingredient:
*Bifenthrin.....0.115%
Other Ingredients99.885%
100.000%

*Cis isomers 97% minimum, trans isomers
3% maximum.

Net Wt 7 lb (3.18 kg)

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See additional precautionary
statements on back of bag.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte la parte posterior de la bolsa para
conocer las declaraciones preventivas adicionales.



Fire Ant *KILLER GRANULES*

INSECTICIDA GRANULADO PARA HORMIGAS BRAVAS

Net Wt 7 lb (3.18 kg)

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of runoff.

Do not make applications during the rain.

Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

General Instructions

Real-Kill® Fire Ant Killer Granules is for use on lawns, around home foundations (perimeter treatment), ornamental and flower gardens and vegetable gardens for the control of the insect pests listed in the table below.

Lawns • Apply this product when insect activity or damage is first observed (lawn thins, brown spots appear or moths fly up from the grass when mowed). • Spread this product uniformly over lawn at the rates listed using the suggested spreader settings. For best results, use a mechanical spreader. • Water in product after application. • Do not use any other weed, disease or insect control products for at least one week after application. • For best results and to prevent further damage, treat the entire lawn, not just the browned areas. • Repeat application if there are signs of renewed insect activity.

NOTE: Food utensils such as tablespoons/teaspoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.

Pest	Application Rate
Ants (including Carpenter, Red Harvester, Odorous, Pyramid, Argentine, Pharaoh, Black Turf, Fire Ants and Foraging Fire Ants), Armyworms (including Lawn Armyworm, Fall Armyworm), Billbugs (including Bluegrass Billbug, Hunting Billbug), Black Turfgrass Ataenius (adults), Bristletail, Chiggers, Chinch Bugs, Crickets, Cutworms (including Black Cutworm, Bronzed Cutworm, Granulate Cutworm, Variegated Cutworm), Dichondra Flea Beetle, Earwigs, European Crane Fly, Fiery Skipper, Fire Brat, Fleas, Fruit Fly, Grasshoppers, Greenbug, Ground Beetles, Ground Pearl, Leaf Hoppers, Lucerne Moth, Mealybugs, Mole Crickets (including Tawny Mole Cricket, Southern Mole Cricket, Short-Winged Mole Cricket), Pillbugs, Seed Maggots, Spiders, Springtails, Striped Grassworm, Ticks (including Ticks that may transmit Lyme Disease), Two-Lined Spittle Bugs, Webworms (including Sod Webworm, Grass Webworm, Tropical Sod Webworm), Weevils (including Hyperodes, Bluegrass), Wireworms	Uniformly apply 1 to 2 lb over a 1,000 sq ft area of lawn using a spreader. For 3 month control, apply 1 lb of product per 250 sq ft. For best results, thoroughly water the treated area after application. For Fire Ant Mounds : Uniformly apply 1 Tbsp or 3 tsp of granules to the surface of each mound. For best results apply in cool weather, 65°F to 80°F, in early morning or late evening hours. Avoid disturbing ants. Treat new mounds as they appear. Thoroughly water the treated area after application.
Centipedes, Millipedes, Pavement Ants	Uniformly apply 1 lb per 250 sq ft area of lawn. For best results, thoroughly water the treated area after application.
Mole Crickets	Uniformly apply 1 to 2 lb over 500 sq ft. For best results, treat in late spring and water thoroughly after application.
In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (lawns) within 100 ft of a water body (lake, pond, river, stream, wetland or drainage ditch). In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.	

Ornamentals & Flowers • This product can be applied just before planting or after plants emerge. • Apply 0.5 lb* to 1 lb evenly over each 500 sq ft area. Repeat if there are signs of renewed insect activity.

Home Foundation/Barrier Treatment • Evenly apply a 2-foot-wide band next to the house/home foundation. Use 0.5 lb* to 1 lb for each 500 sq ft (2 ft x 250 ft).

*0.5 lb/500 sq ft is equivalent to 1 lb/1,000 sq ft.

Vegetable Gardens • This product can be applied to the vegetables listed below. Apply a single application before planting or after plants emerge and work into the top 4 to 6 inches of soil. Use 1 lb of product for a 500 sq ft area.

Crop	Days to Wait Until Harvest	Pests
Tomatoes	1	Ants, Cutworms, Crickets, Earwigs, Grasshoppers, Grubs, Seed Maggots, Weevils and Wireworms
Sweet Corn	1	Ants, Armyworms, Cutworms, Crickets, Earwigs, European Corn Borer, Fall Armyworm, Grasshoppers, Southwestern Corn Borer and Weevils
Green Peas, Edible Pods (Sugar Snap Peas, Snow Peas), Green Beans (Wax Beans, Snap Beans), Dry Beans (Black Eyed Peas, Cow Pea)	3	Ants, Cutworms, Crickets, Earwigs, Grasshoppers, Grubs, Seed Maggots, Weevils and Wireworms
Cucurbit Vegetables • Chayote, Citron Melon, Cucumber, Edible Gourd, Muskmelon (Cantaloupe, Casaba, Crenshaw Melon, Golden Melon, Honeydew Melon, Pineapple Melon, Santa Claus Melon, Snake Melon), Pumpkin, Summer Squash (Crookneck, Scallop, Straightneck, Zucchini), Winter Squash (Butternut, Calabaza, Hubbard including Acorn and Spaghetti), Watermelon	3	Ants, Cutworms, Crickets, Earwigs, Grasshoppers, Grubs, Seed Maggots, Weevils and Wireworms
Artichoke	5	Ants, Cutworms, Crickets, Earwigs, Grasshoppers, Grubs, Seed Maggots, Weevils and Wireworms
Broccoli, Brussels Sprouts, Chinese Broccoli, Cabbage, Cauliflower, Cavallo Broccoli, Chinese Cabbage, Kohlrabi, Chinese Mustard, Eggplant, Head Lettuce, Peppers (Bell and Non-Bell)	7	Ants, Cutworms, Crickets, Earwigs, Grasshoppers, Grubs, Seed Maggots, Weevils and Wireworms

Spreading Instructions • Follow Application Directions in the table below. Calibrate the spreader settings based on the manufacturer's recommendations.

Spreader Settings

Spreader Settings

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

Aplique este producto directamente al césped o zona del jardín. Riegue la zona tratada como se indica en esta etiqueta. No riegue hasta el punto de escurreimiento.

No realice aplicaciones durante lluvias.

Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

Instrucciones generales

El Insecticida granulado para hormigas bravas Real-Kill® es para uso en céspedes, en los alrededores de las casas (tratamiento del perímetro), jardines ornamentales y de flores y huertos, para el control de las plagas de insectos que se indican en la tabla a continuación.

Céspedes • Aplique este producto tan pronto se observe actividad de los insectos o daños (el césped escasea, aparecen manchas marrones o salen pollitas cuando se corta el césped). • Esparza este producto de forma uniforme sobre el césped según las dosis que se indican, usando los ajustes del difusor sugeridos. Para obtener mejores resultados, use un difusor mecánico. • Riegue el producto después de la aplicación. • No use ningún otro producto para el control de malezas, enfermedades o insectos por lo menos por una semana después de la aplicación. • Para obtener mejores resultados y prevenir daño adicional, trate todo el césped, no solo las áreas marrones. • Repita la aplicación si hay nuevos indicios de insectos.

NOTA: Los utensilios para alimentos como cucharas/cucharitas no se deben usar con alimentos después de utilizarlos para medir pesticidas.

Insectos nocivos	Dosis de aplicación
Hormigas (incluyendo carpinteras, cosechadoras rojas, odrosas, pirámide, Argentina, faraonas, negras del césped, hormigas bravas y hormigas bravas recolectoras), gusanos soldados (incluyendo soldados del césped, gusano cogollero, gorgojos (incluyendo gorgojos del pasto azul, gorgojos cazadores), escarabajo negro del césped del género ataenius (adulto), cola de resorte, ácaros de la cosecha, chinches, grillos, gusanos cortadores (incluyendo cortador negro, cortador bronceado, cortador cuenudo, cortador veteado), crisomelidos de la Dichondra, tijeretas, tipulas europeas, saltador fogoso, tisanuros, pulgas, mosca de la fruta, saltamontes, chinches verdes, escarabajos de la tierra, Margarodidae, saltarillas, mariposa nocturna, cochinitas harinosas, grillos topos (incluyendo grillo topo leonado, grillo topo del sur, grillo topo de ala corta), cochinitas, gusanos de las semillas, arañas, friesea, gusano rayado del césped, garrapatas (incluyendo las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme), cigarrillas de dos líneas, orugas tejedoras (incluyendo oruga tejedora del césped, oruga tejedora del pasto, oruga tejedora del césped tropical), gorgojos (incluyendo hyperodes, del pasto azul), gusanos alambres	Aplique de manera uniforme de 1 a 2 lb sobre un área de 1,000 pies cuadrados de césped usando un difusor. Para obtener control por 3 meses, aplique 1 lb de producto por cada 250 pies cuadrados. Para obtener mejores resultados, riegue bien el área tratada después de la aplicación. Para los hormigueros de hormigas bravas : Aplique de manera uniforme 1 cda. sopra o 3 cdtas. de gránulos a la superficie de cada hormiguero. Para obtener mejores resultados, aplique en clima frío, de 65°F a 80°F, temprano en la mañana o a última hora de la tarde. Evite alterar a las hormigas. Trate los nuevos hormigueros tan pronto aparezcan. Riegue bien el área tratada después de la aplicación.
Ciempies, milpiés, hormigas del pavimento	Aplique de manera uniforme 1 lb por cada 250 pies cuadrados de área de césped. Para obtener mejores resultados, riegue bien el área tratada después de la aplicación.
Grillos topos	Aplique de manera uniforme de 1 a 2 lb en 500 pies cuadrados. Para obtener mejores resultados, aplique a finales de primavera y riegue bien después de la aplicación.
En el Estado de Nueva York, este producto NO puede aplicarse al césped o pasto que esté a 100 pies de un cuerpo de agua (lago, estanque, arroyo, pantano o zanja de drenaje). En el Estado de Nueva York, aplique este producto solo una segunda vez si nuevamente hay indicios de insectos, pero no antes de dos semanas a partir de la primera aplicación.	

Plantas ornamentales y flores • Este producto se puede aplicar justo antes de sembrar o después de emerger las plantas. • Aplique de 0.5 lb* a 1 lb de forma pareja por cada área de 500 pies cuadrados. Repita si hay nuevos indicios de insectos.

Cimientos de la casa/tratamiento de barrera • Aplique de forma pareja una franja de 2 pies de ancho junto a los cimientos de la casa. Use de 0.5 lb* a 1 lb por cada 500 pies cuadrados (2 pies x 250 pies).

*0.5 lb/500 pies cuadrados es equivalente a 1 lb/1,000 pies cuadrados.

Huertos • Este producto se puede aplicar a las hortalizas que se enumeran a continuación. Haga una sola aplicación antes de sembrar o después de emerger las plantas e incorpore a las 4 a 6 pulgadas superiores de la tierra. Use 1 lb de producto por cada área de 500 pies cuadrados.

Cultivo	Días que debe esperar para la cosecha	Insectos nocivos
Tomates	1	Hormigas, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, saltamontes, larvas, gusanos de semillas, gorgojos y gusanos alambre
Maíz dulce	1	Hormigas, gusanos soldados, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, barrenadores europeos del maíz, gusanos cogolleros, saltamontes, barrenadores del maíz del suroeste y gorgojos
Chicharos, vainas comestibles (chicharos Sugar Snap, chicharos chinos (Snow)), ejotes (ejote amarillo, snap), frijoles secos (frijol de carita, frijoles de vaca)	3	Hormigas, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, saltamontes, larvas, gusanos de semillas, gorgojos y gusanos alambre
Cucurbitáceas • Chayote, melón cítrico, pepino, calabaza comestible, Muskmelon (cantalupo, casaba, melón crenshaw, melón dorado, melón honeydew, Pineapple Melon, Santa Claus Melon, Snake Melon), calabaza, calabaza de verano (crookneck, scallop, straightneck, calabacín), calabaza de invierno (butternut, calabaza, hubbard, incluyendo acorn y espaguetti), sandía	3	Hormigas, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, saltamontes, larvas, gusanos de semillas, gorgojos y gusanos alambre
Alcachofa	5	Hormigas, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, saltamontes, larvas, gusanos de semillas, gorgojos y gusanos alambre
Brócoli, coles de Bruselas, brócoli chino, col, coliflor, brócoli cavolo, col china, colirrábano, mostaza china, berenjena, lechuga arropollada, pimientos/chiles (todos)	7	Hormigas, gusanos cortadores, grillos, tijeretas, saltamontes, larvas, gusanos de semillas, gorgojos y gusanos alambre

Instrucciones para la difusión • Siga las instrucciones de aplicación en la tabla a continuación. Calibre los ajustes del difusor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Ajustes del difusor

Ajustes del difusor

Spreading Instructions • Follow Application Directions in the table below. Calibrate the spreader settings based on the manufacturer's recommendations.

Spreader Settings

Spreader	Spreader Settings Covers 5,000 sq ft			Application Directions
	Pounds of product per 1,000 sq ft			
	1 lb	2 lb	3.5 lb	
Scott Drop Spreader, EZ Drop, Republic (#530)	3½	5	8	Mow lawn first if grass is tall enough to touch the bottom of the spreader. First apply two header strips. Operate spreader the longest way of the lawn. Overlap wheel marks to ensure uniform feeding. Shut off spreader when you have reached the header strips or stopped.
Scotts Easy Green® Rotary, EZ Broadcast, Republic (#540)	2½	3½	4¾	Application automatically starts and stops when you do. For complete coverage, make each pass about 30 inches from the previous one, or some overlapping occurs.
Scotts SpeedyGreen®, EdgeGuard® Rotary	2¼	3¼	4¾	Shut off spreader anytime you stop. For complete coverage, make each pass about 5 ft from the previous one so some overlapping occurs.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry, secure place. Do not store near seeds, fertilizers or foodstuffs. **PESTICIDE DISPOSAL:** Pesticide wastes are toxic. Improper disposal of excess pesticides, spray mixture or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance. **CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Completely empty bag into application equipment. Then offer for recycling if available or dispose of empty bag in a sanitary landfill, or by other procedures approved by state and local authorities.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If on skin or clothing	<ul style="list-style-type: none"> Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If in eyes	<ul style="list-style-type: none"> Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment. You may also contact us 1-800-897-8524 for emergency medical treatment information.	
Note to Physician: This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.	

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk or street back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent runoff to water bodies or drainage systems.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

 **Questions or Comments?** Call 1-800-897-8524.

Distributed by Realex
 Division of United Industries Corporation
 PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
 EPA Reg. No. 53883-194-478
 EPA Est. Nos. 9198-AL-1(A), 9198-OH-2(B), 9198-OH-1(M), 7401-TX-1(OH), 39578-TX-1(AM)
 Circled letter is first letter of lot number.
 11-12171 © 2018 UIC

Ajustes del difusor

Difusor	Ajustes del difusor Cubre 5,000 pies cuadrados			Instrucciones de aplicación
	Libras de producto por cada 1,000 pies cuadrados			
	1 lb	2 lb	3.5 lb	
Difusor por gravedad Scott, EZ Drop, Republic (#530)	3½	5	8	Corte el césped primero si está tan alto que toca el fondo del difusor. Aplique primero dos franjas de encabezado. Opere el difusor lo más alejado del césped. Superponga las marcas de las ruedas para asegurar una cobertura uniforme. Apague el difusor cuando llegue a las franjas de encabezado o se detenga.
Rotario Scotts Easy Green®, EZ Broadcast, Republic (#540)	2½	3½	4¾	La aplicación comienza y termina automáticamente cuando usted lo hace. Para obtener una cobertura completa, realice cada pasada a unas 30 pulgadas de la anterior o para sobreponerlas.
Rotario Scotts SpeedyGreen®, EdgeGuard®	2¼	3¼	4¾	Apague el difusor cada vez que usted se detenga. Para obtener una cobertura completa, realice cada pasada aproximadamente a 5 pies de la anterior para sobreponerlas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua ni los alimentos para personas o animales por medio del almacenamiento o la eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde en un lugar seguro, fresco y seco. No guarde cerca de semillas, fertilizantes o alimentos. **ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA:** Los desechos de pesticidas son tóxicos. La eliminación incorrecta del exceso de pesticida, la mezcla de rocío o los residuos del enjuague se considera una violación a la ley federal. Si estos desechos no se pueden eliminar de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta, comuníquese con la Agencia de control ambiental o de pesticidas de su estado o con el representante de residuos peligrosos en la oficina regional de EPA más cercana para que lo ayuden. **MANIPULACIÓN DEL ENVASE:** Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Vacíe completamente la bolsa en el equipo de aplicación. Después, diréjalo para reciclar, si existe esa opción o deseche la bolsa vacía en un vertedero o a través de otros procedimientos aprobados por las autoridades locales y estatales.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Noivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none"> Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamarnos al 1-800-897-8524 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.	
Nota para el médico: Este producto es un piretroide. Si se han ingerido grandes cantidades, la leche, crema y otras grasas y aceites comestibles pueden aumentar la absorción y deben evitarse.	

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Barrer el producto que caiga en los caminos de entradas de automóviles, aceras o la calle y regresarlo a la zona de tratamiento del jardín o césped ayudará a evitar que escurra a masas de agua o sistemas de drenaje.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

 **¿Preguntas o comentarios?** Llame al 1-800-897-8524.

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
 replace and verify
 0 71121 96718 3